

4

*44 R 2.*



XIX of 125 f. v







# SYNOPSIS

UNIVERSÆ  
MEDICINÆ PRACTICÆ:

SIVE,

DOCTISSIMORUM VIRORUM

## DE MORBIS

Eorumque Causis ac Remediis Judicia.

ACCESSERUNT NUNC DEMUM

*Casus nonnulli oppidd rari.*

PARS SECUNDA.


AUTHORE

J. ALLEN, M. D.

EDITIO NOVA VENETA,

ad tertiam LONDINENSEM prioribus, triente plus,  
auctiorem, exacta, additis prætereà Formulis re-  
mediorum ex quinta AMSTELODAMENSI desumptis.


Τῆς αὐτῆς διατάξεως ἐστὶ γυνῶναι τὰ ὁρῶνς ἐμπλεῖνα.  
Ἰπποκράτ. περὶ διατῆς.




VENETIIS, MDCCXLII.

Apud LAURENTIUM BASILIUM.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.







# C A P U T X.

*Sive Fasciculus Morborum decimus.*

## P L I C A P O L O N I C A.

*Boneti sententia.*

Art. 992.



**P**LICA capillorum morbus est *Polonis*, plerumque *endemicus*, tam maribus quàm scæminis, imò pueris & infantibus; item in aliis regionibus, ut in

*Plica in Polonia endemicus alibi cognita.*

*Helvetia, Alsatia, & Belgii parte ad Rhenum*, ac in *Hungaria* cognitus, at non tam frequens. In *Hungaria* interdum animalia hoc morbo infestari, præsertim equos; testatur *Sennertus*.

Art. 993. Est autem plica affectus capillorum gravis; malignus, & periculosus, in quo capilli capitis indissolubili implicatione, & agglutinatione; seu inviscatione contorquentur, cum gravissima totius corporis artuumque tam superiorum, quàm inferiorum capitisque læsione, antequàm capilli complicantur, magno dolore, sudore plerumque concomitante.

*Morbus gravissimus.*

Art. 994. Præcisio capillorum intempestiva in sic affectis est admodum periculosa. "Nulla certa & appropriata remedia hujus morbi hætenus inventa sunt; quæ illum perfectè sanare vel penitus extirpare valent; & quoniam in his regionibus nusquam invenitur, supervacuum erit de illo diutius exspectari."

*Incurabilis.*



## T I N E A.

*Turneri sententia.*

Tinea.

*Art. 995.* Sahafati seu tinea; Angli sonant *Scall'd Head*. Hujus affectus tres species ab authoribus numerantur, viz. *tinea sicca, humida, & lupinosa*, quæ reverà sunt tantùm varii gradus ejusdem affectus; sed prætermisiss hisce divisionibus minùs necessariis morbus definiri potest; ulcuscula manantia capitibus infantum exorsa a vitioso, corrosivo, aut salino humore, glandulas cutaneas exedente, quæ tractu temporis texturam earum destruit, & deprædantur. In primo gradu velamine albedo, siccò, furfuraceo, aut squamoso caput obducitur. In secundo gradu caro subjacens granulata apparet, ad instar seminum in ficibus transversim sectis. Gradus tertius est ulcerosus, sicut *achores & favi*. Nomen desumitur a *vermiculo tinea* ob similitudinem foraminum, quæ ab isto animali in chartis & vestimentis effodiuntur.

Definitio morbi:

Ejusdem gradus varii.

Ratio nominis.

Curatio.

*Art. 996.* Ad amovendam inerustationem fots & unguentum sequentia ab *Ambrosio Paræo* laudantur; *℞. Rad. alth. lapath. acut. acetos. ana q. s. coque in lixivio tenui, cui addatur modicum aceti* pro fotu bis in die usurpand. unguentum conficitur ex *foliis nasturtii hortensis* cum *axungia porcina* contusis vel frixis, quod 24. horis opus absolvet; ad radicalem autem curam hujusce mali contumacissimi recte perficiendam consulatur author, qui de eò pulchrè scripsit, & optima remedia ex probatissimis scriptoribus cum judicio accumulavit. “ Sed negotium adhuc abbreviare possumus: Ex-  
 „ perientia etenim edoctus sum hunc affectum so-  
 „ la *Pisselæi Indici* inunctione ( amota prius in-  
 „ crustatione, ut ante dictum fuit ) tuto ac citò  
 „ sanari posse.

TRA-

TRACTATUS DE OCULORUM MORBIS  
cognoscendis & curandis .

*Art. 997.* Oculum nobilissimum totius corporis organon ( quod emphasi quadam *lux corporis* appellatur ) curam medicorum præcipuam mereri damnum illud ingens , quod a cæcitate patimur , testatur. Subiecti dignitas.

Series Morborum Ocularium ( primatiorum saltem , quibus reliqui referri possunt ) a scriptoribus passim recensitorum in ordinem redacta .

*Nomenclatura Morborum .*

Morbi  
vel vitia  
palpebra-  
rum.  
N. xvi.

<i>Art. 998.</i> Emphysema , Tumor flatu-	
lentus .	999.
Pladorosis , Tuberculum lividum .	1000.
Aerochordon , verruca .	1001.
Pterophthalmia , lippitudo pruriginosa .	1003.
Xerophthalmia , lippitudo arida .	1005.
Sclerophthalmia , lippitudo dura .	1007.
Scleriosis , lippitudo schirrhosa , livida .	1008.
Trachoma , asperitas interna .	1009.
Trichiasis , pilorum vitium .	1011.
Madorosis , defluvium pilorum .	1012.
Anchyloblepharon , coalescentia palpebrarum .	1013.
Lagophthalmia , superior palpebra iusto brevior .	1014.
Atonioblepharon , defectus quoad motum .	1016.
Hippos , oculi nictatio .	1017.
Ectropium , inversio palpebræ inferioris .	1018.
Phthiriasis , pediculatio .	1020.

Morbi  
Tunica-  
rum &  
Humo-  
rum N.  
xiv.

Morbi ac  
vitia reli-  
qua in  
prioribus  
classibus  
minus  
compre-  
hensa. N.  
xv.

- Ophthalmia, inflammatio oculi. 1021.  
Oedema, tumor œdematosus. 1033.  
Hypopyon, sanies sub cornea. 1036.  
Phlyctenæ, pustulæ miliares. 1037.  
Anthracosis, carbunculus oculi. 1039.  
Synchysis, humorum confusio. 1040.  
Pterigium, unguis oculi. 1041.  
Proptosis, ruptura corneæ. 1045.  
Rhexis, ruptura tunicarum cum hu-  
morum effluxu. 1047.  
Oule, cicatrix, leucoma, &c. 1049.  
Hyposphagma, Suggillatio. 1052.  
Hypochoyima, suffusio, vel cataracta,  
1054.  
Glaucoma, mutatio humoris chrystal-  
lini in glaucum colorem. 1062.  
Epiphora, catarrhus oculi. 1064.  
Proptosis, exitus oculi ferè ex orbita.  
1069.  
Atrophia, tabes oculi. 1070.  
Medriasis, pupillæ dilatatio. 1071.  
Meiopsis, pupillæ angustia. 1072.  
Plege, oculorum vulnera & confusio-  
nes. 1073.  
Elcos, ulcus oculi. 1074.  
Paralysis, musculorum resolutio. 1078.  
Strabismus, oculorum distortio.  
1079.  
Encanthis, excresecientia carnosæ. 1081.  
Anchilops, ægilops, & fistula lacryma-  
lis. 1083.  
Amblyopia, hebetudo visus. 1085.  
Amaurosis, gutta serena. 1088.  
Myopia, propinqua visio. 1093.  
Presbytia, affectus priori contrarius.  
1094.  
Nyctalopia, vitium duplex infra vi-  
dendum. 1095.

Emphy-



*Emphysema.*

*Art. 999.* Emphysema sive oculi inflatio est Tumor *flatulentus* palpebrarum citra coloris mutationem subito accidens: in corporibus cachecticis & scorbuticis est affectus levioris momenti, (vid. Emphysema 1298.)

Emphysema.

*Pladorosis.*

*Art. 1000.* Pladorosis, *sarcomatis* quodammodo species, morum ob similitudinem vocata, est tuberculum lividum in palpebris nascent, non in margine, sed frequentius in medio cili superioris, doloris expers; est Tumor in *cista* contentus, sicut Atheroma, steatoma, & meliceris, quæ in palpebris etiam quandoque accidunt. Hi Tumores extirpatu haud difficiles sunt. (vid. Art. 1304.)

Pladorosis

*Acrochordon.*

*Art. 1001.* Acrochordon, sive *verruca* oculi latiori sensu pro excrescentia præternaturali accepta, est vitium multifarium, viz. 1. *Hydatis* in superiori palpebra quæ est excrescentia substantiæ pinguis, infantibus maxime familiaris, quæ in majorem molem quàm reliquæ, accrescere solet, unde tota palpebra quandoque œdemotosa fit; si sit recens & parva sæpè sponte evanescit, vel medicamentis facillè curatur, 2. *Crithe seu Hordeolum*, quod est tuberculum in summa palpebra ortum, prope cilia, quod *grano hordei* simile est, unde nomen mutuatur. Foveatur cera alba, vel adipe Gallinæ, vel saliva jejuni, vel corpore musci abjecto capite fricetur, vel sanguine columbæ vel perdicis. Si omnia frustra, sectione opus est.

Acrochordon.

Hydatis;

Crithei

*Grando.* 3. *Chalazion*, ſeu *Grando*, quæ ab *Hordeolo* parum aut nihil differt, niſi forma externa, & forſan quod ſit aliquanto durior. 4. *Lithiaſis*, ſive *Tophus*, cùm materia verruca contenta ad cretæ vel lapidis ſubſtantiam accedat.

*Curatio.* *Art. 1002.* Hæc omnia Tubercula in ciſtis continentur, & ut plurimum operatione manuali extirpanda ſunt: nihilominus verò recordandum eſt, hæc operationes, utcunque leviores videantur, non, ſine cautela, temerè ſuſcipiendas eſſe.

### *Pſorophthalmia.*

*Pſorophthalmia.* *Art. 1003.* “*Pſorophthalmia ſive Lippitudo prægiginoſa* eſt morbus palpebrarum *Pſoræ* in reliquo corpore non multum abſimilis, ab acri & mordaci humore proveniente, palpebrarum marginibus leviter inflammante, quandoque in tuberculis minimis erumpente, alias farinacea vel pruriginosa ſcabie incruſtante.

*Curatio.* *Art. 1004.* Eſt malum contumaciſſimum & curatu difficiliſſimum, præcipuè ſi fuerit inveteratum. “ Ut curatio regularis inſtituatur, imprimis mittendus eſt ſanguis, & deinde exhibendæ ſunt doſes aliquot calomelanos alternis vel tertiis noctibus; & bibendæ ſunt aquæ minerales catharticæ ſingulis auroris, quales ſunt *Ebeſhamenſes* & noſtrates *Alfordenſes*, *Lidfordenſes* vel *Hortenſes*. “ Interim foveantur oculi quotidie ſotu ſequent. *℥. Fol. roſ. rub. ſambuc. ana Mj. ſem. lin. ſenugr. ana ℥ij. carui ℥j. coq. in q. ſ. aq. & vin. alb. ad ℔j. pro ſotu bis vel ter in die uſurpand.* Inflammatione & humorum acrimonia in hunc modum ſublatis vel lenitis demum palpebræ liniment. ſequent. illinantur. *℥. Ung. Pom. ℥j. ſlor. Sulphur. ℥ſs. Camphor. ℥j. ol. roſ. q. ſ. M. vel cum Infuſ. ſequent. humectentur bis terve in die. ℥. Fol. Nicotian. opt. ℥j. ſlor. verisſmarin. P. r. ſuper-*

CAP. X. cognoscendis & curandis. 361  
per affund. aq. calcis bullient. ℞. infund. per hor.  
quadrant. & coletur. Valere potest etiam unguen-  
tum Ophthalmicum Pharm. Londinens.

### Xerophthalmia.

Art. 1005. Est etiam genus arida Lippitudinis, Xeroph-  
thalmia.  
quod *Ξηροφθαλμία* Græci appellant. Sub hoc ne-  
que tument, neque fluunt oculi, sed rubent tan-  
tum, & cum dolore quodam ferè levi, ac prurigi-  
ne graves sunt, & palpebræ citra duritiem ullam  
noctu prægravi pituita inhærescunt.

Art. 1006. " Quoad curam præmissis præmit- Curatio.  
,, tendis, quemadmodum in quibusdam similibus  
,, oculorum morbis, *Celsus* commendat *vipam*  
,, oculis noctu apponendam; nec video quid pa-  
,, nis tosti oleo appropriato aliove liquore idoneo  
,, imbuti applicationem prohibet; fots emolliens  
,, in Articulo de *Psorophthalmia* memoratus hic  
,, etiam locum habet.

### Sclerophthalmia.

Art. 1007. Sclerophthalmia est Lippitudo dura, Scleroph-  
thalmia.  
sicca, dolorosa, callositatem crassam in palpebris  
efficiens, earumque motum valdè impediens. Ad  
effectus alterutriusque priorum ferè semper quoad  
medendi rationem referenda est.

### Scleriasis.

Art. 1008. Scleriasis vel scleroma oculi est du- Scleriasis.  
rities palpebrarum scirrhusa; vix a sclerophthal-  
mia differt nisi gradu, unde prorsus malum ineu-  
rabile evadit.

Traco-



## Tracoma.

**Tracoma.** *Art. 1009.* Tracoma est internæ palpebrarum partis asperitas, cum pruritu & rubore, sæpè & pustulis semen milii referentibus, ab humore acri. Gradus ejus sunt *sycofis*, & *tylofis*.

**Curatio.** *Art. 1010.* Præter generalia, *revellentia*, *intercipientia*, *topica* sint *mollientia*, postea *refrigerantia*, ultimò *detergentia*. *Parvus* seq. instar omnium effert scribit, si parum *vitrioli* in *multa aq. ros.* solvas.

## Trichiasis.

**Trichiasis.** *Art. 1011.* Trichiasis vel Phalangosis est vitium pilorum in ciliis, duplici ordine crescentium, vel saltem introrsum spectantium, atque ita oculum lædentium. Ophthalmiam non rarè inducit. Forcipe avellendi sunt hi pili nocentes, si fieri possit, secus cura non est expectanda.

## Madarosis.

**Madarosis** *Art. 1012.* Madarosis sive Ptilosis est *defluvium pilorum vel palpebrarum glabrities* ex vehementia alicujus morborum trium supra recensitorum plerumque oritur, *viz. Pterophthalmia, Xerophthalmia vel Sclerophthalmia.*

## Anchyloblepharon.

**Anchyloblepharon.** *Art. 1013.* Anchyloblepharon est palpebrarum inter se invicem vel inter ipsas & tunicam conjunctivam *coagmentatio vel potius coalescentia*. Interdum [ ut aiunt ] est vitium infantibus connatum, sed frequentius ob incuriam in curandis ulceribus vel aliis quibusdam oculorum morbis provenit, *Coalescentiæ præternaturales manu chirurgi.*

CAP. X. *cognoscendis & curandis*, 363  
rurgica cum cautela separandæ sunt ; & oculus  
tanquam in vulneribus & ulceribus topicis appro-  
priatis tractandus.

*Lagophthalmia.*

*Art. 1014.* Lagophthalmia est cùm superior pal- Lagoph-  
thalmia.  
quid.  
pebra iusto est brevior ; vel nativa est, vel a ci-  
catrice vel convulsione , vel cùm infantes in cu-  
nis sursum vel retrò semper spectant.

*Art. 1015.* Curatur mollioribus. Si a cicatrice, Curatio ;  
sectio sit supra eam figura *falcata lune* , in pla-  
gam *litus* injiciendus est. “ Sed revera est malum  
,, ut plurimum prorsus insanabile.

*Atoniatonblepharon.*

*Art. 1016.* Atoniatonblepharon est affectus pal- Atoniaton-  
blepharon;  
pebræ superioris ex impotentia musculi attollen-  
tis, ortus, hinc motus ejusdem superne in totum  
amissus est : provenire potest a *paralyfi* ; ( novi  
quosdam a *nativitate* sic affectos ) a vulnere vel  
contusione gravi discissis scilicet illius musculi fi-  
bris: hujus rei documentum habemus satis nota-  
bile ac æquè deplorandum in insigni quodam *Bar-*  
*onetto Anglicolis* ferè omnibus noto ex ictu in-  
felici calcis equinæ. Fœmina quædam a *fissula la-*  
*crymali* , qua aliquandiu afficiebatur, ope chirur-  
gica sanata , hunc defectum in supercilio contra-  
xit, & , quod mirum videatur, idem in *nepotem*  
traductus est, nimirum virium imaginationis im-  
pressionem: filia etenim , cum prægnans esset cum  
matre prædicta cohabitans , & intuitu ac consue-  
tutine quoridiè utens filium peperit similiter oculo  
affectum & insanabilem mansurum. Et fatendum  
est quidem Atoniatonblepharon a quacunque causa  
oriundum esse prorsus incurabile ; neque curatio  
sectione , ut nonnulli suadent, temerè tentanda est,  
ne gravius malum , nempe *Lagophthalm*, accersiat.  
*Hippos*

*Hippos.*

*Hippos.* Art. 1017. Hippos est instabilitas palpebrarum, cum palpebræ inordinato motu continuè clauduntur & aperiuntur, huiusmodi nictatio ut plurimum est hæreditaria, interdum vero ex mala consuetudine comparatur, vel a gravi aliquo affectu, ut terrore ira vel timore accidit: sub curam medicam propriè dictam nunquam cadit.

*Ectropium.*

*Ectropiū.* Art. 1018. Ectropium est affectus inferioris palpebræ, quæ invertitur, & deorsum trahitur, ut interna pars cum deformitate videatur, & instar rubræ carnis appareat; neque enim superiori committitur, sed pendet ac hiat. A paralyti, convulsione, vel vulnere malè curato plerumque oritur.

Art. 1019. Hoc curant *astringentia* ( inquit *Forestus* ) in *aqua ros.* in qua ferrum ignitum sit extinctum; seq. sæpè expertus est, *℥. Butyr. rec. diligenter lot. in aq. commun. & postea in aq. plantag. vel ros. ℥iiss. tutiæ præp. & in aq. ros. lot. aloë in aq. plantag. lot. sieff. alb. cum opio ana ℥iiss. camphor. lot. ℥j. f. ung. quo vesperi inunge & aq. calida ablue.* De operatione Chirurgica vide Cellum.

*Phthiriasis.*

*Curatio.* Art. 1020. Phthiriasis sive *palpebrarum pediculatio* est vitium in quo pediculi inter pilos nascuntur. Malum est ( inquit *Sennertus* ) minimè contemnendum: acres enim fluxiones concitat, & oculi tandem ab iis valdè læduntur; idem varia medicamenra enumerat, sed non opus est ut hic recensentur; nam sola inunctione saponis nigri pediculi cujuscunque generis facili negotio necandi sunt. ( vid. Art. 1569. )

Oph.



## Ophthalmia .

## Riverii sententia .

Art. 1021. Ophthalmia sive Lippitudo est oculi inflammatio cum tumore, rubore, & dolore; Morbi definitio, & divisio. levis inflammatio *phlogosis* dicitur; *chemosis* appellatur, quando utraque palpebra inversa sit, ut vix ab iis oculi contegantur, rubrumque magna ex parte iridem occupet. Alia est ophthalmia *sicca*, Ejusdem descriptio. alia *periodica*. Elegantem hujus affectus descriptionem habemus apud *Lommium*; "Vehemens, oculos urget inflammatio cum multo dolore, & tensione, & tumore & ardore & rubedine; interdum etiam tanta cum punctione, ut oculi tanquam ab infixa acu aut spina stimulari videantur; fervente humore implentur, sequiturque pituita modò paucior, modò uberior; sed & sordes quædam majoribus angulis inhærescunt; & ubi gravius est malum, vicina etiam loca ad malas usque attolluntur, circum circa arteriæ vehementer pulsant; vasa sanguifera tenuia turgent conspicuaque redduntur, quæ per sanitatem in albo fuerant obscura.

Art. 1022. *Venæsectio* docente *Avicenna* usque ad lipothymiam celebranda est; Curatio: *cucurbitula* scapulis & spinæ dorsi affigendæ, *catharsis* lenientibus instituenda. Remedium sequens inflammationem sedat, & fluxionem cohibet. *℞. Alb. ovi unius*, agitetur eum frusto *aluminis* satis magno, donec unguenti consistentiam adeptum sit, quod extendatur super linteum, & oculo tepidè applicetur, post horas 2. vel 3. auferendum est, nè humores nimis astringat. Unguentum fieri potest ex *butyro* & succo *nicotianæ* simul coctis maximè efficax. In declinatione collyria magis *resolventia* usurpanda sunt, ut *℞. Sarcocol. nutrit.*

[ i. c.

*Hippos.*

**Hippos.** *Art. 1017.* Hippos est instabilitas palpebrarum, cum palpebræ inordinato motu continuò clauduntur & aperiuntur, hujusmodi niſtatio ut plurimùm est hæreditaria, interdùm vero ex mala consuetudine comparatur, vel a gravi aliquo affectu, ut terrore ira vel timore accidit: sub curam medicam propriè dictam nunquam cadit.

*Ectropium.*

**Ectropiũ.** *Art. 1018.* Ectropium est affectus inferioris palpebræ, quæ invertitur, & deorsum trahitur, ut interna pars cum deformitate videatur, & instar rubræ carnis appareat; neque enim superiori committitur, sed pendet ac hiat. A paralyſi, convulsione, vel vulnere malè curato plerumque oritur.

*Art. 1019.* Hoc curant *astringentia* ( inquit *Fo-  
restus* ) in *aqua ros.* in qua ferrum ignitum sit ex-  
tinctum; seq. sæpè expertus est, *℥. Butyr. rec. di-  
ligenter lot. in aq. commun. & postea in aq. plantag.  
vel ros. ℥iſſ. tutiæ præp. & in aq. ros. lot. aloë in  
aq. plantag. lot. sicff. alb. cum opio ana ℥iſſ. camphor.  
lot. ℥j. f. ung. quo vesperi inunge & aq. calida ablue.*  
De operatione Chirurgica vide Celsum.

*Phthiriasis.*

**Curatio.** *Art. 1020.* Phthiriasis sive palpebrarum pedicu-  
latio est vitium in quo pediculi inter pilos nascun-  
tur. Malum est ( inquit *Sennertus* ) minimè con-  
temnendum: acres enim fluxiones concitat, &  
oculi tandem ab iis valdè læduntur; idem varia  
medicamenra enumerat, sed non opus est ut hic  
recenseantur; nam sola inunctione saponis nigri  
pediculi cujuscunque generis facili negotio necan-  
di sunt. ( vid. *Art. 1569.* )

Oph.

## Ophthalmia .

## Riverii sententia .

Art. 1021. Ophthalmia sive Lippitudo est oculi inflammatio cum tumore, rubore, & dolore; levis inflammatio *phlogosis* dicitur; *chemosis* appellatur, quando utraque palpebra inversa sit, ut vix ab iis oculi contegantur, rubrumque magna ex parte iridem occupet. Alia est ophthalmia *sicca*, alia *periodica*. Elegantem hujus affectus descriptionem habemus apud *Lommium*; "Vehemens, oculos urget inflammatio cum multo dolore, & tensione, & tumore & ardore & rubedine; interdum etiam tanta cum punctione, ut oculi tanquam ab infixa acu aut spina stimulari videantur; fervente humore implentur, sequitur, que pituita modò paucior, modò uberior; sed & sordes quædam majoribus angulis inhærescunt; & ubi gravius est malum, vicina etiam loca ad malas usque attolluntur, circum circa arteriæ vehementer pullant; vasa sanguifera tenuia turgent conspicuaque redduntur, quæ per sanitatem in albo fuerant obscura.

Morbi definitio, & divisio.

Ejusdem descriptio.

Art. 1022. *Venasectio* docente *Avicenna* usque ad lipothymiam celebranda est; *cucurbitula* scapulis & spinæ dorsi affigendæ, *catharsis* lenientibus instituenda. Remedium sequens inflammationem sedat, & fluxionem cohibet. *℞. Alb. ovi unius*, agitetur cum frusto *aluminis* satis magno, donec unguenti consistentiam adeptum sit, quod extendatur super linteum, & oculo tepidè applicetur, post horas 2. vel 3. auferendum est, ne humores nimis astringat. Unguentum fieri potest ex *butyro* & succo *nicotianæ* simul coctis maxime efficax. In declinatione collyria magis resolutiva usurpanda sunt, ut *℞. Sarcocol. nutrit.*

Curatio.

[ i. c.

i. e. per plures dies in lacte macerat.) *tutia preparat.* ana ℥ss. *aloe* ℥j. *myrrh.* ℥ss. *mucilag. sem. fœ-nugr.* ℥ss. *aq. fœnic. euphras.* ana ℥ss. m. f. collyr. In ophthalmiis inveteratis, cum alia remedia non sufficient, ad *mercurialia* tanquam ad sacram anchoram confugiendum est. In graviore casu convenit *Setaceum*; aliquando etiam *masticatoria*, & decoctum *e lignis* prosunt.

In morbo  
invetera-  
to.

### *Covvardi sententia.*

Ophthalmia hu-  
mida &  
secca.

*Art. 1023.* Ophthalmia est inflammatio tunicae adnatæ cum dolore & ardore torquens. Optimè dividitur in *humidam* & *siccam*, prout scilicet eum majore vel minore humoris profluvio stipatur. In *εὐποφθαλμία* vel ophthalmia *sicca* oculus quidem incumescit cum dolore quodam; leni rubedine; & pruritu, & gravitate, & cum levi etiam humoris fluxione per vices saltem, non enim datur ophthalmia absolute *sicca*.

Prognosis.

*Art. 1024.* Copiosiores lacrymarum effusiones ut ut mordaces, ophthalmiam non diutius duraturam indicant. Ophthalmia laborantem alvi profluvio corripere bonum est, inquit *Hippocrates*.

Curatio.

*Art. 1025.* Ut rectè instituatur ophthalmia cura cum *venesectione* incipiendum est; conveniunt etiam *cathartica* mitiora, privatim *aque minerales purgantes*, vel *sal mirabile* in aqua communi

Varianda  
est pro ra-  
tione mor-  
bi gradus.  
In principi-  
pio.

solut. Quoad *topica* considerandus est præ omnibus morbi status: In principio factis debitis *evacuationibus*; ℥j. *Aq. euphrag. fœnic. dulc.* ana ℥j. *tut. prepar.* ℥ss. *trochis. alb. rhas.* ℥j. f. mistura. ℥j. *Lact. fœminin.* ℥j. *succ. fœnicul. dulc.* ℥ss. *camphor.* ℥j. *album ovi unius*, probè conquassando misceantur, & redigantur in pulvrem formam cataplasmatidis applicand. Huic usui quoque interserviunt mucilagines *seminum cydon. p/syl. papav. &c.* quæ sæpius renovandæ sunt, ne acorem contrahant.

In aug.

CAP. X. *cognoscendis & curandis.* 367

In augmento  $\mathcal{L}$ . *Aq. Plantag. rosar. pallidarum* In aug-  
 ana  $\mathfrak{z}\beta$ . *saccar. saturn. vel ceruss. lot. Dj. sp. sal.* mento.  
*armon. Dj. f. f. a. mixtura.*  $\mathcal{L}$ . *Aq. solani*  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$ . *succ.*  
*sedi*  $\mathfrak{z}\beta$ . *opii thebaici gr. ij. album ovi q. s. conqua-*  
*sando probè f. mixtura ophthalmica.* Si comitetur  
*epiphora,* sine *vitriolatis commixtis* incassum la-  
 boramus. In statu *resolventia* remedia *repellentia.* In statu;  
*bus* prævalere debent, inquit *Riverius*; præcipue  
*fotus, e flor. sambuci parat.* discutiendi gratia; sed  
 mallem ego sequens adhibere,  $\mathcal{L}$ . *Fol. euphrag. sæ-*  
*nic. ana Mj. semini. sænugr. aloes lot. ana*  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$ . *aq.*  
*font. pauco aceto acescentis* ( ita ut gustu leviter  
 deprehendi poterit )  $\mathfrak{Hj}$ . coquantur simul ad dimid.  
 consumpt. colatura servetur ad usum. In declina- In decli-  
 tione sola *sarcocolla*, uti suadet *Sennertus*, ma- natione.  
 ximè conandum est, si ophthalmia sordes reliquit;  
 quod priùsqvàm aliquod applicueris medicamen-  
 tum ophthalmicū; penitus eluantur seu deter-  
 gantur.

*Art. 1026.* In ophthalmia sicca *emollientia & le-* Ophthal-  
*nientia* perpetuò intermiscenda sunt, ne *discutien-* mia sicca.  
*tium & exsiccantium* medicamentorum usu inflam-  
 matio asperior & intensior reddatur.

*Pittairn in MSS.*

*Art. 1027.* Ophthalmia externa diligenter di- Ophthal-  
 stingui debet ab ea, quæ simul est & externa & in- mia inter-  
 terna; *interna* est inflammatio retinæ, quam nemo na.  
 ( quantum scio ) descripsit; dabo itaque signum  
 pathognomonicum, & in praxi utilissimum; nam si  
 signa *externæ* ophthalmiæ adsint, viz. rubor, ca-  
 lor, dolorque, & nihil aliud visui se offerat, est  
 solum ophthalmia *externa*; at si præter illa *exter-*  
*ne* signa videantur ophthalmico oculis suis obversa-  
 ri muscæ in aere volitantes, pulvisve quilibet ob-  
 scurus vagare, aliarumve rerum incerta simula-  
 era, tum erit ophthalmia *interna externe conjuncta.*

*Art. 1028.*



V. S. CO.  
Piola.

Art. 1028. Nullus est morbus, qui natura sua *venesectionem* sapius postulet, quam ophthalmia. „ Et ex observatione quorundam Chirurgorum „ Gallicorum constat unam Arteriæ Temporalis „ Sectionem plus valere ad inflammationem minuendam, quam duas vel tres iteratas venesectiones.

*Farrago sententiarum.*Epidemi-  
ca.

Art. 1029. Interdum ophthalmia est *epidemica* & *contagiosa* ex aere inclementiori. In curanda ophthalmia aliquando apprimè convenit *venesectio* in pede ob maiorem revulsionem. Ubi humores sunt acriores & corrosivi collyriis addenda sunt remedia *fixa metallica*, viz. *tutia preparata*, *lapis calaminaris*, *cerussa*, *sacchar. saturni*, imprimis *flores Zynci*, & *flores Jovis*, quos *Barbette* insigniter commendat. In levi inflammatione frustum *carnis vitulina* vel *bovina* applicatum morbum discutit. *Ettmuller*.

Prognosis.

Art. 1030. Ophthalmia ab uno oculo ad alterum facillimè, ac citissimè frequenter transit. Tumor, sicut aliarum partium *Phlegmones*, vel medicamentis discutitur, vel ad suppurationem & disruptionem vergit, & exindè ulcera consecraria, vel denique, quod pessimum est, intempestivo & imprudenti frigidorum Topicorum ac revellentium usu *gangrænescit*. Medici præstantiores uno ore monent, ne topica in principio ophthalmiæ applicemus; multi enim cæci facti sunt medicamentorum copia.

Ophthalmia sero-  
phulosa.

Art. 1031. " Ophthalmia frequentissimè est *sero-phulosa*; quo in casu præter *evacuantia* remedia *mercurialia* & *specifica* exhibenda sunt, „ item *millepedes* & *herb. euphras.* in cerevisia infus. pro usu communi per longum tempus; sed „ præ omnibus, quotcunque mihi hætenus innotescunt,

„ notescunt, aquæ minerales catharticae, quales  
 „ sunt Ebeshamenses & nostræ Alfordenses, Lid-  
 „ fordenses, Holtenses, &c. diutius epotæ mor-  
 „ bum hunc pertinacissimum subigunt, aut sal-  
 „ tem inducias paciscuntur, ut aliquoties obser-  
 „ vavi. Pro usu externo collyrium sequens. ʒj.  
 „ Mercur. dulc. ʒij. teratur in mortario lapideo  
 „ affundendo aq. ros. ʒij. per 4. vices, & agitur  
 „ pistillo ferreo candenti toties calefacto. Pro-  
 „ dest interdum cataplasma de pomis Fulleri, &  
 „ etiam fots sequens Boyleanus, ʒj. Flor. meli-  
 „ lot. sambuc. calend. ana. Mj. sem. lin. sænugr.  
 „ cym. psyl. cydon. ana ʒß. hord. parlat. ʒß. coq. in  
 „ aq. font. & vin. canariens. ana p. æ. ad ʒbj. pro  
 „ fots in doloribus magnis.

Art. 1032. D. Cheyne in Tractatu suo de Arthri-  
 tide testatur *Æthiopem mineralem* larga dosi bis in  
 die sumptum diuque continuatum spem Medici nun-  
 quam destituere in cura Ophthalmiæ inveteratæ,  
 imò etiam si *Scrophularis* sit. p. 50.

Virtus  
 Æthiopis  
 mineralis.

Cataplasma sequens Ettmulleri in gravissimis in-  
 flammationibus dolorem sedare solet; ʒj. Pulp. pom.  
 dulc. assat. q. v. alb. ovi unius cum sacchar. crystal.  
 benè conquassat. camphor. gr. xij. misce.

Stercus vaccinum more Cataplasmatidis tepidum  
 ab animali oculo appositum Ophthalmiæ mederi di-  
 citur, Ex Ephemer. Leopolditan.

### Oedema.

Art. 1033. Oedema oculi est inflatio sive Tumor Oedema.  
 Oedematofus in albo oculi, i. e. in tunica conjun-  
 ctiva sine coloris mutatione, valdè prominens; est  
 malum satis conspicuum. Cum pruritu mordaci  
 plerumque incipit, tanquam locus ictus esset spi-  
 culo ap. vel eulicis morsu; frequentius in æstate  
 quam hyeme accedit. Banister.

Art. 1034. “ Est etiam alia species Oedematis  
 Aa oculi

„ oculi minus rectè a quibusdam authoribus sic  
 „ vocati ; quod nihil aliud est quàm Emphysema  
 „ in palpebris contingens ; horum postterius fre-  
 „ quentissimè vidi , & etiam prius semel vel bis  
 „ conspexi ; sed hoc ad alium Articulum perti-  
 „ net. *Art. 999.*)

*Curatio.* *Art. 1035.* Ab hujus curationem ut rectè fiat ;  
 præter alias appropriatas evacuationes *cucurbitu-*  
*lae* cum scarificatione humeris sunt affigendæ ; to-  
 pica quod attinet , *fotus* ex discutientibus Vino &  
 Aqua incoëctis sunt proficui , ut etiam *Mucilag.*  
*sem. lin.* & *sænugr.* cum solutione *Myrrh.* & *aloe*  
*in aq. rosar.*

### *Hypopyon.*

*Hypopyō.* *Art. 1036.* Hypopyon est collectio puris sub cornea  
 ( secundum *Kennedy* in ophthalmographia sua *in-*  
*ter cornea laminas* ) ab ophthalmia vel contusione  
 violenta plerumque ortum ducens. Intentiones cu-  
 rativæ sunt doloris sedatio & puris evacuatio per  
 discutientia , &c. *Covvard.* “ Si materia purulen-  
 „ ta discuti nequeat , ipsa cornea lanceolæ mu-  
 „ crone cautè & prudenter aperienda est ; quæ  
 „ operatio periculo vacat ; neque semper post se  
 „ cicatricem fædam relinquit. Incisione facta , &  
 „ pure expulso oculus eandem medicationem po-  
 „ stulat , ac in vulneribus oculorum vel post ca-  
 „ taractæ detractionem .

### *Phlyctænæ.*

#### *Covvardi sententia.*

*Phlyctænæ.* *Art. 1037.* Phlyctænæ sunt ulcera nunc in ad-  
*na quid.* nata , nunc in tunica cornea emergentia , velut  
 tot minimæ vesicæ aqua repletæ , quales solent a-  
 quæ ferventis in aliquas corporis partes affusione  
 exci-

CAP. X. *cognoscendis & curandis* . 371

excitari, vulgò apud *Anglos Blysters in the Eyes* appellantur, & instar *granorum milii* apparent, & cum usitatius ab acri & corrodente humore producantur, vehementem dolorem & lacerationem pariunt. "Hæ pustulæ in tunica cornea *albidae* sunt, in adnata rubescentes.

Art. 1038. Præmissis ritè evacuantibus, *discutientia* & *exsiccantia* conveniunt, quæ varianda sunt, prout morbus sit in augmento, statu, vel declinatione. "Detergendæ sunt Ph'etænæ cum *melle rosar. addito pauxillo unguent. Ægyptiac. vel cum pulvere nicotianæ* (cum cautela usurpato.) Post detersionem sanandæ & exsiccandæ sunt cum *Collyrio ex Aq. plantag. & Trochisc. Alb. Ras. Kennedy.*

Indicationes curati-  
væ.

*Anthracosis.*

Art. 1039. Anthracosis sive Carbunculus oculi est Tuberculum gravissimum in oculo ex inflammatione nascens, & ad Ophthalmiam referri potest.

Anthraco-  
sis.

*Synchysis.*

Art. 1040. Synchysis est humorum oculi confusa admixtio ab ictu, vulnere, vel contusione violenta. vid. vulnus seu contus. oculi.

Synchysis.

*Pterygium.*

*Etmulleri sententia.*

Art. 1041. Pterygium, vel (Latinis) Unguis, seu oculi pannus, est tunica quædam præternaturalis ab uno oculi angulo, frequentius interiori, enata, quæ successivè accrescendo tandem ad pupillam pervenit; interdum est tenuis, albida, interdum crassior, & carnosior, aspera, dolorosa, imò cancrofa, quæ non est attingenda.

Morbi des-  
criptio.

Curatio.

*Art. 1042.* Commendatur ablutio oculorum cum proprio lotio matutino, uſurpanda ſunt remedia abſtergentia, ut ſaccharum cand. os ſepiæ, crocus, vitrum, vel butyrum Antimonii, ſuccus chelidon. maj. vitriol. alb. In malo pertinaciori tuto confugiendum eſt ad *Mercur. ſublimat.* item *ſuccus formicarum rub. expreſſ.* & cum aq. ophthalmica appropriata permiſtus commendatur.

Differen-  
tia.

*Art. 1043.* Ungulam oculi diſtinguere ſolent in membranofam, varicoſam & adipofam; membranofa, aliàs panniculus appellata, eſt excreſcentia carnoſa ac nervoſa, quæ operationem valdè dubiam & incertam admittit; nec tractabilior eſt ſecunda ſpecies cultro tentanda, propter inſignem venarum dilatationem & turgelcentiam; ultimam adipofam ſcilicet coloris albicantis & ſubſtantix quodammodo pinguis, reliquis duobus benigniorem tuto extirpare licet, de operatione conſulatur *Author*, ut etiam *Celfus*.

Curatio  
& Pro-  
gnofis.

*Art. 1044.* Si Pterygium ſit recens, *arugine*, *alumine uſto*, *ſacchar. cand.* &c. abſumi poteſt, ſel animalium ſerè omnium valdè commendatur. Pterygium reverà eſt malum periculofum & curatu difficillimum; eſt etiam frequenter contagioſum ab uno oculo in alium tranſiens & ſerè ſemper metus eſt, ne cancroſum evadat.

### Proptofis.

Proptofis.

*Art. 1045.* Proptofis ſeu Straphyloma eſt revera *Hernia oculi* & iſto nomine designari debet: diſrupta etenim tunica cornea quocunque accidente uvea ſeiſpſam protrudit, Tumorem vel *Ramicem* faciens, qui a ſimilitudine aliquali rerum quarundam varia apud Græcos ſortita eſt nomina, uti *Straphyloma*, *Melon*, *Helos*, *Myocephale*, &c. (Vid. *Art. 1069.*)

Curatio.

*Art. 1046.* Quoad curam in principio haud incon-



CAP. X. *cognoscendis & curandis.* 373  
congruum erit experiri quid valeant *Collyria astringentia*, si ex horum usu spes frustretur, ad chirurgicam operationem accedendum est, nimirum ad evacuationem humoris aquei per *paracentesin*, quæ periculo vacat; iste enim humor de novo supplebitur, & vulnusculum curatu non est difficile.

### *Rhexis.*

*Art. 1047.* Rhexis est Tunicarum oculi ruptura tum humorum effluxu a vulnere, contusione violenta, vel ingenti exulceratione orta, cæcitatem perpetuam inducit, si humores omnes emanarunt. Nihilominus verò Globus oculi in hoc casu quandoque humore aquoso replebitur, utcunque tamen haud usque ad dimensionem naturalem: in hoc statu oculo artificiali vitreo deformitas eleganter refarcitur. Si solus humor aqueus reliquis in oculo manentibus effluerit, natura frequenter hunc denuo suppeditat, & oculi pulchritudo ac visio conservantur. Rhexis

*Art. 1048.* In hisce gravissimis oculorum læsionibus semper convenit *venesectio* quam ocissima, item *enematum* injectiones, & in vulnus vino rubro cum exiguo melle prius ablutum, instillandus est sanguis columbinus ex animali vivo, vel mixtura ex melle rosarum vitell. ovor. & lacte muliebri adhiberi potest, & superimponendæ sunt lintæ albumine ovorum cum tantillo alumine bene agitato imbutæ. Post hujusmodi Medicationem aliquandiu continuatam *Collyrium ex Myrrh. Alœ & Croc. in Aq. Rosar.* usui erit. Curesis

## Oule five Cicatrix.

## Covvardi sententia.

Albugo  
quid. Va-  
rietas &  
prognosis

*Art. 1049.* Albugo seu Leucoma est macula corneæ albescens; quod latior & crassior est, ed magis visum obscurat, & quod magis corneæ superfici ei incumbit, ed magis albicat, & quod propius ad nigredinem vergit, ed altius suas egit radices, & vix curabilis existit. Quæ e cicatrice relicta exoritur difficillimè dissipatur, quæ ophthalmiam sequitur, frequenter sua sponte facessit.

Curatio

*Art. 1050.* Totus curationis cardo in *emollientibus, res solventibus, seu discutientibus*, vertitur, quæ tamen cum summa cautela sunt usurpanda. Pro cicatricibus tollendis *topica* acriora, imò *cathartica* aliquando prudenti manu adhiberi debent, & primò tentanda est via lenioribus, & postea ad fortiora licet devenire. *℞. Rad. althæ. ℥j. folior. malv. euphrag. chelidon. maj. ana Mj. sem. lin. fenugr. ana ℥iij. flor. melilot. p. j. coq. in aq. font. q. s. ad ℥ij.* hujus decocti vapor oculis apertis calidè excipiat frequentissimè. Mallem ego in his oculorum medicamentis utendis formam *fomentationis*, quàm *vaporis* commendare, præcipuè si eidem decocto, dum caleseat, pauculas *salis* seu *spiritus alicujus volatilis* guttas instillaveris, quod tum fortè prodesse poterit, nisi nimiam affuderis spirituum quantitatem, quæ oculorum tunicas feriat, & irriter. Alii utuntur *saccharo cand. in aq. scenicul. seu euphrag. solut. Succus scenicul. vel chelidon.* cum guttulis aliquot *balsam. Peruv.* potenter albuminem discutit, inquit *Riverius*. Sequens ex *Riverio* feliciter expertus sum; *℞. Aq. ros. ℥v. dissolve in ea paulum salis armonias. ita ut linguam feriat, deinde imponatur in vase aurichalceo, donec ceruleum colorem acquirat. Fella animalium*  
præ-

CAP. X. *cognoscendis & curandis.* 375  
 præcipue *lucii piscis*, *succus chelidon.* &c. sunt re-  
 media calida & acrima, ideoque convenit ea excipe-  
 re mucilaginis *gum. tragacanth. sem. cydon. &c.*  
 vel cum pulv. *Trochisc. alb. rhaf.*

*Estmulleri sententia.*

*Art. 1051.* Albugo seu Leucoma est cicatrix al-  
 bida post variolas vel alia ulcuscula in oculo. Pro  
 nubecula & albugine delenda conveniunt *fel an-*  
*guilla*, *pl. papyri*, *succ. chelidon. maj. aq. saphirin.*  
*mercurius sublimatus.* "Solempne est apud Chirur-  
 ,, gos Gallicos ad vitium amovendum operatio-  
 ,, nem instituere, quam vocant *scarificationem ocy-*  
 ,, *li*. Instrumentum ad hoc opus perficiendum,  
 ,, quod *Scarificatorem* nominant, fit ex aristis hor-  
 ,, deaceis, N. xx. vel xxv. puta, ad instar peni-  
 ,, cilli colligatis; cum hujusmodi autem scopis si-  
 ,, ve verriculis oculum abradunt, quandoque usque  
 ,, ad effusionem exigui sanguinis, alternis vel  
 ,, tertiis forsan diebus idem repetendo ad quar-  
 ,, tam, quintam vel plures vices; finita in hunc  
 ,, modum singula scarificatione oculum cum aqua  
 ,, tepida multoties abluunt, imò ferè continuò  
 ,, per totum diem, & deinde noctu pulpam po-  
 ,, mi assati applicant: atque hæc est scarificatio-  
 ,, nis methodus; accuratiorem verò hujus opera-  
 ,, tionis rationem, non modo in hoc vitio, sed  
 ,, etiam in quibusdam aliis oculorum affectibus  
 ,, vernaculo sermone evulgandam brevi, ut opi-  
 ,, nor, exspectare licet.

Pro cicatrix in oculo  
 Remedia aliquot  
 Scarificatio Oculi.

*Hyposphagma.*

*Art. 1052.* Hyposphagma sive *suggillatio oculi*  
 est sanguinis ex ictu vel lapsu, ruptis aut contu-  
 sis vasis, vel alio modo apertis, in oculorum  
 tunicis adnata, vel cornea, in eademque effusio,

Hyposphagma.

colore primùm rubeo , poſtea livido vel nigro . Cui malo & hoc accidit , ſi corneam magis occupet ; objecta omnia colorem ad rubrum vergentem præ ſe ferunt ; nam & ad corneam venulæ porriguntur , ea parte , qua iridem ſpectat ; & ex vicinis vaſis ſanguis in eam effundi poteſt .

**Curatio .** *Art. 1053.* Si malum ſit ingens opus eſt venæſectione & purgatione , & topica debent eſſe diſcutientia . *Galenus* in initio ſotum uſurpat ex decocto *Fenugraci* & *Meliloti* & poſtea aſtringentia . *Sennertus* . In oculorum ſuggillationibus optimum eſt ſequens cataplaſma , *℞. Rad. ſymphyt. maj* ℥vj. ſigil. *Solomon.* ℥ij. flor. *fambuc.* ℥iſſ. farin. fabar. ℥j. coq. in q. ſ. aq. font. Decoctum ſit pro ſortu , & ex radicibus , &c. ſ. cataplaſma .

### Cataracta .

#### *Covvardi ſententia .*

**Definitio .** *Art. 1054.* Suffuſio ſive cataracta eſt pupillæ obſtructio ab opaco aliquo interpoſito inducta , quæ viſum minuit , aut extinguit . **Cauſæ .** Hujus affectus ſunt ut plurimum obſcuræ , aliquando tamen evidentes , uti contuſio , nimis aſſidua ad lucernam lectio , balneorum uſus inordinatus , & in genere quicquid fluxionem ad oculos promoveat ; **Differen-** *epiphora* nonnunquam in cataractam tranſit . **tia .** Differentiæ ſuffuſionum ſunt variæ , nempe 1. ratione craſſitiei vel tenuitatis materiæ , ex qua pellucula conſtat . 2. ratione coloris , an alba ſit , vel nigra , citrina , vel viridis , aut ſubſuſca . 3. a ſitu , num etenim uveæ , num corneæ propius adhæreat : Certum enim eſt cataractam ſemper inter uveam & tunicam ſcleroticam contineri , in quo nunc humore aqueo , inſtar ſyndonis , innatare & fluctuare videtur , nunc firmiter tunicis , præſertim uveæ , adhæreſcere .

*Art. 1055.*

*Art. 1055.* Suffusio in initio discuti potest, ut multi fidei integerrimæ authores testantur. Suffusio nigra, nec medicamentis, nec acu curabilis est. Sequens est optima regula de cataractis, scilicet; *si quando videatur accrescere, & discutientium medicamentorum vires excedere, sufficienti temporis serie permittatur callescere, donec acui depositoria idonea naturaliter reddatur.* Modus operationis perficiendæ unicus est; intrudendo, scilicet, acum depositeam per adnatam & corneam e minoribus oculorum angulis versus nasum, & cataractam eadem involvendo; tandemque ad oculi basin deponendo, ut ibidem resideat, seu leni manu figatur. Post hæc æsitatum est, quietem per plures dies patienti imperare vel in lecto vel extra, & *stypticis* aliquibus seu medicamentis *agglutinantibus* oculum malè affectum obducere.

Curatio:  
Regula de  
Cataractis

Operatio:

*Art. 1056.* "Statim post operationem simul ac  
"acus oculo evulsa fuerit, instillandæ sunt guttæ  
"aliquot *sanguinis columbini* a vivo animali, &  
"toti oculo superimponantur lintæ duplicatæ *albumine ovorum cum frustulo aluminis conquis-*  
"sato & *tantillo melle rosaceo bene irrigatæ.*

Post operationem  
quid faciendum

*Art. 1057.* "Suffusio, quæ a morbo aliquo graviore, a pertinaci cephalalgia, vel a contusione violenta ortum duxerit, est omnium longè pessimæ indolis. Suffusiones, quæ sunt virides, vel cineritiæ, item quæ ferri rubiginosi, margaritarum vel testudinis marinæ colorem referunt, acu curabiles sunt: e contra suffusiones nigræ vel flavæ, item cretæ, plumbo, malo citreo, colore similes, non attingendæ sunt. Præter colorem, ratio etiam habenda est substantiæ, & consistentiæ suffusionum, quæ a frictione oculi palpebris operiti dignoscendæ sunt; frictio enim oculi cum digito suffusionem reddit latiore & extensiore cum vel sine disruptione; si autem pristinam figuram statim recuperat

Prognosis.



„cuperat sine disruptione, operationem fausto e-  
 „ventu successuram esse sperare licet; sin verò  
 „ex frictione suffusio in partes & frustra desiliat,  
 „operatio nullatenus molienda est, sed cunctan-  
 „dum est donec suffusio firmior & maturior eva-  
 „serit.

Nota quæ-  
 dam.

*Art. 1058.* “ De operandi modo alibi dictum  
 „est (*Art. 1055.*) sed in ipsa operatione quæ-  
 „dam adnotanda occurrunt; ibidem minus me-  
 „morata. In cataractis adhuc imperfectis inter-  
 „dum simul ac acus infigitur, statim oculus *inun-*  
 „*datione humoris lactei impleri* videtur, quem ab  
 „ipsius cataractæ vesiculis acu sauciatis proveni-  
 „re credibile est. Quandoque oculus acu intro-  
 „ducta *cruore plenus* conspicitur. Alias intromissa  
 „acu *cataracta statim duplo grandior* augeri vide-  
 „tur, *tuberosis ostrearum testis (vel spermatis rana-*  
 „*rum in paludibus)* quodammodo similis. Hæc  
 „accidentia saltem ad tempus operationi impedi-  
 „mento esse solent. Cataractæ nonnullæ, utcun-  
 „que aspectu benignæ ac pulchræ ante operatio-  
 „nem conspiciuntur, sunt tamen adeo *tenaces ac*  
 „*rigidæ*, ut acui depositoriæ obtemperare omni-  
 „nò respuant, & quoties infra detruduntur, to-  
 „ties iterum assurgunt. Aliæ etiamsi septennes  
 „vel octennes fuerint, sunt tamen *molles tan-*  
 „*quam gelatina*, atque ita vim acus eludunt.  
 „Aliæ *Uveæ* tam firmiter adhærent, ut acu sepa-  
 „rari nequeant, atque hæ sunt omnium pessimæ  
 „ab ictu vel confusione violenta ortum plerum-  
 „que ducentes. Quod ad accidentia antedicta,  
 „nimirum *humoris lactescentis, cruoris, &c.* in  
 „operatione contingentia, attinet, octiduo vel  
 „noniduo plerumque sponte evanescere solent,  
 „reliquiæ tamen quædam aut fragmenta interdum  
 „manere possunt. Post operationem visio quan-  
 „doque statim, sed frequentius circa nonum  
 „diem aliquatenus succedit, at non perfecta &  
 fortis

CAP. X. *cognoscendis & curandis.* 379  
 „ fortis ante duas vel tres septimanas, vel forsan  
 „ tot menses præteritos expectanda est : *Banister*  
 „ & alii.

*Pitcairni sententia.*

*Art. 1059.* Signum pathognomonicum a *Riverio*, *Plempeio*, & aliis traditum suffusioni nullatenus convenit, nempe affirmant suffusionem tum ingruere, cum varia simulacra ante oculos volitant, pili, araneæ & similia, quæ apparitiones ex omnium opinione, si perpetuò offerantur, est vera & legitima suffusio : has apparitiones ascribunt corpusculis humori aqueo innatantibus, quæ cataractam efformant, verum naturam oculi ignorant : Nam corpuscula humori aqueo innatantia nullum sensum in retina depingunt ; imò ea quæ corneæ exteriori adhærent nullam sui in retina picturam exprimunt, nec cicatricis corneæ nulla est imago, neque ob eam vel eas (si plures sint) ullæ rerum obvolitantium fiunt apparitiones : Ea enim est concavitas retinæ, ut ad objectum in ea depingendum, hoc est ad congregandos in uno ejus puncto omnes radios, e quovis objecti puncto emissos, debeat objectum visibile removeri a retina ultra distantiam corneæ a fundo oculi. Hinc sequitur, si incipienti cataractæ conjungantur etiam simulacra muscarum &c. tum oculi etiam *Gutta Serena* laborant.

*Error Ri-  
verii, Ple-  
peii, &c.*

*Farrago sententiarum.*

*Art. 1060.* Si suffusio sit profunda, pupilla angusta apparet ; intra sex menses plerumque confirmata evadit. Oculo digito compresso suffusio nonnihil diffuens & latior facta, postmodum ad pristinam magnitudinem revertens nondum matura est ; si verò nullam patitur mutationem dis-

*Prognostica signa  
aliquot.*

seuri

380 *Tractatus de Oculorum Morbis* CAP. X.  
 enti potest. *Riverius*. Si oculus suffusione affectus  
 soli obversus nullam possit lucem percipere; frustra  
 est omnino operationis periculum facere; est etenim  
 cataracta cum *Amaurosi* conjuncta, quod malum  
 est incurabile. *Barbette*.

Opacitas  
 humoris  
 crystal.

*Art. 1061.* Cataractam reverà ut plurimum nihil  
 aliud esse quam opacitatem præternaturalem humoris  
*Crystallini* videre licet *Transact. Philosoph. N.*  
 373. Et hanc fuisse opinionem plurium Chirurgorum  
 Gallicorum, viz. *Maitre Jean, Antoine, Bis-*  
*sau, Heister, &c.* ex horum authorum lectione  
 planè constat: Cataractas autem membranosas ra-  
 rissime occurrere ferè omnes consentiunt. (vid. *Ar-*  
*t. subseq.*)

### *Glaucoma.*

Glaucoma

*Art. 1062.* Glaucoma est mutatio humoris cry-  
 stallini in glaucum colorem humore cristallino per  
 exsiccationem condensato. *Oribasius in lib. viii. cap.*  
 47. dicit, Glaucoma & suffusionem veteres unum  
 eundemque morbum esse existimaverunt. *Paulus Æ-*  
*gineta* idem asserit. Valdè curiosæ sunt disquisitio-  
 nes Gallorum de distinctione inter suffusionem &  
 Glaucoma. vid. *Acad. sci. Vol. XII. p. 47. item*  
*Vol. XXII. p. 36. &c.* Posteriores tamen Græci  
 propriè Glaucoma saltē pro humoris cristallini in  
 glaucum colorem mutatione accipiunt. Quod ubi fit,  
 visio impeditur; nam humore isto pelluciditate spo-  
 liato species visibiles ad retinam perfectè transferri  
 nequeunt. Cognoscitur hoc malum; quod citra pu-  
 pillam insignis & profunda apparet albedo, & om-  
 nia tanquam per fumum aut nebulam videntur. A  
 cataracta ergo distinguitur, quod albedo profundior  
 appareat, in cataracta in ipsa pupilla & ferè juxta  
 corneam, *Sennertus*. (vid. *Art. precedentem*.)

*Situs*

*Situs Humoris Crystallini vitiat.*

*Art. 1063.* Est & aliud vitium humoris Crystallini, viz. *Situs naturalis mutatio*, ubi, scilicet, latiore sua parte, quæ lentis majoris instar compressa est, Pupillæ foramini non recta opponitur, sed vel sursum, declinat, vel deorsum, vel ad latera; & quidem si Crystallinus humor situm mutet in uno oculo, in altero vero naturalem retineat; vel si ambo difformiter situm mutant, ita ut later sursum, alter deorsum, vel ad latera vergat, res geminatae apparent; *mutatur enim planum*, ut loquuntur optici; hic affectus, sicut antecedens, est omnino incurabilis. *Sennertus.*

Situs humoris Crystallini vitiat.

*Epiphora.**Covvardi sententia.*

*Art. 1064.* Epiphora est præternaturalis oculorum defluxio, quæ *Anglis* sonat *a Rheum in the Eyes*; humore scilicet seroso acri ferè continuo depiunt oculi genas excoriante.

Epiphora quid.

*Art. 1065.* Intentiones curativæ sunt 1. humoris peccantis aliò derivatio per venæsectionem, cucurbitulas, vesicatoria, cathartica, &c. 2. acrimoniæ per remedia idonea correctio, quæ plerumque vino chalybeato amaro feliciter peragitur; aliquando vinum simplex liberaliter epotum epiphoram sanat (præcipue non assuetis idem bibere) & postremo, præmissis rectè prædictis evacuationibus & alterantibus, *topica astringentia* adhibere licet.

Curatio.

*Pitcairni sententia.*

*Art. 1066.* Epiphora est quasi species catarrhi in glandulis oculorum. Præmissis universalibus

Oculorum catarrhus, eiusdem curatione.

usur.

usurpandi sunt *fotus astringentes*, *linimenta*, & *collyria*, &c. Cataplasma sequens ex *Platero* egregias habet vires; ʒj. *Pulp. pomorum acidorum* (vulgò v. n. l. diei) in aq. ros. macerat. ʒij. *mucilag. sum. fœnugr.* ʒß. *album. unius ovi. lapid. hematit.* ʒß. *cori. granat.* ʒj. *ol. ros. q. s. m. l.* Cataplasma tepidè applicandum.

*Farrago sententiarum.*

Aq. oph-  
thalmica  
præcellens

*Art. 1067.* Epiphora antiqua; & quæ senibus accidit, difficulter curatur, imò frequenter in *fistulam lacrymalem* degenerat. Remedia in principio debent esse *viscæ astringentia* & postea *siccantia*; *lapis calaminaris* est singularis. Aqua ophthalmica sequens ex *Hoffmano* valet ferè in omnibus oculorum affectibus usque ad miraculum ʒj. *Vin. rhenan.* Aq. *plantag. rosar. ana* ʒij. *tut. præp.* ʒij. *myrrh. elect. pulv.* ʒß. coq. ad tertiæ partis consumptionem sub finem in nodul. suspend. pulv. *virid. aeris.* ʒj. *camphor. gr. viij.* colatura sine expressione sit pro usu; utilissima quoque est aq. *saphirina*, item *collyrium certum*.

Rheuma  
oculi.

*Art. 1068.* Huc pertinet; si non idem sit, Rheuma sive *fluxus Oculi*, vel *delacrymatio*, quod est serosorum vel tenuium humorum ab oculo profluvium, sine insigni inflammatione; a *Fistula lacrymali*, vel ab *ungula* malè curata quandoque oritur, tunc prorsus incurabilis existit; vulgò vocatur a *Weeping Eye*.

*Proptosis.*

Proptosis.

*Art. 1069.* Proptosis est exitus oculi fere ex orbita, ex contusione, &c. vid. contusionem Oculi & Vulnera *Art. 1052. 1073.* huc referri potest buphthalmia, magnus oculus, sive oculi valde prominentes, vulgò *Goggle Eyes*, a naturali conforma-



CAP. X. *cognoscendis & curandis*. 383  
formatione oriundi. Quomodo ab alio morbo eodem nomine insignito differt. [vid. *Art.* 1045.]

*Atrophia*.

*Art.* 1070. *Atrophia oculi*, sive imminutio, profunditas vel macies oculi, est quando omnes oculi partes imminuuntur & contabescunt. Nusquam hunc morbum; ut meminil, tanquam *particularem* inveni; nisi a tabe universalis provenientem; *Celsus* verd & alii hunc agnoscunt; aded infrequenter, ut opinor, contingit, ut peculiarem medelam vix postulet: ad hanc classem pertinet *Microphthalmos*, sive parvus oculus, *The Pink Eye* or *the Pig-Eye* a naturali conformatione ortus.

*Mydriasis*.

*Art.* 1071. *Mydriasis*, sive *Pupilla Dilatio*, est cum foramen illud, quo uvea tunica ad species visibiles admittendas donata est, ita præter naturam versus iridis circulum ampliatur, ut visio hac de causa lædatur. Objecta visibilia grandiora apparent & minus distincta: alia est *nativa*; alia *adventitia*, prior est incurabilis; si a siccitate oriatur, humectantia indicantur. Interdum est *gutte serene* prodromos;

*Meiopsis*.

*Art.* 1072. *Meiopsis*, sive *Pupilla Angustia*, est malum præcedenti contrarium; nimirum cum pupilla angustior est quam naturaliter esse debet. Hi affectus insanabiles sunt.

*Plege*.

*Art.* 1073. Oculorum vulnera, sive a punctura, incisione, vel contusione sunt periculossima.

384 *Tractatus de Oculorum Morbis* CAP. X.  
 ma. Omni arte fluxus humorum inhibendus est,  
 viz. venæ-sectione, hirudinibus, elysmatibus,  
 vesicantibus, intercipientibus, &c. & febris sup-  
 primenda testaceis, emulsionibus, &c. Interim  
 remedia externa sunt ante omnia *Sanguis colum-*  
*binus e vivo animali in oculum vulneratum in-*  
*stillatus, aq. ordei & mel rosar. pro collyrio, o-*  
*xyrhodinum i. e. acetum, in quo sol. ros. rubr.*  
*incocta fuerint cum albumine ovor. conquassat. pro*  
*defensivo.* Sequens cataplasma habet *Turner. Ars.*  
*Chirurg. p. 370. Vol. I. 24. Fol. ros. rubr. sambuc.*  
*ana Mj. coq. in q. s. lact. vaccin. colatur. fls.*  
*add. mic. panis alb. q. s. ut reducatur leni coctio-*  
*ne ad debitam consistentiam sub finem addendo*  
*vitellum unius ovi cum tantillo croco minutim scis-*  
*so, s. cataplasma subtepidè applicand. illinendo*  
*prius palpebram tumefactam cum ung. sambucin.*  
*consulatur author loco citato.*

### *Elcos.*

*Elcos.*

*Art. 1074.* Ulcera in tunica conjunctiva vel cor-  
 nea, a quacunque causa oriuntur, a vulnere, in-  
 flammatione, a variolis vel combustionibus, &c.  
 periculosa sunt, & aliquando curatu difficilia, &  
 semper metuendum, ne opacam cicatricem post se  
 relinquant.

*Curatio.*

*Art. 1075.* Quoad curam, materia ad oculum  
 fluens divertenda est & evacuanda, sordes deter-  
 gendæ, dolor, si adsit, mitigandus, & nativa  
 oculi temperies restituenda & conservanda. De-  
 tergentia & exsiccantia sunt usurpanda, lenia ta-  
 men & temperata, sine asperitate & mordacita-  
 te. Ad ulcera detergenda ( inflammatione, si ad-  
 sit, prius penitus sublata ) vix datur præstantius  
 remedium quam *aq. ophthalmica sapphirin. Bat.*  
 & deinde *collyrium ex sarcocol.* in cap. de oph-  
 thalmia laudatum, & postremo *collyr. tum tra-*  
*chisc.*

CAP. X. *cognoscendis & curandis.* 385  
*chisc. alb. rhas. cum camphora, sacchar. saturn. vel*  
*lap. calamin. præp. &c. oleum ovorum valdè com-*  
*mendatur.*

Art. 1076. D. Banister a priscis medicinae scri-  
ptoribus octo vel decem species ulcerum in oculo  
accidentium enumeravit, ut *ulcus rotundum, inu-*  
*stum, sordidum, depascens, cancrosum, &c.* Sed  
distinctio nimis subtilis videtur. Verùm enim verò  
notatu dignum est ulcus istud, quod *Græci Peribrosin*  
nominant in Angulo oculi cum pruritu vix  
tolerabili conjunctum. Sequens medicamentum ab  
autore valdè comprobatur. ʒi. *Mucilag. sem. cy-*  
*don. lin. in aq. plantag. & parietar. extract. ana ʒi.*  
*vitriol. alb. in aq. rosar. solut. ʒʒ. vitriolum album*  
*est antidotus ad pruriginem.*

Species  
variae.

### *Cervardi sententia.*

Art. 1077. Omnia oculorum ulcera sunt pericu-  
losa & curatu difficillima. Totus curandi cardo in  
usu *detergentium & exsiccantium* vertitur, quibus  
tamen sæpissimè addi debent *lenientia* sive *anodyna*.  
Non difert horum ulcerum ab aliorum curatione  
methodus tractandi, nisi quodd ob teneritudinem  
& insignem partium usum cura non vulgari susci-  
pienda sint. Porro his in casibus conveniunt *aggluti-*  
*nantia* cum *detergentibus* mixta; inter quæ liquorem  
ex ovo cocto & indurato sacchari cand. q. s. reple-  
to in cella vinaria extillantem maximè commen-  
dat *Riverius*; quod medicamentum, si magis *ab-*  
*sterisivum* desideres, addito *myrrha pulverisate* pau-  
cùlo saccharo cand. supra præscripto, magis profi-  
cium reddetur.

Prognosis,  
& curatio  
ulcerum  
ocularium

### *Paralysis.*

Art. 1078. Paralysis oculi est affectus musculo-  
rum ocularium paralyticus, ex quo motus vel peni-  
tus

Paralysis.

Bb

tus

386 *Traſſatus de Oculorum Morbis* CAP. X.  
tus amittitur vel multum impeditur. Eſt malum,  
uti credo, rariffime contingens; utcunque nihil  
habet in ſe peculiare a paralyſi aliarum partium  
diſverſum quoad theoriam vel therapiam.

### *Strabismus.*

*Strabiſm.* *Art.* 1079. Strabiſmus ſeu ſtraboſitas eſt oculo-  
rum unius vel utriuſque reſpectu ad ſe invicem  
diſtortio, ſive *obtus tranſverſus*, vulgo a *Squin-*  
*zing*. Ex inæquali muſcolorum ocularium exercitio  
provenit. Infantes hunc affectum facile contra-  
hunt; interdum ob incuriam nutricum, quæ ma-  
lo ſitu, ad fenestram cunabula diſponunt. Adole-  
ſcentes quoque interdum in eum incidunt, vel a  
vitioſa oculorum praxi, vel a contagione, dum  
alios hoc morbo affectos intuentur.

*Curatio.* *Art.* 1080. Strabiſmus difficillime curatur; ſi a  
cunabulis perperam verſus fenestram locatis or-  
tum duxerit, mutanda eſt orum ſituatio. *Paulus*  
*Ægineta* ad hoc vitium emendandum larvam ma-  
chinatus eſt, & faciei adaptavit, ita ut per duo  
foramina recta tantum antrorſum liceret proſpice-  
re. Ego ad adoleſcentulum quendam generoſum  
ſtrabiſmo affectum accerſitus, ſtatim ac intellexi  
unum tantum oculum affici, conſului, ut *ſanus*  
*ſubligaculis probe claudatur* per duas ſeptima-  
nas, quo facto alter oculus omnimodorum mo-  
tum liberrime potitus integre ſanatus eſt, &  
in futurum cum altero motus ſociales recte ſer-  
vavit, & nunc elapſis aliquot annis ſine recidiva-  
tione juvenem eleganti forma præditum in bonum  
virum evalurum fore ſpero.

### *Encanthis.*

*Encanthis.* *Art.* 1081. Ex curatione unguis vitia naſcun-  
tur, quæ ipſa aliis quoque de cauſis oriri ſolent.  
In-

CAP. X. *cognoscendis & curandis.* 387

terdum fit in Angulo parum ungue exciso, vel aliter, tuberculum, quo palpebras parum diduci patitur: *ἔγχεσις* græcè nominatur. Excipi Hamulo, & circumcidi debet: hic quoque diligenter temperata manu, nequid ex ipso Angulo abscindatur. Tum exiguum linamentum respersendum est vel cadmia, atramento sutorio, &c. *Celsus.*

*Art. 1082.* "Encanthis est excreſcentia carno-  
sa in majori oculi angulo carunculæ lacrymali  
adhærens; si mollis & laxa fuerit; *Alumine*  
uſto & *saccharo cand.* deleri potest; sin vero tu-  
mor sit durior & grandis filo per medium trans-  
misſo detinendus est, & forcipe abſcindendus;  
& vulnus tinctura myrrhæ & melle roſaceo fo-  
vendum: "*Kennedy.* "In operatione ſuſcipien-  
da cavendum est; ne *glandula lacrymalis* nimium  
lædatur, exinde enim fluxus oculi perpetuus  
continuo in genam deſluens ſupervenire ſolet;  
quemadmodum in fiſtula lacrymali malè cura-  
ta plerumque accidit. "(Vid. *Art. 1068.*)

Fistula Lacrymalis.

*Covvardi ſententia.*

*Art. 1083.* Anchylops, Ægilops, & Fiſtula lacrymalis apud authores promiſcuè uſurpantur; *Morbi nomina & deſcriptio.*  
ægilops verò est tumor (vel potiùs ulcuſculum)  
carunculæ majoris ad internum oculi canthum;  
anchylops nominatur, cum adhuc nondum ſit ul-  
cerofus; fiſtulā lacrymalis propriè appellatur,  
quando ulcus ſinuofum ibidem efformatur; com-  
preſſione digiti liquor e cantho ovi vitello ſimi-  
lis & foetorem emittens extillat; humor corro-  
ſivus viam facit, aut invenit, unde meatus cola-  
torii nimis patentes facti, perpetuo ſtillicidio vex-  
antur; imò frequenter os *ethmoideum* penetrat; ero-  
dit;



dit, & ad *cariem* miserabilem deducit; in quo statu non nisi *cauterio* actuali curabilis est, huiusmodi fistula frequenter cancerosa evadit, & tunc *Riverius* monet remediis non esse attingendam.

**Curatio.**

*Art. 1084.* Cura est totaliter chirurgica, nisi quod intus dari possunt pauca *evacuantia* & remedia quædam humorum acrimoniam *destruentia*, præcipue *mercurialia*, & decoctum *e lignis*. In initio si *anchylops* adhuc sit, *repellentia* maxime proficua sunt, ut suppuratio præveniatur; huic usui inserviunt *refrigerantia*, *astringentia*, & *vitriolica*. Si verò nec refrigerantibus repelli nec solventibus discuti poterit, quin ad suppurationem vergat, aperiendus est abscessus, & *detergentibus*, *consolidantibus*, ac *cicatrizantibus* secundum artem tractandus. Alii sunt qui curam ægilopis molitur *instrumento chirurgico*, per os nasi tramitem perforando, quo liquor perpetuo extillans per nasum evacuatur. "Sed graviter errant, qui existimant *perforationem* hoc commodum præstare, ut materia per os effluat; foramen enim ossi a carne ex ipso pullulante brevi obstruitur. Os non est perforandum nisi præsentem maximam ipsius corruptionem, quæ perveniat usque ad cavitatem internam ipsius nasi; sola siquidem ejus superficie corrupta sat fuerit partem læsam scalpello abradere, euphorbium inspergere, &c. præmitti debet *setaceum*, quod tanti est momenti, ut inveteratam fistulam lacrymalem sine hoc præsidio vix curari posse in aliquibus observaverim." *Hercules, Saxon. & Hildanus.*

## Visus Hebetudo.

## Covvardi sententia.

*Art. 1085.* Hebetudo visus est caliginosus videndi modus, cum objecta visibilia nebula velut tenui obvoluta apparent; primus est hic status ingruentis mali peioris, nisi præveniat, prodromus; & *cataractam* aliquando ob incuriam patientis, aut inlicitam medici inductam præcurrit. A statu sanguinis viscido & pituitoso oriri potest, Unde. vel a spirituum animalium penuria, vel ab humoris in oculo defectu, vel ex mala partium conformatione.

*Art. 1086.* Ad hanc oculorum hebetudinem discutiendam indicantur remedia, quæ sanguinis lentorem tollunt & quæ spirituum animalium penuriæ occurrunt. Quandoque convenit *venesectio*, & deinde *catharticum cum calomel.* exhibere. *Millepedes* inter specifica recensentur: *salia volatilia* & *deobstruentia* in sanguinis lentore mira præstant; salivationem per *masicatoria*, potius quam *tabaci* fumo, excitatam prodesse autumo, *cerevisia oxydorica pharmac.* Bat. propinari potest; *collyria vitriolica* & *astringentia* sunt vitanda; convenit *aqua ophthalmica sapphirina* Bat. In genere duæ regulæ ad visum utilissimæ, licet non usquequaque sufficientes statuuntur. 1. Ut manè quolibet, nullo habito ad tempestatem respectu, *frigida* caput; tempore, & ponè aures alluamus. 2. Ut a *calidis* & *piperatis eduliis*, nec non *potulentis spirituosiss*, quantum fieri possit, absteineamus.

*Art. 1087.* “Euphrasia quoquo modo sumpta, seu in pulverem redacta, & cum vino albo pota, seu per se sola masticata & deglutita, seu in vino vel cerevisia infusa, seu in aqua ad modum theæ, seu succus ejus expressus, videtur

390 *Tractatus de Oculorum Morbis* CAP. X.  
 „ di facultatem mirificè roborat & adauget, debi-  
 „ lem aut amissam reparat & restituit. Arnoldus  
 „ de villa nova & alii,

### Gutta Serena.

#### Covvardi sententia.

**Definitio.** *Art. 1088.* Gutta serena seu Amaurosis est visus abolitio, sine ullo sensibili vitio in oculis apparente, ab obstructione *nervi optici* orta, influxum spirituum animalium prohibente. Quæ a causa quacunque subitanea exoritur facilius curatur, quam cui deplorabile illud infortunium obrepit. In vera amaurosi pupilla nigrior & amplior solito apparet, sed non semper, & gravitas supercilia premit.

**Curatio.** *Art. 1089.* Quoad therapiam post universalia (ubi indicantur) medicamentis *volatilibus, antiscorbuticis, chalybeatis, mercurialibus, cephalicis, & nervinis* cura tentanda est; vix aliquid sperandum est a *topicis*; si aliquibus utamur, debent esse discutientia.

#### Pitcairni sententia.

**Signum pathognomonicum.** *Art. 1090.* Si nullis ophthalmiæ signis apparentibus, muscæ aut araneæ & similia oculis obversari videntur, signum est *pathognomonicum* guttæ serenæ nascentis.

*Art. 1091.* Curatio hujus affectus medicamentis *mercurialibus* tentanda est, imo *salivatione* & decocto *guaiaci*.

**Curatio.** *Art. 1092.* “ Tutiora sunt *purgantia* (inquit *Ettmullerus*) quam *vomitória*; conveniunt *su- dorifera*, maxime *sassafras* & *euphrasia*, *junip.*, *rosmarin.*, *millepedes*, *masticatoria*, &c.

### Myopia.

*Myopia.*

*Art. 1093.* Myopia, sive luscitio, est propinqua visio, quam nos Angli vocamus *Purblindness*; a naturali conformatione oritur; qui autem oculis ita formatos habent, nunquam cæcutiunt, neque conspiciendorum in extrema senectute indigent. Myopia.

*Presbytia.*

*Art. 1094.* Presbytia est affectus myopiæ contrarius; e longinquo melior est visio, quam propinqua; senibus præcipuè accidit, & est malum prorsus incurabile: conspiciendi verò egregio sunt adjumento. Presbytia.

*Nyctalopia.*

*Art. 1095.* Nyctalopia est malum duplex, cujus species duæ sunt sibi invicem contrariæ. In prima specie visio noctu vel in locis obscuris est præstantior, in clara luce valdè diminuta & ferè nulla. In altera specie nisi clara & splendida luce nihil omnino cernitur. Hæc sunt vitia a mala constructione oculi orta, ideoque incurabilia. Nyctalopia.

*Hæmorrhagia Narium.**Sydenhami sententia.*

*Art. 1096.* Nonnullæ febres intercurrentibus annumerari debent, quæ vulgò pro symptomaticis tantum habentur; hujusmodi sunt hæmorrhagia narium & hæmoptoe. Primo ut plurimum appulsu febris præ se fert indicia, qua derepente sibi per nares, qua data porta, faciente viam; dolor & calor Hæmorrhagia narium & hæmoptoe interdum a febre pendent.

incipit adhuc torquent; sanguis per vices profluit, dein aliquandiu sistitur, & mox denuò iterum atque iterum erumpit; donec tandem remediorum usu vel sponte omnino cessat, ita tamen ut ægro singulis annis a recidiva metuendum sit.

Curatio.

*Art. 1097.* Sanguinis fervorem nimium atque ebullitionem ut compescamus, convenit *venasectio* (sanguis eductus est pleuriticorum similis) item *vicus tenuis ac incrassans* imperandus est; quotidie injiciendum est *enema refrigerans*, & dosi *diacodii* hora somni exhibenda est. Quoad externas applicationes, lintea quadruplicata immersa *aqua frigida*, in qua *sal prunellæ* dissolvatur, & postea leviter expressa admoveantur nuchæ, ac utrinque cervicis sæpius in die. Item post universas evacuationes peractas liquor sequens applicetur; *℥. Vitriol. hungar. alum. ana ʒj. phlegmat. vitriol. ℥ss.* coque tamdiu, donec omnia fuerint dissoluta, liquorem frigefactum filtra, & add. *ol. vitriol.* partem duodecimam; turunda ex linteo raso liquore hoc probe humectata, nari ex qua sanguis stillat, indatur per dies duos isthic relinquenda.

Cortex  
peruv.

*Art. 1098.* " Quod hæmorrhagia narium a febre pendeat, *cortice peruviano* profigari potest, æque ac hæmoptoe, de qua alibi. ( 536. )

Nota bene.

*Art. 1099.* " Opinione vulgari hæmorrhagias or-  
,, dinariò ex arteriolarum evanescentium ruptura  
,, accidere statutum est; Sed in errore magnopere  
,, versantur: in omni etenim *critica saltem hæ-*  
,, *morrhagia* sive narium, sive partium circa fauces  
,, & guttur, sive pulmonum, sive renum, sive hæ-  
,, morrhoidum, sive uteri, sanguinis fluxus *me-*  
,, *diantibus glandulis* omninò fit, *per ductus scili-*  
,, *cet excretorios* sanguis exilit, quod probe notan-  
,, dum est.

Estmul.



## Etmulleri sententia.

*Art. 1100.* Quidam hypochondriaci, scorbutici & cachectici variis & stupendis hæmorrhagiis obnoxii sunt, ita ut sanguis non unciatim, sed libratim effluat.

Quinam hæmorrhagiis obnoxii sunt.

*Art. 1101.* In nimia effervescentia & sanguinis fervore conveniunt *blanda acida*, item succus *menth. urtic. &c. martialia* pluribus scopis in curandis hæmorrhagiis satisfaciunt: *martialia* etenim per se semper astringunt, per accidens aperiunt, ut observare licet in mensibus nimis fluentibus & obstructis. Ipse novi exempla infantum & adultorum etiam frequenter hæmorrhagiis narium obnoxiorum solo usu *passularum* curatorum. In hæmorrhagia *habituali* sequens electuar. est proficuum; *℞. Pulp. passular. ℥ss. pulv. rhabarb. ʒij. tart. vitriolat. ʒj. syr. cydon. q. s. m.* (Materia medica in hæmorrhagia latè patet, sequentia simplicia sunt insigniora) *folia plantaginis, urtic. millesol. heder. terrest. polygon. flor. ros. rub. balaust. cort. granat. rad. symphyt. maj. bistort. tormentil. muscus terrest. gallæ, sem. hyoscyam. papaverina, (catechu) usnea cran. human. gum. arab. sang. dracon. lapid. hæmatit. tinct. mart. sacchar. saturn. stercus asininum aut suillum & caninum. Externè buso sicc. stercus porcinum recens excretum. bol. armen. pilul. leporin. crepitus lypi, alumenustum, &c.*

Hæmorrhagia habitualis.

## Farrago sententiarum.

*Art. 1102.* Phlebotomia ad revellendum ampliori foramine celebrari debet, & ut magis confertim sanguis effluat, inter detrahendum eundem multum prodest vulnus sæpius digito occludere, dein aliquantulum sanguinis emittere.

Aliquid notandum in V. 3

*Art. 1103.*

Deligatio  
artuum.

**Art. 1103.** Deligatio artuum hæmorrhagiæ sistendæ conducit; potandum est tamen artus omnes simul non diu ligandos esse, quoniam sanguis in extremis diu detentus, & a corde nimis exulans lipothymias terribiles inducit. *Album græcum* in omnibus hæmorrhagiis est medicamentum singulare; *spiritus vitriol.* vel *ejusdem ol. in aq. simpl. instillat.* in hæmorrhagiis periculosis est extremum remedium & raro fallax.

Remedia  
varia.

**Art. 1104.** Reliqua melioris notæ sunt *calcanthum rubefactum*, *colophonium pulverisatum*, *stypticum regis*, *ol. terebinth. decoct. catechu*, *decoct. incrassans*, *decoct. styptic. elect.* Boyleanum, *pulvis Galeni*, *elect. styptic. tinctura rosar. epithema de sacchar. saturni* in casu deploratissimo moribundo post omnia tentata feliciter expertus sum.

Olfactus amissus.

Ettmulleri sententia.

Olfactus  
amissus  
raro cura-  
tur.

**Art. 1105.** Olfactus amissus rarissimè recuperatur, præcipuè in senibus. Præ reliquis multùm confert *majorana* quocunque modo usurpata, item *rosmarinus*, suffitus ex *succino. gum. animæ*, &c. quæ valent in *catarrho* hic locum habent. (470.)

Ozæna.

**Art. 1106.** Ozæna est ulcus sordidum in naribus latens, frequenter est venereum, interdum cancriforme evadit.

Curatio.

**Art. 1107.** Ad curationem conveniunt folia & unguentum *e nicotiana*; si crusta adfuerit, cum *oleo amygd. dulc.* removenda est; interdum usurpantur fumi ex *cinnabar. & mercur. dulc.* in injectionibus; imò nonnunquam *mercurius sublimat.* Galli utuntur *mercur. præcip. cum unguent. ros. su- baët.* & cum turundis applicato. (972.)

Polypus  
narium.

**Art. 1108.** Polypus narium est sarcoma seu ex- crescentia carnosâ in naribus ex earum summitate prona.

pronascens, & nasum nunc replens, nunc in fauces usque descendens, a *polypo pisce* nomen accepit, nunc mollis est, & lubrica, nunc una nunc pluribus radiculis se affigit. Excrefcentia hæc nunc alba, nunc rubra, nunc livida apparet, si livescit, & dolet, ferè cancrösam naturam sapit; & non attingendus est polypus cancrösus. Polypus narium est malum curatu admodum difficile. *Rhasis* polypum *hemorrhoides narium* appellat ob similitudinem. De ejusdem extirpatione videantur scriptores chirurgici. Si in ulcus cancrösus degeneraverit, admittit curationem fictam & fucatam, in hunc finem unguentum sequens est valdè proficuum, *Unguent. de plumbo, succ. solan. ana ʒi. aq. ros. ʒß.* diutissimè agitentur in mortario plumbeo & f. ungt.

Rasq. ex-  
ratur.

*Art. 1109.* Riverius distinguit inter *sarcoma* & *polypum*, & quidem jure merito; *Sarcoma* (inquit) est excrefcentia carnea in naribus genita, *hypersarcosi* simillima in imis narium partibus succrescens; Polypus verò in summis ac superioribus juxta nasi radicem. Cura tentanda est primò astringentibus lenioribus, & deinde medicamentis potentioribus, inter quæ eminet *mercurius*; *remedia adhuc magis caustica* cum cautela usurpanda sunt, idque *decrecente luna*, cum tumor imminuitur.

### Lingux Vitia.

#### *Ettmulleri sententia.*

*Art. 1110.* Gustus læsiones. In amisso gustu convenit *Raphanus* ante pastum masticatus, item *cephalica* & *nervina*. Sed gustus & odoratus vitia, si inveterata sunt, sunt curatu difficilia, maximè in senibus.

Gustus  
læsiones.

*Art. 1111.*

**Aphonia.** *Art. 1111.* Loquela amissa frequenter a linguæ paralyſi accidit; curatur *aromaticis*; convenit decoctum *ſalviæ*, *eruc. ſinap.* &c. in vino, item *roſmarinus*, *rad. pyreth. zinzib.* ſed præ reliquis ſucus *ſalviæ*.

## DENTIIUM &amp; GINGIVARUM MORBI.

**Dentium caries & nigredo.** *Art. 1112.* Dentium caries & nigredo fit a nimis calidis, frigidis, dulcibus, acidis, ſumis ex mercurio, a ſcorbuto, &c.

**Curatio.** *Art. 1113.* Vitanda ergo ſunt antediſſa, & dentes a cibo repurgentur & vino eluuntur. *Pumex* bis vel ter ignitus & vino albo extinſtus & in pulverem ſubtiliſſimum reductus albiſſimos facit dentes; quidam ſolo pulvere *panis uſti* utuntur (qui optimum & tuſiſſimum eſt dentifricium.) *Cinis nicotiana* eſt turpe medicamentum, ſed dentes reddit albos. Ad dentium ſordes tollendas & colorem vitioſum emendandum varia extant dentifricia in practicoꝝ libris; *℥. Os ſepiæ ℥j. rad. pyreth. lapid. pumic. alum. uſt. ana ℥j. cinnam. lign. aloe tart. rhenan. ana ℥ſſ. ſ. pulv. ſubtiliſſimum.* Pro uſu domeſtico pulv. *panis uſti* ad dentes mundandos ſing. auroris, & poſtea opiatum ſequens uſurpandum, *℥. Pulv. flor. roſ. rub. ℥ij. myrth. elect. ℥ij. alum. uſt. ℥j. ſacchar. ſaturn. ℥j. cremor. aq. calc. ſupernatant. opobalfam. ana ℥ij. aq. hungar. q. ſ. miſce.* Poſt uſum huius abluatur os cum vino rubro.

**Curatio.** *Art. 1114.* In dentifriciis uſurpandis optime cavendum eſt, ne crebrior & durior attritus gingivarum, eas atterat & abſumat.

**Dentium vacillatio.** *Art. 1115.* Ad dentes firmandos valet ſolutio *terra japon. ℥ij. in vin. rub. ℥ſſ. pro lotionē* (inquit *Boyle* multis in locis) conducit etiam *gum. lac.* quocunque modo uſurpatum.

**Gingivæ putridæ.** *Art. 1117.* In gingivis putridis & dentium vacilla-

CAP. X. *Dentium & Gingivarum Morbi.* 397

cillatione inde orta, ℞ Gum. lac. ℥ij. cremor. aq. calc. supernatant. ℥j. alum. ust. ℥j. flor. ros. rub. ℥ss. m. f. pulv. subtilissimus cum paucis mel. ros. usurpand. vel cum vino rub. gallico in quo infusa sunt sol. ros. rub. rad. tormentil. &c. In graviore malo ad unguentum *Ægypt.* deveniendum est [ vel mel. unguent. *Ægypt. supernatans* ] plura videantur in cap. de scorbuto. De gingivis putridis & dentium vacillatione. Interim multum valet *tinctura gum. lac. Fulleri.* “ Præ reliquis autem, quotcunque  
 „ in libris inveniuntur, pro dentibus firmandis,  
 „ iisdemque & gingivis a putrefactione conservan-  
 „ dis, nec non oris fetore præcavendo, non da-  
 „ tur præstantius remedium quam *Masticatio fo-*  
 „ *liorum Nicotiana* modica quantitate: ed etc-  
 „ nim sufficiunt grana quatuor pro una vice,  
 „ idque tantum semel in die usurpandum per ho-  
 „ ræ quadruprem in ore detinendo. Interim super  
 „ omnia improbandus est *turpissimus quorundam*  
 „ *mos totis diebus masticandi*, non ad hos lau-  
 „ dabiles fines consequendos; sed plane nescien-  
 „ tium quare, forsitan solummodo consuetudini io-  
 „ dulgendi gratia.

Art. 1117. Oleum *Buxi* dentium dolores quos-  
 vis ad miraculum sedat ( inquit *Riverius* ) oleum  
*origani* est in frequenti usu. *Pix livid.* in ore de-  
 tent. dolorem tollit, ut ab amico accepi. *Rad.*  
*pyrethri* in ore manducat. pituitam evacuat & do-  
 lorem lenit. Decoctum *nicotiana* in ore deten-  
 tum dentium dolorem potenter sistit ( inquit *Est-*  
*mullerus* ). “ Sed ultra omnia, quæ hactenus no-  
 „ vi, *succus radiceis iridis luteæ* dolenti denti af-  
 „ fricatus vel ipsa radix in ore masticata in in-  
 „ stanti quasi ex incantamento dolorem ex causa  
 „ quæcunque oriundum fugat. Communicator af-  
 „ firmat se quadragies ad minimum pari successu  
 „ tentasse; ego etiam ipse sæpius expertus sum  
 „ & plurimi ex meo suasu idem fecerunt: si den-

Dolores  
dentium.



tis cavitas sit magna, imponi potest plumbum foliatum.

Nota bene.

Art. 1118. Nonnunquam [ inquit *Sennertus*, & ipse idem plus semel observavi ] per dentium radices & maxillæ foramina, per quæ vasa in eas subeunt sensim extra effluit sanies è dente corrupto & *tubercula in mala* vel *mento* excitat, quæ nullo modo curantur, nisi dens extrahatur. Vide locum p. 262. Vide etiam *Cheselden Anat.* p. 19.

Vermes dentium.

Art. 1119. Decoctum *sabinae* in ore detentum vermes dentium elicit, ut auctor est *Etmullerus*.

## A U R I U M M O R B I.

### *Etmulleri sententia.*

Inflammatio & ulcus aurium.

Art. 1120. In inflammatione & ulcere aurium adeo insignis ardor in aure, & dolor tensivus, & pulsatilis vehemens cum rubore, quandoque, conjuncta est febris, interdum delirium, & motus convulsivi.

Methodus curandi.

Art. 1121. Insensibiliter discutitur, vel suppuratur; convenit *venæsectio*, item *sudorifera* tanquam in aliis inflammationibus. Externa non nisi cum cautela sunt usurpanda, fomenta tamen ex *emollientibus* & *discutientibus* sunt proficua. Si discuti nequeat, ad *suppurantia* accedendum est, ut *cepa sub cineribus* assat. pulv. rad. *lilior. alb. caric. ping. ol. cham. amygd. amar. &c.* Ulcere rupto, si pus effluens sit album, æquale, &c. melius est, quàm si sordidum, saniosum, &c. fuerit; sufficit, si modò mundus servetur meatus auditorius, id quod optimè mediante *urina humana* assequimur; si ulcus fuerit sordidissimum *urinae* addi possunt succus *cepe* & *mel rosat.*

Otalgia curatio.

Art. 1122. Otalgia, sive auris doloris causa frequentissimè est inflammatio, de qua modò dictum est; interdum verò ab acri humore provenit, ubi

non

non est aded insignis ardor & pulsatio. Fumus *nicotiana* cum fistula inversa auri immissus valet ad dolorem compescendum, item *millepedes in ol. communi* vel *amygd. amar. infusi*, & *ol. scorpion.*

Art. 1123. Si dolor aurium a vermibus fuerit, dolor tunc vagè lancinans; hinc inde rodens percipitur: educendi sunt vivi, aut intus enecandi; *lac tepidum* auribus immissum dulcedine sua vermes allieit; ita ut prodeant: succus *absynthii* interficit, vel angit eosdem, item *oleum nucleorum persicorum*, vel *amygd. amar. diatolocynthidis quercetani* cum granis aliquot *mercur. dulc.* item *elix. propriet. argentum vivum* in aq. appropriata incoct. &c.

Vermes  
in auri-  
bus.

quid agen-  
dum sit.

Art. 1124. Tinitus aurium frequentissimè est affectus chronicus & valdè molestus, interdum in omnimoda surditate terminatur; raro curatur, sæpè recidivat.

Tinnitus.

Art. 1125. Præmissis universalibus, suffitus ex *succino*, *olibano*, & *gum. anima* est egregius; *spiritus sal. armoniac.* cum bombyce in aurem immissus tanquam singulare a *Lindano* laudatur; item *fel lucii piscis*, *ol. castor. zibet.* &c. in usu sunt.

Curatio.

### Riverii sententia.

Art. 1130. Surditas & gravis auditus secundum magis & minus tantum differunt, eo affecti ægré sonum percipiunt; auris afficitur vel in exteriori vel interiori parte. Meatus auditorius interdum *cerumine* vel alia quavis sorde obturatur; in interiori parte auris affici potest humoribus in cavitate collectis qui frequentius *pituitosi* sunt.

Surditas.

Causa.

Art. 1131. Obturatio externæ aurium cavitatis oculis ipsis dignoscitur, si ad solem cavitatem intropicias. "Pro cavitate externa eluenda uti lis, cet decocto *folior. salviae* & *flor. rorismarin.* in p. æ. aq. & vim alb. facto, quod cum syphone

Curatio.

pru-

prudenter iniiciatur. Nihil æquè conducit in surditate a causa interna etiam post centum remedium usum, quam ut æger præmissis præmittendis *sulphureis balneis* caput madefaciat, sedeat sub canali balneorum, & verso epitonio, aquam accipiat. *Ova formicarum* contrita & cum succo *cepe* in aurem infusa quàm vetustissimam surditatem persanant. Si affectus sit contumacissimus post omnia ineassum tentata excitare licet *pyralismum* ex inunctione mercuriali.

*Estmulleri sententia.*

Remedia  
exicina.

*Art. 1132.* Inter remedia externa in surditate præ reliquis granum unum *moschi*, vel *ambra*, vel *xibethi* cum bombyce involutum & vesperi auribus immissum est optimum remedium, præcipuè in senibus; laudatur etiam *fel anguilla* cum *spiritu vini*, & *fel perdicis* a *Lindano*, liquor ex ovis *formicarum* expressus, si quid aliud, admodum confert. Sunt qui valdè commendant suffitum ex *sulphure* mediante fistula in aurem transmissum; extremum remedium est salivatio: *Vapor auricularis Fulleri*.

UVULÆ RELAXATIO  
sive Proidentia.

Uvulae  
relaxatio.

*Art. 1133.* Gurgulio seu uvula est glandula pendula ad formationem & modulationem vocis conferens, quæ defluxionibus, æquè ac aliæ glandulæ, obnoxia est; si infra tumeat, supra gracilis evadit. E palati extremo propendet, inque fauces & gulæ caput fertur, itaque hæc loca titillatione quadam afficit, metuque præfocationis sollicitat.

## Riverii sententia.

*Art. 1134.* Humor pituitosus in columellam de- Causa.  
fluens, eam humectat, emollit, & relaxat, ut  
longior facta partem superiorem œsophagi tan-  
gat, & nauseam pariat.

*Art. 1135.* Evacuantia universalia eadem esse de- Curatio.  
bent ac in *catarrho*. In principio *topica astringen-*  
*tia* & *repellentia* conveniunt, quemadmodum in  
curatione *angina*, quibus postmodum *resolventia*  
& *exsiccantia* erunt admiscenda: Remedia autem  
forma pulverum potius quam liquidorum sunt ut  
plurimum utiliora & efficaciora, præsertim si nul-  
la adsit inflammatio. Excisio est ultimum reme- Excisio.  
dium, sed cum suprema cautione admolienda est;  
nam valdè periculosa est (inquit *Hippocrates*  
*Progn.*) de qua operatione videantur authores chi-  
rurgici.

“ Audiamus *Tulpium*. A medicis prolapsus pa-  
,, lati vel omnino prætermittitur, vel leviter tra-  
,, ctatur; & tamen vitium est non minus grave  
,, quam rarum. Vidi equidem tumorem hunc in  
,, palato celeri gressu exortum, ut vix licuerit co-  
,, gitare de *Gargarismate*, ne dum de aliis auxi-  
,, liis, præterquam de sola *scalpelli incisione*, qua  
,, dextrè & festinanter id temporis instituta vidi-  
,, mus non modo effluxisse inde plurimum aquæ,  
,, sed detumescente palato ad se rediisse hominem  
,, extinctioni jam proximum. Unum ex optimis  
,, remediis pro uvula prolapsa est *semen cannabis*  
,, in posca parum coctum pro gargarismate [ in-  
,, quit *Ettmullerus* ]. Proficua quoque esse pos-  
,, sunt sequentia pro arbitrio vel potius iudicio  
,, periti medici usurpata; *decoctum catechu*, de-  
,, coctum rad. tormentil. cum paucis sale armoniaco  
,, & alumine crudo, gargarisma pro uvula, pul-  
,, vis uvularis.

Remedia  
varia.

## A P H T H Æ.

*Boerhaavii sententia.*

Aphthæ  
quid  
Et quas  
partes oc-  
cupant.

*Art. 1136.* Aphthæ sunt parva, rotunda, superficiaria ulcuscula os interdum occupantia; sunt enim exulcerationes ultimorum emissariorum, hinc occupant omnia loca, ubi talia emissaria hiant; adeoque labia, gingivas, genas internas, linguam, palatum, fauces, tonsillas, uvulam, gulam, stomachum, intestina tenuia, (ad anum usque) ubique ferè eadem specie. Præcedere solent, febris, incipiens cum diarrhœa vel dysenteria, nausea, appetitus prostratus, præcordiorum anxietas, debilitas magna, evacuatio notabilis, stupor, somnolentia. Varius est aphtharum color, albus, fuscus, flavus, lividus, niger, quarum posteriores sunt peioris notæ. Sapor omnis aboletur; adest plerumque oris siccitas, interdum crustis deciduis, salivatio vel diarrhœa adoritur, imò dysenteria ex vasorum dilatatione.

Varius  
aphtha-  
rum co-  
lor.

Curatio.

*Art. 1137.* Ut curetur optimè hoc malum, exhibenda sunt *calida, diluentia, resolventia, & abstergentia*, ut crusta in facilem citumque lapsum disponatur; simulac lapsus conciliatus est, tum *anodyno, demulcente, & simul parum corroborante* medicamento utendum, uti *gelatin. C. C. vel seq. ʒi. Aq. ros. stillat. syr. papav. alb. ana ʒij. vitel. ovor. ij.* Misce, hujus pauxillum ore assidudè contineatur. In fine dandum est *cathartic. corroborans ex rhabarb. &c.*

*Estmulleri sententia.*

Aphthæ  
unde.

*Art. 1138.* Aphthæ succedunt frequentius febribus ingentibus, aliquando oriuntur ex vitio salivæ, & cruditate ventriculi. Aphthas futuras in mor-



morbo cognoscimus ex sopore & singultu, qui toto morbi decursu non dormiverunt, in soporem incidunt, & tunc aphthæ prodeunt. Singultum accidit, si sint ex ventriculo, & tunc plerumque sunt deteriores.

Art. 1139. Nil pejus quam sæpius purgare in hoc malo. Tota curatio consistit in *humectatione*, quæ emolliat, & leniter calefaciat; optimum est *decoctum raparum cum nitro*, item *decoctum herb. bellidis major. cum ficibus & sal. prunel.* Curatio.

### Farrago sententiarum.

Art. 1140. *Spiritus vitrioli vel sulph. melli rosaceo* permixtus in pueris ac adultis a *Riverio* commendatur; si verò morbus sit valdè pertinax [ inquit idem ] & humorum fluxus copiosus, aded ut vita sit in summo periculo, extremum remedium est *Laudanum*, quod dolorem sedat, & humorum fluxum inhibet. Laudanū  
ultimū  
remediū

Art. 1141. Post febrem aphthæ, vel singultus, vel horum utervis, si non sponte facessat, sed in longum tempus decurrat, facile fugatur usu *corricis peruv.* Usurpari potest ad os colluendum *gargarisma* sequens ℞. *Succ. pomorum agrestium* ( omnium opt. *Cochagee* ) ℥ss. *syr. de rub. idæ.* ℥j. m. *Sydenham. sched. mon.* Cortex  
peruv.

Art. 1142. “ Sequens omnibus remediis, quæ hætenus expertus sum, multis parasangis antea cellit in hoc morbo vincendo ℞. *Terr. japon. pulverisat.* ℥iij. *coq. in aq. calc.* ℥vij. ad tertix partis consumptionem, colaturæ add. *sacchar. saturn.* ℥j. *mel. ros.* ℥ij. capiat æger coch. j. singulis horis vel sæpius, teneatque paulisper in ore & sensim deglutiat: est remedium verò aureum. Videantur plura in cap. de infantum morbis. [ 1559. ] Remed.  
dium si-  
gulare.

## GUTTA ROSACEA.

Ettmulleri sententia.

Gutta ro-  
sacea.

Art. 1143. Gutta rosacea est rubor faciei tuberosus, pustulosus, guttis interdum sanguineis similis, qui nasum sæpè & genas inæqualiter & valdè tingit, potatoribus satis frequens est; ut plurimum ad mortem usque comitatur. Præmissis universa libus conveniunt *saturnina*, &c.

Turneri sententia.

Morbo-  
mina &  
descriptio

Art. 1144. Gutta rosea seu rosacea ita dicitur a parvis rubicundis quasi guttulis, sive tuberculis igneis per universam faciem, & præcipuè nasum, hinc inde sparsis. Appellatur etiam *rubedo maculosa*. Rectius verò, me iudice, **INSIGNIA BACCHANTIUM FLAGRANTI FULGORE RADIANTIA**. Est morbus profectò apud *Damnonios & Belgas* maximè familiaris & ferè *Endemius* ob pravam bibendi consuetudinem. Tres gradus a quibusdam numerantur, viz. *Rubedo simplex*, *rubedo pustulosa*, & *rubedo ulcerosa*; facies & nasus aliquando in molem prodigiosam supercrescunt, aded ut vultus aspectu horrifico planè tremendus & monstrosus evadat. Novi quendam hoc morbo *gloriosè* affectum, cui inter pocula, quibus liberrimè indulgit, sanguis per ipsam cutem variis in locis exilire consuevit, & ubertim confluere, quod per aliquot momenta potationis negotio impedimento esse solebat; mox verò suppressa hæmorrhagia, ut canis immundus vel amica lutosus ad sordem & illuviem se recipere solent, ita ille ad carissimam computationem lætus redibat,

Ad gra-  
dum emi-  
nentem  
pro- celsus

„ bat, ibique commorari solitus, donec vultum  
 „ in *torrem* accenderet, tantum non ignem unde  
 „ quaque spargentem; ipsis tenebris fulgentem.

Art. 1145. Agnoscendum est interim hunc mor-  
 bum maximè abstemiis & temperatis interdum sed  
 rariùs accidere; ut plurimum enim spirituosorum  
 liquorum ingurgitatione accersitur.

Solus  
 rariùs acci-  
 dit.

Art. 1146. Ut ad curam sternatur via, imperan-  
 dus est *victus humectans & refrigerans*, & idem  
 regimen observandum ac in *psora*, vel in *eruptio-  
 nibus scorbuticis*; sed maxima adhibenda est cau-  
 tela in his mutationibus faciendis; a liquoribus ca-  
 lidis & spirituosus ad victum tenuem & potum re-  
 frigerantem non est facilis transitus. Ex *antimonia  
 & mercurio preparata* tam internè quàm externè  
 sunt maximè proficua. Author noster more solito  
 quamplurima remedia ex *Sennerto*, *Mayernio*, &c.  
 accumulavit, sed in calce monet se multoties opem  
 tulisse singularem remediis facilè parabilibus & mi-  
 nùs pomposis, nimirum cum *sale tartari*, *nitri*,  
*sacchar. saturni pomato* admist. *albuminè ovorum*  
 cum *frusto aluminis* aut cum *granis aliquot cam-  
 phoræ & sublimat.* item *ol. myrrhæ*, sequens valdè  
 efficax perhibetur, ℞. *Ovum duriusculè coctum*,  
*eximatur vitellum & cum pulv. myrrh. elect.* sup-  
 pleatur locus; & in cellaria suspendatur, ut per  
 deliquium fluat: hoc etiam est *cosmeticum* insi-  
 gne, ut & *unguentum faciale Bat.*

Curatio.

Euporia.

Art. 1147. “ In eruptionibus pustulosis leviori-  
 „ bus linimento sequente feliciter usus sum; ℞.  
 „ *Ung. diapomphol.* ℞. *mercur. dulc.* ℞. *alum. ust.*  
 „ ℞. *ol. rhod. gut.* iij. *ol. ros. q. s. misce.* In gra-  
 „ viori casu linimento & lotionem sequentibus præ-  
 „ missis ritè præmittendis; ℞. *Litharg. auri* ℞.  
 „ *sacchar. saturn.* ℞. *ung. pomat. fragrantissim.* ℞.  
 „ *ol. rhod. gut.* iv. *amygd. dulc. q. s. m. f. linimen-  
 „ tum pro locis in facie maximè affectis sing. die-  
 „ bus vesperi illinendis.* ℞. *Aq. plantag.* ℞. *succ.*

Remedia  
 varia.

„ limon. ℥ij. mercur. sublimat. gr. xij. camphor. ℥j.  
 „ infund clausè & calidè per horæ dimidium ,  
 „ colatura sit pro lotionè bis vel ter in die usur-  
 „ panda . Hæc ultima est *Aq. divina Fernelii* ,  
 „ & sequens *Pitcairni* . “ 24. *Litharg. aur.* ℥ij.  
*mercur. sublimat. corrosiv.* ℥j acet ℥x. infund. per  
 hor. 12. in vase stanneo sæpius agitando ; post substi-  
 dentiam effundatur liquor limpidus . Usus tempore  
 instillantur gutta aliquot. ol. tart. per deliquitum ,  
 donec lælescat . “ Id eundem finem adhiberi po-  
 „ test etiam *Aluminatum Batcanum* præmissis ri-  
 „ tē præmittendis .



## C A P U T XI.

*Sive Fasciculus Morborum undecimus .*

### MORBI CUTANEI,

*Ettmulleri sententia .*

Curis ni-  
gredo .

Art. 1148.

**C**UTIS nigredo est vel *nativa* ,  
vel *accidentalis* , prior est incu-

Curatio.

tur , succo citri tollitur ; idem facit *spiritus vini*  
*camphoratus* , item *tinctura benzoes* . Interdum sa-  
 pones odorati cosmetici a delicatis expetuntur ,  
 qualis est sequens ; 24. *Sapon. venet.* ℥ij. *amygd. a-*  
*mar. nucleor. persic. excort. ana* ℥ij. *pulv. rad. ireos*  
*flor. aron. ana* ℥i. *sal. tart.* ℥ss. *ambrae gris. moseh.*  
*cum spiritu rosar. solut. ana* ℥ss. *zibet. gr. v. cum*  
*q. s. essentia benzoes s. massa saponiformis* . “ Se-  
 „ quens est cosmeticum insigne 24. *Flor. bismuth.*  
 „ ℥ij. *ungt. pomat. albiss. & fragrantiss.* ℥vj. *ol.*  
 „ *rhod. gut. ij misc.* Ut etiam *arcanum cosmeti-*  
 „ *cum* .

Art. 1149.

Art. 1149. Lentigines sunt maculæ obscure flavescētes magnitudine lentis; faciem, collum, & manus defœdantes; cuti pertinacissimè adhærent, nec facillè curantur, in iis, quibus per aliquod tempus effloruerunt. *Lac virginale*, *ol. tart. per deliquium*, *ol. myrrhæ per deliquium cum albumine ovi parat.* &c. ad lentigines tollendas a quibusdam usurpantur.

Lentiginæ.

Curatio.

Art. 1150. Ephelides sunt maculæ cutaneæ fusæ & interdum asperæ, mulieribus communes; quæ potissimum frontem, interdum genas, imò collum & manus deturpantes, in longum & latum sæpè ad palmæ magnitudinem se explicant; gravidas in specie afficiunt, in quibus etiam per reliqua ingravidationis signa dignoscuntur.

Ephelides

Art. 1151. Maculæ hepaticæ sunt obscure flavi coloris interdum ad palmæ ferè magnitudinem, nunc minores cum cutis aliquali asperitate; occupant imprimis collum, pectus, atque dorsum, interdum manus cum singulari pruritu. Curantur ut *Lentigines* [1149.]

Maculæ hepaticæ.

Art. 1152. "Sudamina sunt papulæ sudorum in collo, pectore, brachiis, &c. oriuntur a sudore, bilioso cutem exasperante." *Schmitz.* Milii granis similia sunt, causa proxima est serum plus minus acre. *Ettmuller.*

Sudamina

### Effere.

Art. 1153. Effere est tuberculorum genus in Graecorum & Latinorum scriptis non occurrens; sed ab *Avicenna* & *Arabibus* describitur, & in nostris regionibus frequenter reperitur. Vocatur *Effere*, *Sora* & *Sare*; erumpunt tubercula parva ad rubrum urgentia, duriuscula, cum insigni pruritu, subitò universum corpus occupant, non secus ac si ab *Apibus*, vel *Vespis*, vel *Culicibus* homo demorsus, aut *Urticis* percussus esset; ex biliosis &



falsis humoribus oriuntur. Tubercula hæc plerumque brevi temporis spatio, etiam nulla cura adhibita, sponte evanescere solent; & fortasse morbus est paulò lenior & benignior, quam eruptio illa quam nos vocamus *a Rash*, vel quam Erysipelatis secunda species Sydenhami (1168.) In opere practico circumspeditione & cautela opus est, præcipue si cum eo febricula conjuncta fuerit; nam in hujusmodi eruptionum diagnosi, prognosi, & curatione *primæ notæ medicos* deceptos novimus.

**Phlyctenæ.** *Art. 1154.* Phlyctenæ seu Phlyctenes sunt vesiculæ parvæ pruriginosæ & ferventes, sero limpidò repletæ, quæ intra digitos & circa carpos oriri solent: Interdum in scabiem & serpiginem degenerant, curantur ut aliæ eruptiones cutaneæ.

**Sirones.** *Art. 1155.* Sirones sunt pustulæ in volis manuum & plantis pedum æstivo tempore emergentes, & cum insigni pruritu molestantes, in quibus latent subtilissimi *vermes Sirones* dicti; ac effodiendi sunt; usurpanda sunt *unguenta & lotiones mercuriales*.

**Vari.** *Art. 1156.* Vari sunt tumores parvi & duri ex rubedine in summitate tandem albescentes, ut plurimum in facie & collo oriuntur magnitudine seminis cannabis. Juvenes utriusque sexus ad venerem aptos præ cæteris molestant: ubi rubor intensus conjunctus est difficilis est satis curationis, & licet pustulæ removeantur, rubedo tamen permanet, cui si inflammatio & raucedo conjungantur *Lepræ* imminentis signum est. *Lac virginiæ, sacchar. saturn. essentia benzoës, camphorata,* &c. usurpari possunt.

**Curatio.** *Art. 1157.* Lichen, serpigo & Herpes sunt affectus sibi ipsis cognati, gradibus verdè a se invicem distantes.

*Art. 1158.* In Lichene cutis est aspera cum pustulis hinc inde erodentibus, crustis furfuraceis

ceis & cum summo pruritu ad partes vicinas serpentibus.

## HERPES.

*Turneri sententia.*

*Art. 1159.* Herpes simplex est cum pustulæ singulæ ( plerumque in facie ) oriuntur; sunt albidæ, aut flavæ, & acuminatæ cum basi inflammata; a puris guttula, quam continent, exoneratæ sponte exarescunt. Herpes simplex.

*Art. 1160.* Herpetis species secunda est *Serpigo*. Serpigo. nos angli vocamus a *Tetter*, vel a *Ringworm*. Pustulæ minutæ accumulatim exurgunt; quandoque figura rotunda vel annulari cum dolore & pruritu insigni. Serpigo ad digestionem nunquam pervenit; tantum ex scalpura humore tenui defluit.

*Art. 1161.* Difficillimè curatur, postquam enim penitus extincta videtur, certis anni temporibus repullulare solet. Vulgus uti solet atramento; sed in morbo pertinaci præmitti debent universalia; egregie faciunt *aquæ minerales cathartica* & postea sequens linimentum, ℞. *Unguent. rosat.* ℥j. *mercur. præcip.* ℥j. *Arcan. corallin.* ℥ss. *ol. Rhod. gr.* ij. m. efficac etiam est *lac sublimat.* ut aliquoties expertus sum, sed usurpandum est cum cautela, ne inflammationem inducat. Lotio sequens a *Paræo* commendatur; ℞. *Sulph. calcanth. alum. ana* ℥j. macerentur in q. s. *aceti fortis*, & coletur liquor pro lotionem. Curatio.

*Art. 1162.* Herpetis species tertia est *Herpes miliaris*, idiomate nostro audit *the Shingles*. Herpes miliaris. Ex innumeris parvis pustulis constat variis in corporis partibus erumpentibus, viz. Cervicæ, pectore, lumbis, femoribus, &c. Locus affectus nonnihil inflammatur, æger leviter febricitat, assurgunt pustulæ

postulæ albidæ & suppurantur, succedunt parvæ rotundæ crusticulæ semina milii referentes, unde nomen.

*Curatio;* Art. 1163. In hoc morbo tractando indicationes curativæ quoad remedia interna eadem omnino sunt ac in *Erysipelate*; cavendum est primariò, ne repercutiantur pustulæ; conveniunt ergo discutientia: pustulæ eminentiores forcipe scindantur, & applicetur *ceratum ex oleo O. cera*, ut vestimentis minus hæreant. In declinatione adhibere licet *exsiccantia*, ut *unguentum diapomphol. rutie*, vel potius nostrum *ceratum de lapide calaminari*.  
 “ Applicatio sequens valde efficax perhibetur. 24.  
 „ *Sem. sinap. contus. ʒi ss. vitriol. virid. in q. s.*  
 „ *aq. plantag. solut. ʒij. misce. Unguentum Her-*  
 „ *peticum Batcanum usui esse potest.*

Art. 1164. Herpes miliaris ad naturam *Psoe*  
 „ proximè accidit ( inquit *Vviseman* ) quapropter  
 „ *cathartica mercurialia*, nec non *alterantia*, ad  
 „ curam rationalem exposcit.

### *Schmitzii sententia.*

*Herpes ex-* Art. 1165. Herpes exedens est pustulosa inflam-  
*edens,* matio cum pruritu & rubedine, partem, in quam  
 serpit exulcerans; oritur a bile ardentissima; facile summum corpus ad epidermidem usque penetrat, ubi cum retinetur, nec ultra expirat, eam partem exedit.

*Curatio.* Art. 1166. Frequens *catharticorum* usus adhibendus est. Profunt *unguentum Diapomphol. & alb. Rhas.* nec non *plumbi lamina in aqua aluminosa diu macerat*. Si tumor usque aded acris, ut *ulcus phagedænicum* excitet, quod mitioribus nequaquam cedit medicamentis, ad valentiora recurrendum; ad *Arsenic. sublimat. optimè trit. & cum unguento alb. mixt.* Denique si magis magisque serpat *ulcus*, ad *ferrum ignitum* accedendum.

## E R Y S I P E L A S.

*Sydenhami sententia.*

*Art. 1167.* Erysipelas seu ignis sacer quaecumque partem corporis occupat, at præ reliquis faciem; ex improvise corripitur æger, dum sub dio versatur (rusticis *syderatio* audit) patet affecta paulisper intumescit cum dolore & rubore summis, (ac ingenti æstu,) & densominimarum pustularum ordine distinguitur; quæ aucta magis inflammatione in vesiculas subinde facessunt. Sensim latius serpit malum, & de loco in locum progreditur & febrem habet conjunctam.

Erysipelas

*Art. 1168.* Aliæ est etiam species, licet rarius occurrens, ex nimia spirituosorum liquorum compositione plerumque orta; febriculam, quæ agmen ducit, mox excipit pustularum per universum ferè corpus eruptio, quæ *urticarum puncturas* referunt, & nonnunquam in *vesiculas* attolluntur, mox recedunt cum pruritu vix tolerando, at quoties scalpituram subeunt, denudè apparent.

Alia species.

*Art. 1169.* *Venæsectio* convenit & postero die *lene catharticum*, & *paregoricum* hora somni. Pro usu externo *fortis discutiens*, & *mistura* sequens, 2℥. *Spirit. vin. Hb. theriac. androm.* ʒij. *pulv. piper. long. garyoph.* ana ʒij. misce, charta empoetica hæc mixtura madefacta parti circumvolvatur. Sanguis in hoc affectu est pleuriticorum similis, & quandoque secunda, vel tertia *Venæsectio* postulatur.

Curatio.

*Art. 1170.* Altera species pari ferè modo amolenda est, nisi quod remediis externis minùs egeat,

*Etzmulleri sententia.*

*Art. 1171.* Erysipelas digito leviter pressum maculam albam ostendit & subito rursus rubescit, quod

Differentia ab inflammatione.

quod non fit in inflammatione, nisi fortius prematur. *Scorbutici* huic morbo sunt obnoxii.

*Curatio.* Art. 1172. *Purgatio* est summè vitanda; *venæsectio* est periculolissima: Est enim morbus *cutaneus*; ideoque internè *diaphoreticis* cura est inchoanda & absolvenda, inter quæ *Rob Sambuci* eminet, est potens *sudoriferum*. Externè omnia unctuosa astringentia & actu frigida sunt fugienda. *Spiritus Theriacalis camphoratus* est remedium laudabile. Erysipelata per unguenta oleosa aut mucilaginosa ineptè tractata subito serpentem inducunt *gangranam*.

*Freindii sententia.*

*Catharsis in Erysipelate capitis.* Art. 1173. De *purgatione* in Erysipelate haud convenit inter authores, sed omnia dubitanter proponunt, & in ultimo morbi discrimine, vel nullam consilia, vel timiditatis atque hæsitacionis plena; mihi verò satis experimentis esse edoctus videor, ut pronussem in *capitis Erysipelate*, si quando cerebro tentato oboriatur Coma, delirium, nervorum distentio, aut nullam subesse salutis spem, aut *purgantia* maximè profectura. Neque in his rerum angustiis expectandum esse, quod & in variolis experimur, dum vel febris lenita sit, vel tumor planè subsederit. Nam cardiacis refrigerantibusve remediis contra febrem pugnare, topica admoveere, quid demum aliud est, quàm nugæ agere, donec in medio curationis cursu æger intercadat: Exemplum singulare hujus praxeos in medium profert doctissimus author. *De Feb. commentar. vij. p. 117. quod vide.*

*Farrago sententiarum.*

Art. 1174. Erysipelas foris intro verti non bonum: intus verò foras bonum (inquit *Hippocr.*)  
Art. 1175.



*Art. 1175.* Epithema ſequens a *Barbette* commendatur, ℥. *Trochiſc. alb. rhaſ.* ℥j. *camphor.* ℥j. *ſp. vin.* ℥j. *aq. ſambuc.* ℥vj. ſ. mixtura, cum hac ma-  
deſcant lintea, & calidè applicentur, & ſæpiùs re-  
noventur, quoties ſicceſcunt.

*Art. 1176.* D. *Turner* valdè commendat miſtu-  
ram ex *ol. ſambuc.* & *aq. calcis* cum pauco *ſpiritu*  
*vini camphorat.* Exiſtimat miſturam *Sydenhami* eſ-  
ſe nimis calidam, ſed (credo) inexpertus loquitur;  
eſt enim proſectò medicamentum in hoc affectu om-  
nem laudem exuperans, ut per vicennium multipli-  
ci experientia comprobavi. *Cataplasma ſimi vacci-*  
*ni* eſt valdè proficuum ad dolorem leniendum.

*Art. 1177.* In *Eryſipelate ſymptomatico* convenit  
linimentum ſeq. ℥. *ol. ſambucin.* lixiv. ten. ana p.  
æ. agitentur invicem diutiſſimè in phiala, donec in  
unguentum coaleſcant: valet etiam *lotio ad Eryſi-*  
*pelas Fulleri*, quam ex experientia ſua author lau-  
dat. (Vid. *Effere* 1153.)

## P S O R A.

*Ettmulleri ſententia.*

*Art. 1178.* Scabies eſt vel *humida*, que apparet  
ſub forma ulcuſculorum cutaneorum; vel *ſicca*, quæ  
ſaniem exſiccata & incruſtata repræſentat.

*Art. 1179.* Humida faciliùs curantur quàm ſic-  
ca; purgandum eſt cum *helleboro* & *mercurialibus*;  
conducunt *abſorbentia* & *ſudoriſera* ex *antimonio*  
præparata, decoct. e *lignis*, *viperina*, *rob ſambuc.*  
&c. externè conveniunt remedia ex *ſaturno*, *mer-*  
*curio*, *ſulphure*, *calce viv.* *camphora*, *nicotiana*, *li-*  
*tharg.* &c. ℥. *Ungt. nicotian.* ℥ß. *ſlor. ſulph.* ℥ij.  
*mercur. dulc.* ℥j. *ol. hyperic.* q. ſ. m. conveniunt e-  
tiam balnea ex *herbis* & *radicibus appropriatis*.  
(in lixivio tenui coctis) Vid. plura in cap. de  
morbis infantum. (1561.)

Celfi

*Celsi sententia,*Pfora  
quid.

Prognosis.

*Art. 1180.* Scabies (sive Pfora) est durities cutis rubicundior, ex qua pustulæ oriuntur, quædam humidiores, quædam sicciore. Exit ex quibusdam sanies; fitque ex his continuata exulceratio pruriens; serpitque in quibusdam citò. Atque in aliis quidem ex toto desinit; in aliis verò certo tempore anni reuertitur. Quod asperior est, quoque prurit magis, eò difficilior tollitur; itaque eam, quæ talis est, *ἀγέλη* Græci appellant, id est *feram*. " In iuvenili ætate sæpè ab aliis morbis  
 „ præservat, vel eos sanat; diuturnior in lepram  
 „ migrare potest, in senibus contumax & curatu  
 „ difficilis; *sicca* difficilior curatu, quàm *humida*;  
 „ quæ ex interno humorum vel viscerum vitio  
 „ oritur; & plerumque criticè erumpit, nimè  
 „ impedienda, nec intus repellenda.

*Vvillisi sententia .*Quas partes ob-  
det.

Contagiosa.

Curatio .

*Art. 1181.* Pfora sive Scabies est pustularum in corpore sparsim eruptio, præcipuè circa juncturas artuum, & inter digitos, ab humore acri & salso procedens, ob pruritum insignem scalpendi necessitatem inducens. Nullius certè morbi labes (*peste* tantum excepta) facilius aut certius quam *Pforæ* propagatur.

*Art. 1182.* Præmissa *venæsectione* utilissimè propinatur cerevisia medicata sequens, *℞. Rad. polypod. querc. lapath. acut. ana ℥iij. sem. opt. ℥iv. epithym. turbit. mechoacan. ana ℥ij. santal. citr. ℥i. sem. coriandr. ℥vj. præpara s.a. & s. faecul. pro cerevis. cong. iv. post dies v. vel vj. hauriatur & sumatur ℥xij. plus minus omni mane per viij. vel x. dies. Pro usu externo sulphur in hoc morbo virtutem quandam specificam*

efficaciam habere videtur, & linimentorum ferè omnium est basis. ℞. *Axung. porcin.* ℥iv. *flor. sulph.* ℥ß. *pulv. zinzib.* ℥ß. *ol. tart. per deliq.* q. s. m. f. unguentum, cui odoris gratia addi possunt guttæ aliquot *ol. rhod.* Unguenta ex *hydrargyro* sunt periculosa. Restat adhuc alius faciliior & multo elegantior pruritus sanandi modus; nempe, ut indusium *aqua font. cum sulphure pulverisat.* *incoctum* & *exsiccatum super nudum corpus per 4.* *vel 5. dies gestetur;* ita namque morbus iste sine balneatione, aut litus squalore; aut malo odore curari solet. Pauperes *flores sulphuris* cum lacte intus fumant.

Alia methodus curationis.

### Farrago sententiarum.

*Art. 1183.* Borellus pro pauperibus & militibus commendat solam *saponis nigri* lotionem, sed citò abluenda est, ne cutem excoriet.

Sapo niger.

*Art. 1184.* ℞. *Pulp. subtilissim. rad. hellebori albi* q. v. *flor. lact.* q. s. m. f. *Unguentum.* Acrem dolorem excitat, & interdum inflammationem; ideoque omnibus minus convenit: morbum verò, ubi usurpari liceat, ferè semper certò sanat. *Decoctum ejusdem radicis* est forsan medicamentum tutius & elegantius.

Radix hellebori albi.

*Art. 1185.* Ex pruritu intolerabili hunc affectum jugiter comitante *animalcula* in causa esse, & morbi essentiam constituere quidam suspicati fuerunt; unde etiam ejusdem *contagium* adeo promptè communicari crediderunt: sed nondum aliquid de hac re compertum habemus nisi quod a D.<sup>o</sup> Bononio traditum invenimus *Philos. Transact.* N. 283. qui (si ei fides adhibenda sit) rem extra dubium posuit: ille enim loco citato animalculum descripsit figura externa instar testudinis, ejusdemque iconem exhibuit; ova quoque factò scrutinio reperit, unde generatione citissima

Animalcula.

quomodo

quemadmodum pediculi producuntur. Curiosus videat locum.

Salivatio.

Art. 1186. In morbo inveterato & remediis aliis haud cedenti excitare licet *Ptyalismum*.

Remedia  
potentio.  
sa.

Art. 1187. In officinis optimum remedium est *unguentum ex oxylapatho*. Potentissima sunt balneum & linimentum ex *Barbette*. Internè *athiop. mineral. bezoar. mineral. carn. viperin. antimon. diaphor. tinct. antimon. decoct. e lignis gum. guaiac. &c.* Externè *unguentum herpeticum*, *unguentum psoricum mercuriale*, *lotio mercurialis*; hæc postrema cum cautione sunt usurpanda.

## IMPETIGO.

*Vuillisi sententia.*

Impetigo  
quid.

Eiusdem  
graphica  
descriptio.

Art. 1188. Impetigo varia sortitur nomina, appellatur *Lichen*, *vitiligo*, *lepra græcorum*, &c. Imprimis papillæ sive pustulæ rubræ, modò singulares, modò plures simul congestæ in variis corporis partibus præsertim verò in brachiis aut cruribus exoritur; quibus singulis novæ adjunguntur; & latius serpentes sese in orbem diffundunt, cujusque harum superficies & nonnihil albida & squamosa apparet, unde, si scalpatur, squamæ decidunt, & ichor sæpè tenuis exsudat, qui tamen mox exsiccat, in squamam rursus crustaceam indurescit. Hic affectus quandoque membra singularia infestat, reliquis partibus intactis; & est naturæ mediæ inter *scabiem* & *lepram*; differt a priori, quoad pustularum formulas; namque in *Psora* ubique ferè singulares, & spatiis licet exiguis, ab invicem remotæ existunt, *hic* plures conglobatim, & quasi per racemos magnis intervallis sejunctos erumpunt. *Lepra* multò immanior est & horrenda, viz. crustacea & squamosa, ubique continua, & per totum corpus diffusa.

Differen-  
tia hujus  
morbi a  
*Psora* &  
*Lepra*.

Art. 1188.

Art. 1189. Impetigo difficulter admodum curatur, & si in affectionem quasi leprosam transeat, incurabilis ut plurimum evadit. Remedia serè tantum magna in curando hoc affectu valent, cuiusmodi sunt *venæsectio, cathartica, mercurialia, seram lactis* (medicatum) *acidula chalybeata, herbarum espressiones succulent. Decoct. e lignis, medicamenta chalybeata, salivatio, &c.* Sæpius lui venereæ aut scorbuti supervenit. Balneatio interdum nocet; novi plures haud graviter impetiginosos *Bathoniam* profectos, inde prorsus leprosos rediisse. *Acidulas purgantes* contra impetiginem levio-rem juvare aliquoties comprobavi, sed plus valent *aqua Tunbrigenses, &c.* sed præ reliquis remedia *viperina* in hoc affectu, ut & in *elephantiasi* & ipsa *lepra* insignem habent virtutem. Inter topica balnea aut linimenta e *pice liquida* confecta, cæteris quibusque longè præstant; formulæ utriusque apud authorem subduntur. Fortissima sunt *unguenta mercurialia*.

Curatio.

Per remedia magna

Art. 1190. "Quantum confert ad hunc morbum curandum corpus in ipso mari frequenter abluere & aquas marinas sapissimè ac diutissimè innatare, est experimentum satis notum & peritissimis medicis comprobatum.

### Ettmulleri sententia.

Art. 1191. Lepra convenit cum scorbuti confirmato; est etenim summus & contumacissimus *scabiei scorbutica* gradus; in lepra verò longè major est succi nutritii corruptio, quam in scabie, quatenus non tantum cutis, sed etiam subjacentes partes carnosæ exulcerantur; scabies ferina & inveterata in lepram degenerare solet. Contagium ad tertiam vel quartam generationem interdum propagari solet. Inter signa externa apparet cutis nunc ad colorem lividum & nigrum

Lepra.

Signa diagnosticæ.

Dd

ver-



vergens, nunc flavescens & ex rubro nigricans. Aeri exposita mox corrugatur, exasperatur & infrigescit, tota apparet unctuosâ, ut aqua ipsi inspersa vix hæreat, sensim crassescit, rugosa & asperior redditur; fursure nunc purpureo nunc albicante, ac si calce incrustata esset, imprimis in facie aspersa videtur, multisque nodositatibus, tuberculis mobilibus & indolentibus, potissimum pone aures, circa frontem, mentum, & artus defœciatur, & morphæa, impetigine, & scabie sicca pertinaci, aliisque pustulis afficitur (de reliquis signis diagnosticis consulatur auctor. p. 587.)

**Prognosis.** Art. 1192. Lepra inveterata incurabilis est; sanguis in lepra foetidus est & nigrescens; serpigo, & impetigo in manuum ac pedum digitis, cum pilis parvis ascendentibus est malum signum.

**Curatio.** Art. 1193. Tanquam *Lues Venerea* curanda est. *Viperina* maximè conducunt. *Balnea*, *Therma*, &c. in usu sunt.

### Turneri sententia.

**Art. 1194.** Lepra Græcorum apud nos saltem non est aded frequens, aut maligna, ac apud externos, ubi comparata sunt *Nosocomia Sti. Lazari*, ut ob funestam morbi contagionem infecti ab humano genere prorsus dissociantur. *Ambrosius Paræus* animadvertit in nonnullis Germaniæ regionibus eam inveniri, sed frequentius in *Hispania*, & per totam *Africam*, & quibusdam locis in *Gallia*.

Quibus  
regioni-  
bus fre-  
quentior  
est.

**Art. 1195.** Lepra ut plurimum circa cubitos & genua primò erumpit, mox latius serpit, & per univèrsum ferè corpus sensim caput attollit.

**Art. 1196.** Lepra hæreditaria & inveterata est prorsus incurabilis. Ad hunc affectum curandum veteres & recentiores quoque commendant remedia *viperina*, item *ex antimonio*, *mercurio*, & *sulphu-*

*sulphure præparata, guaiacum, radices oxylapath, polypod. epithem. &c. Jacobus Dovynetus* virtutes decocti corticis ulmi magnoperè extollit cum vino albo diutius propinati, asseritque remedium esse certum; extat in *Pharm. Bat.* Etiam si omnes ferè scriptores in viperarum laudibus tanti sunt; *Fernelius* tamen & *Palmarius* eas esse omnino inutiles affirmant, præcipuè in corporibus calidioribus. Ipse *pyralismus* ad hunc morbum contumacissimum penitus eradicandum impar frequentissimè invenitur. Inter cætera linimentum sequens in usum adhibere soleo; ʒi. Unguent. e flor. durant. ʒj. mercur. præcip. alb. ʒiʒ. camphor. ʒʒ. vitriol. alb. ust. ʒj. misce. Authorem noster copiosa formulatum segete ex optimis scriptoribus collectarum abundat; & reverà de morbis cutaneis eruditè ac pulchrè scripsit.

Saliva id

*Ex Cl. Deodato apud Fabricium Hildanum.*

*Art. 1197. Elephantiasis Græcorum, seu Lepra Arabum,* est affectus contagiosus plurimum vitiorum congerie corpus desecans. In cute vel faciei, vel frontis, vel genarum, cubiti, femorum, manuum, pedumve tubercula facillè mobilia; indolentia; & ex livore ad rubedinem tendentia; horridumque aspectum præbentia epullulant; in ore, in palato, in faucibus circa linguæ radicem, tubercula nunc flavescencia, nunc sublivida exoriuntur; in pedum digitorum interstitiis, vel in plantis, in crassa præsertim & dura illius parte, item in aliis artuum locis ulcera efflorescunt; hæc ulcera & fissuræ veram cutem penetrant; lata sunt, & ulterius serpunt labiis callosis ac pertumidis, atque læsa facillè cruentant, indolentia licet: ulcera quoque nares depascunt; adsunt tumores in aurium ambitu, crassescunt labia, pedes manusque valde inflatæ ac tumidæ sunt.

Elephantiasis descriptio

*Ettmulleri sententia.*

*Art. 1198.* Elephantiasis *Arabum* ita vocatur, quia cutis tumida, rugosa, & aspera apparet. Senes vino liberalius indulgentes quandoque invadit. Est tumor pedum (crurumque) rubicundus, lividus seu nigricans cum ulceribus varieosis, e quibus serum acre limpidum effluit; interdum etiam solæ crustæ furfuracæ totos pedes occupant (*Lepra est universalis.*) Affectus ut plurimum est criticus, ideoque cavendum est ab externis repellentibus, ne gravius malum excitetur.

Morbus  
describitur.

*Turneri sententia.*

In nostris  
regioni-  
bus vix  
occurrens.

*Art. 1199.* Elephantiasis sive *lepra Arabum* est morbus in nostris regionibus, saltem nunc dierum vix cognitus. Ab *Aretæo* eleganter describitur; nomen accipit (inquit ille) ab aspectu fædo & deformi, ex partium inæquali protuberantia, & cutis densitate ac scabritie, hinc inde rugis & fissuris, labiis tumidis interspersæ, *elephantis* cutem quodammodo referentis. Mendicantem in agro prope *Londinum* jacentem vidimus morbo huic maxime affini miserrimè laborantem.

Est incurabilis affectus.

*Art. 1200.* Hic affectus apud authores *Leontiasis*, & *Satyriasis* appellatur, & ob magnitudinem morbi a plerisque medicis planè incurabilis merito agnoscitur. *Remedia ad lepram Græcorum* si quæ alia, hic locum habent. *Decoctum ulmi Pharm. Bat.* potanti graveolentissimos movet sudores (inquit author) & cum vino albo epotum ab *Elephantiasi* & *Lepra Græcorum* liberat,

## Touucci sententia.

*Art. 1201.* In Insulis Caribarum *Æthiopes* servituti mancipati ( & etiam inter incolas alterius coloris nonnulli ) *Elephantiasi* sunt obnoxii ; gravi alicui morbo ut plurimum est succedanea , iis præcipue , quibus ex dura necessitate infortunium est victu insalubri sustentari , accidere solet . Hic sequitur morbi huiusce *graphica descriptio* , quam videre licet apud authorem , eadem terè cum modo ab *Aræto* memorata . Morbo jam plenè formato homo cæteroquin benè se habet , neque incommoditatem ullam sentit ; nisi molestum onus monstrofi crucis , quocum tamen per viginti annos duræ servitutis muneribus , quibuldam saltè , fungi novimus . *Elephantiasis amputato crure* solet statim alterum invadere .

*Æthiopes  
bus fami-  
liaris.*

## C O M B U S T I O .

*Ex Pavio apud Hildanum .*

*Art. 1202.* Combustio est solutio continui epidermidis , & cutis ut plurimum , nonnunquam etiam carnis musculosæ , venarum , arteriarum , nervorum , &c. vi ignis impressa : hanc autem combustionem sequuntur mox dolor acerbissimus , inflammatio , pustulæ ; & , si combustio profunda , corpusque caeochymicum fuerit , facillimè degenerat in ulcus foetidissimum & malignum .

*Combustionis descriptio .*

*Art. 1203.* Tres sunt gradus combustionis . In primo gradu cutis rubicunda est , dolor acerbissimus & pungitivus , non aliter , ac si cutis urticis fricata esset , mox inflatur locus & elevantur pustulæ , in quibus aqua clara & alba continetur , tandem quoque epidermis separatur ; primum & præcipuum negotium est ut impediatur , ne pu-

*primus gradus .*

Inventio  
f. iativa.

stulæ oriantur, hocque fit locum combustum in oleum vel aquam calidam quantocius immergendop, vel ad ignem admovendo; est etenim ignis proprii inustimali alexiterium; hinc cepæ in mortario cum sale contusæ & pauco saponē empyreuma ad se attrahunt.

Gradus  
secundus.

Art. 1204. In secundo gradu pars illico inflatur, rubescit, dolet, urit, & ipso momento pustulæ elevantur, ægerque de tensione cutis conqueritur; est enim vi ignis contracta atque densa. In hoc casu ubi vera cutis combusta & contracta fuerit, non cepæ, sal, sapo, &c. applicanda sunt, sed remedia emollientia, calida & humida, toti loco ambusto imponatur sequens unguentum; ʒi. Unguent. basil. ʒij. ol. ros. lilior. alb. ana ʒʒ. vitel. ov. N. ij. misce, & applicato defensativo, pars affecta involvenda est fasciâ in oxycrato madefacta; unguento prædicto addi potest crocus, vel etiam opium in extremo dolore.

Gradus  
tertius.

Art. 1205. In tertio gradu ipso momento, dum res ignita adhereat corpori, cutis illic evadit nigra vel saltem livida, & obtusè sentit, si scalpello pungatur; est enim dura & exsiccata crusta, ea cum deciderit, remanet ulcus profundum & putridum.

Curatio.

Art. 1206. Tertius gradus est admodum periculosus; est enim metus gangrænæ; quocirca eschara in diversis locis ad carnem usque incidenda est, idque fieri debet primo vel secundo die; hoc facto, unguentum in secundo gradu præscriptum applicari potest, defensativum, &c. convenit venesectio revulsionis gratia. Sequens autem fomentum vim habet sedandi dolorem, cutem emolliendi, & digestionem promovendi; ʒi. Rad. alth. ʒij. sem. cydon. fenugr. ana ʒʒ. flor. cham. melilot. ana Mj. coq. in aq. font. q. s. pro fotu (& add. sp. vin.) Si verò combustio adeo magna fuerit, ut in gangrænâ degeneret, cautè & cum iudicio pro-



procedendum est, & semper aliquid applicandum, quod putredini adversetur.

*Art. 1210.* Pustulæ statim ab initio in omni combustionione incidendæ sunt, ut aqua-acris & fer- Vesiculæ  
semper  
incidendæ  
vida effluere queat,

*Art. 1211.* In oculorum combustionibus applicentur *defensativa* fronti & temporibus, fluxio Oculorum  
combustio  
humorum ad partem *venæsectione* & omni arte inhibenda est: oculis continuè insillitur *lac muliebri* cum *aq. ros.* (commistum, & applicetur sequens cataplasma; *℥. Pulp. pomor. assat. ℥ij. farin. sanogr. ℥ij. horæ. ℥ij.* coq. in lacte vaccin. & f. cataplasma, cui add. *croc. ℥ss.* Interim universalia rectè instituantur. In omni combustionione, ubi dolor est vehemens & ultra tolerantiam, applicari potest cataplasma ex *mic. panis alb. in lacte coct.* cum paucis *croco* & *opio* ad dolorem mitigandum, ad tempus saltem, sed in oculorum combustionibus cavendum est de *opio*. *Sanguis columbin.* ab animali tepidus eximium habetur *anodynum*.

*Art. 1212.* Magna adhibenda est cura ne turpis cicatrix post combustionem curata relinquatur, ut De cicatrice turpi  
præcavenda.  
autem hoc incommodum vitetur, ab initio usque ad finem curationis *emollientia* sunt usurpanda, & postea applicanda est *lamina plumbea spissa mercurio inuncta*.

*Art. 1213.* Si facies pulvere *bombardico* combusta & grana pulveris cuti infixæ fuerint, illico extrahendus est pulvis, quantum fieri poterit, acu vel alio instrumento acuto; si verò chirurgus in principio non advocatus fuerit, ita ut cutis jam cicatrizzata, maculæ verò nigræ relictæ fuerint, necesse est denuò exulcerare cutem *vesicatorio*.

*Art. 1214.* Ignis a *fulmine* omnium vehementissimus & periculosissimus est, in se continet facultates quasdam supernaturales, quibus animal quandoque protinus extinguitur. Si partes externæ lædantur secundum gradum ulationis sunt medican- Combustio a fulmine.

dæ, sicut in aliis combustionibus, nisi quod putrefacientia & escharam relaxantia hic locum non habent; sed escharæ statim scalpello excidendæ sunt; & internè optima cardiaca sunt propinanda.

### Sydenhami sententia.

Vires sp.  
vini in  
ambustis.

Art. 1215. Omnibus remediis quotquot adhuc inventa fuere, *spiritus vini* facilè palmam præripit in ambustis, cum cutem subjacentem ab omni putrefactione tueatur, ac vendicet, atque eo nomine curationem quam citò absolvat, digestionem, quæ non nisi admodum tardè sua tempora percurrit, etiam non moratus: nempe si lintea *spiritu vini* imbuta partibus ab aqua ferventi, pulvere pyrio, vel simili, laxis, quamprimùm hoc infligitur malum, applicentur, eademque spiritu dicto madefacta subindè repetantur, donec dolor ab igne penitus evanuerit; & postea solummodo bis in die.

### Farrago sententiarum.

Remedia  
varia.

Art. 1216. In ambustionibus superficialiis (inquit Turner) mihi solenne est imponere *ol. lini* & *aq. calc.* simul conquassat. vel *ol. sambuc.* & *alb. ovor.* Vesiculæ aqueæ ressecandæ sunt, & *unguentum diapomph.* vel quod melius est *ceratum nostrum de lapide calaminari* locis excoriatis applicandum. Idem ceratum (pluribus intentionibus satisfaciens) convenit etiam in gradu secundo ambustionis. Et revera est medicamentum omnem superans laudem, non modò in hoc casu, sed etiam in *vulneribus & ulceribus* curandis. Extat apud authorem exemplum curationis ambustionis gravissimæ, in qua tota praxis venustè illustratur. Chirurgus librum consulat. "Ubi plures res partes, vel totum corpus ambustum est, ratio ægri

„ rō ægri convalescunt, sed vehementia sympto-  
 „ matum miserè moriuntur. *Vviseman* commen- Nonnulla  
 „ dat cataplasma ex fimo equino ad empyreuma vulgaris  
 „ extrahendum. *Calx viva* multoties lota cum ol.  
 „ lini vel hyperici, item ceratum ex cerussa & ol.  
 „ lini, spiritus vin. camphorat. &c. sunt remedia  
 „ vulgaria, sed minimè contemnenda. Sequens  
 „ est *Boyleanum*, ℥. Sacchar. saturn. ʒss. acet. vin.  
 „ alb. opt. ʒiv. f. solutio, deinde add. ol. sambusin.  
 „ q. s. ut fiat unguentum.

## C A P U T XII.

*Sive Fasciculus Morborum duodecimus.*

## TUMORES IN GENERE.

Art. 1217. **N** Usquam unquam vidi definitio- Definitio  
 nem tumoris, nisi ex aliqua par- tumoris.  
 te peccantem; quocirca sequentem in medio pro-  
 tuli. Tumor in genere est præternaturalis alicu-  
 jus partis, vel totius corporis, magnitudo mole  
 morbosa aucta.

*Etmulleri sententia.*

Art. 1218. Tumores præcipuè dicti oriuntur vel  
 a stagnatione, hoc est ab impedito fluidorum tran- Tumores  
 situ; vel a congestione paulatina, ubi facta quasi eorundem  
 secretionem tumores procreantur; vel denique per tres spe-  
 ciès.  
 novi humoris in parte generationem & collectio-  
 nem: Exempla primæ speciei habemus in phlegmo-  
 nibus, tumoribus œdematosis, flatuosis, &c. Per  
 congestionem paulatinam nascuntur tumores cri-  
 tici; per novi humoris in parte generationem pro-  
 ducun-

ducuntur tophi, cancri, ganglia, tumores omnes in cystide contenti &c.

Intentiones curative,

Art. 1219. Remedia quod attinet; tumoribus in genere applicanda in tres classes dividuntur (secundum totidem curationis intentiones) in *resolventia*, *discutientia*, & *suppurantia*, repellentibus a medicis sanioribus jam ex usu merito repudiatis.

Resolventia primi gradus.

Art. 1220. *Resolventia*, *emollientia*, seu *attenuantia* primi gradus sunt radices & herbae malv. alb. mercurial. violar. lilior. alb. parietar. flor. melilot. sem. lini, senugr. caricae pingues, uvae passae, axungiae, medulla, ol. amygd. dulc. lilior. alb. unguent. dialth. &c.

Secundi gradus.

Art. 1221. *Resolventia* secundi gradus sunt radices & herb. apii, puleg. cepa coct. charesolii, sambuci, cicut. scabios. flor. hyper. croci, sambuci, chamem. adeps anserin. ursin. gum. tacamahac. styrac. liquid. terebinth. farin. fabar. sperma ceti, ol. cham. amygd. amar. hyperic. laurin. empl. de cicuta cum ammoniac. diachylon. &c.

Tertii gradus.

Art. 1222. *Resolventia* tertii gradus sunt radices & herb. bryon. cucumer. agrest. raphan. cepa crud. asari, scill. absinth. centaur. min. nicotian. sem. sinap. truca, cymini, gum. ammoniac. galban. bdell. sagapen. opopanax. elem. myrrh. nidus hirundin. spir. urinae, armoniaci, spir. vini, fermentum, ol. lateritium, scorpionum, terebinth. lumbricorum, nicotiana, petroleum, bals. sulph. Unguentum martiatum, diachylon. cum gummi, oxycroc. diasulphuris, de cicuta cum ammoniaco, de vanis cum mercurio. Ex simplicibus praedictis varia fieri possunt composita, fomenta, cataplasmata, &c.

Discutientia.

Art. 1223. *Discutientia* sunt praedictis vicina [imò pleraque simplicia & composita resolventium tertii gradus sunt discutientia] talia sunt, quae sequuntur, radices feniculi, ireos, aristolochia rotund. cucumer. asinin. pyreth. zinzib. flor. sambuci, plan-

plantæ aromaticæ, organ. puleg. thym. majoran. rosmarin. absynth. salvia, ruta, sabin. lavend. hyssop. abrotan. flor. cham. melilot. lavend. salv. croci, anthos, bacc. junip. lauri N M. mac. &c. aromata, sem. anethi, cymin. fenic. ruta, sinapeor, castor, camphora, ol. lumbric. cham. cymin. anisi, spica, terebinth. succini, sulphuris, stercora animalium, &c. Ex prædictis simplicibus fieri possunt fots, cataplasmata, &c. sequens cataplasma potenter discutit; ℞. Flor. laur. rosmarin. rut. ana Mj. flor. cham. sambuc. summit. aneth. ana Mß. coq. in aq. & vin. a. p. æ. ad mollitiem, deinde add. far. fabar. fursur. stercor. vaccin. ana ℥ij. mellis ℥iv. m. f. cataplasma. " Fots sequens est valde discutiens; ℞. Summit. hyperici absynth. centaur. min. ana Mij. flor. cham. sambuc. ana p. ij. bacc. junip. laur. ana ℥ß. coq. in lixiv. ten. ℔vj. ad ℔iv. in colatur. dissolv. sal. armoniac. crud. ℥j. & usus tempore add. sp. vin. commun. ℔j.

Art. 1124. Externis hisce commodissime simul adhiberi debent diaphoretica interna ex alcalium republica desumpta.

Diaphoretica interna.

Art. 1225. Suppurantia denique sunt medicamenta, quæ maturationem faciliorem ac promptiorem reddunt; eminentiora autem sunt, quæ sequuntur; radix alth. lilior. alb. brionia, cepæ coctæ, allii sub cineribus cocti, herb. malvæ, alth. flor. melilot. chamæm. croci sem. lini, senugr. far. bord. tritici, mic. panis alb. caricæ pingues, gum. ammoniac. oleum, lilior. alb. chamæmil. unguent. alth. fermentum acre, sapo venetus, stercus bovinum, &c. Sequens cataplasma est valde efficax, ℞. Rad. alth. lilior. alb. ana ℥ij. fol. malv. Mj. pulv. sem. lini ℥j. ad mollitiem coctis add. cep. sub cineribus assat. ℥vj. Unguent. basil. ol. lilior. alb. q. s. m. f. s. a. cataplasma. Præ reliquis egregium suppurans est lac, in quo coctus est sapo venetus, plus minus pro ratione indicationis, hoc appositum

Suppurantia.

tum



tum cum linteis multiplicatis mire maturat & aperit abscessus.

Phlegmone quid.

*Art. 1226.* Phlegmone sive inflammatio est tumor ad tactum renitens cum tensione; rubore, dolore pulsatorio, & ardore; nunc quidem genuina ex sanguine puro, nunc vero spuria, ad erysipelata, vel œdematosos tumores, vel scirrhus proprius accedens. Omnes inflammationes vel insensibiliter discutuntur, vel suppurantur, male tractatæ in gangrænam abeunt.

Prognosis.

Curatio.

*Art. 1227.* Internè conveniunt *sudorifera ex alcalibus*; & omnia ea, quæ in *pleuritide* usitata sunt, hic commodè usurpari possunt; v.g. *sperma ceti* cum *antimon. diaphoret.* additis quibusdam *salibus volatilibus*. Externè in initio decoctum *sulphuris* in urina, quod a *Paracelso* laudatur, item *stercus vaccinum, equinum, &c.* Si sit erysipelata conducit *spir. vin. camphorat.* cum *flor. sambuci* incoct. In ardore magno religiosè vitanda sunt oleosa. Si discuti nequeat remediis suprà memoratis, ad suppurationem producenda est medicamentis appropriatis, modò recensitis; & quum maturus fiat, nisi sponte rumpatur, aperiendus est abscessus vel lanceola vel caustico ex *lixivio de sapone & calce viva in lapidem simul coctis*; & postea mundificandus, & consolidandus; omnibus his intentionibus satisfacit linimentum sequens, *℞. Terebinth. clar. ℥j. mel. ros. ℥vj. bals. peruv. vitel. ov. solut. ℥ss. misce f. linimentum digestivum.*

Inflam-  
matio  
mammarum.

*Art. 1228.* Sæpè ex lactis coagulo in mammis, aut quod aliàs stagnat aciescentia vitiosa inflammatio mammarum lactantibus accidit; hæc autem aliquando est erysipelacea; adsunt tumor, dolor, rubor, &c. Inflammationes omnes mammarum sunt periculosæ, quia ut plurimum abeunt in *abscessus*, & hinc in ulcera saniosa, interdum etiam in *fistulas*: si non abeunt in abscessus,

Prognosis.

sus, indurantur in *ferrhos*, qui levi errore abeunt in *cancros*: rarissimè enim inflammationes mammarum, in specie ex lactis coagulo, discuti possunt.

*Art. 1229.* in genere in omnibus mammarum *Curatio;* affectibus observandum est, quod mamilla affecta rarè ad sanitatem perducatur, nisi altera sana lacte exsiccetur, quia dum lac influit ad unam mammam, etiam fluit ad alteram, & sic malum exasperatur. *Aqua calcis vivæ*, si quæ alia, inflammationem omnem avertit, resolvit, & discutit. Unum ex expertissimis ad mammarum inflammationes remediis est cataplasma factum ex farinis, viz. *Ex farina fabarum, lupinorum, & lentium in oxycrato coctis, & subactis & cum albuminis ovi pauco mistis*; emplastrum de *spermate ceti Mynsicht.* empl. de *cicuta*, &c. inflammationes similiter resolvunt. Sed rarè discutiuntur hi tumores, idèdque tutius est suppurationem promovere.

*Art. 1230.* " Ubi tumor est durus sine inflam- *Tumores*  
matione, convenit sequens ceratum. *℞. Sum-* *duri.*  
mit. absynth. pulv. ℞ij. sem. lentium, fenugr. sœ-  
niculi ana ℞i. succ. hyoscyam. cicut. ana ℞iij. un-  
guent. dialtheæ ℞ij. axung. anatis, anseris ana  
℞i. sevi cervin. ℞ij. styrac. liquid. ℞ss. ceræ q. s. f.  
ceratum. Cicuta per se applicata nimium in-  
calescit, & cutem exulcerat, sed in vino co-  
cta, & cum axungia porcina contusa hocce tū-  
mores duros emollit. *Vviseman.*

*Art. 1231.* Inflammatio testium frequentissimè *Inflam-*  
oritur ex ictu vel compressione violenta inter e- *matio tes-*  
quitandum; adsunt dolores gravissimi, & non- *tium.*  
nunquam convulsiones (& vomitus), & interdum metus est gangrænæ, nisi cito discutiatur: aliquando in abscessum tendit.

*Art. 1232.* Curam quod attinet mittatur san- *Curatio;*  
guis copiosissimè quamprimùm & injiciatur ene-  
ma

*ma leniens & emolliens*; interna eadem esse debent, ac in aliis morbis inflammatoriis. Externe pro discutiendo tumore & resolvendo expertissimum est cataplasma ex *farina fabarum cum oxycrato cocta & applicata*; addi etiam commodè potest *sem. cymini*, item *flores chamæmeli & meliloti*, & erit magis discutiens: si tumor discuti nequeat, *suppurandus* est cum maturantibus mitioribus; Inflammatio malè curata plerumque in scirrhum transit; & quandoque in cancerum abit, præsertim si punctiones acutæ sentiantur: in hoc casu *discutientia* sunt usurpanda; maximè autem conducit *Emplastrum de cicuta cum ammoniaco*.

In scirrhum vel cancerum transiens

Forunculus quid.

*Art. 1233.* Furunculus (quem nos vocamus *a Boil*) est inflammatio parva in locis extimis orta, in acutum tuberculum tendens; ovum columbinum magnitudinè non excedens, cum rubore & dolore, interdum cum ardore atrocissimo, ac si carbo igneus admotus esset.

Quomodo gradaturus est.

*Art. 1234.* "Furunculi ut plurimum periculo vacant; demonstrant plerumque constitutionem firmiorem, materiam peccantem foras propulsantem. Repellere est nefas, discuti non possunt, nec debent; frequentius sponte sua suppurantur, & aperti ex se coalescunt; si non tantillo *balsami peruv.* consolidari possunt. Si *habituales* sint; internis *alterantibus* præcavendi sunt, in quem finem *rosmarinus*, item *radix bardanæ* a quibusdam specificè prodesse habentur.

### Sennerti sententia.

Parulis.

*Art. 1235.* Gingivæ quandoque inflammatione (quæ Græcis Parulis dicitur) cum dolore corripuntur, & apostemata patiuntur; quæ in ulcera, interdum cancerum, fistulas, gangrænam desinunt.

Prognosis.

Malum per se patet, quod nisi maturis prædiis succ-

succurrantur , in apostemata & ulcera diuturna , imò nonnunquam in gangrænam , vel in cancerum incurabilem abit .

*Art. 1236.* Per *revulsionem* , *derivationem* , & *Curatio* *gargarismata appropriata* , &c. opera danda est in initio , ut præcaveatur apostematio ; si verò ad sup-  
purationem vergeat ; *caricæ* per medium discissæ im-  
ponantur . Si abscessus sponte non aperiatur , scal-  
pello aperiri potest . Apertus abscessus *hydromeli-*  
*ze* mundetur , tandemque uleus exsicceetur & clau-  
datur .

### *Celsi sententia .*

*Art. 1237.* Pessima pustula est , quæ Epinyctis *Epinyctis*  
vocatur , ea colore vel sublivida , vel subnigra , *quid .*  
vel alba esse consuevit ; circa hanc autem vehe-  
mens inflammatio est , & cùm aperta est , reperi-  
tur intus exulceratio mucosa , colore humori suo  
similis . Dolor ex ea supra magnitudinem ejus est ,  
neque enim ea faba major est . Atque hæc quo-  
que oritur in eminentibus partibus , & ferè no-  
ctu , unde nomen quoque a *Græcis* ei *Ἐπινυκτίς* est  
impositum . “ Periculosa non sunt hæc tubercula ,  
„ molesta tamen ob dolorem ; noctu inquietudi-  
„ nem pariunt , & adustum ac vitiosum succum  
„ in corpore redundare significant . Omnino sup- *Quomodo*  
„ purandæ sunt epinyctides , saniem ejiciunt san- *tractandæ*  
„ guineam , *digestivis* & *mundificativis* tractan- *sunt .*  
„ dæ sunt , & , ut *furunculi* , curandæ .

*Art. 1238.* Huic tuberculo cognatum esse cre- *Termin-*  
ditur *Terminthum* ; verùm quid propriè ter- *thus .*  
„ minthus antiquorum fuerit [ inquit *Sennertus* ]  
„ vix satis constat , nisi quantum ex *Galeno* ha-  
„ betur , qui scribit terminthorum nomen nigras  
„ quasdam pustulas in cruribus maximè orientes ,  
„ a figuræ , coloris , magnitudinisque similitudi-  
„ ne , quam cum terminthorum , id est , cicerum  
fructu

„ fructu ( ut vulgè vertunt , seu ut alii , & re-  
 „ etiùs terebinthi fructu ) habent , derivatum , si-  
 „ gnificare.

## PHYMA, PHYGETHLON, BUBO & PAROTIS.

*Hi sunt quatuor Glandularum Tumores Inflam-  
 matorii insigniores.*

*Ettmulleri sententia.*

**Phyma.** *Art. 1239.* Phyma est tumor glandularum [ sub  
 maxilla inferiore ] rotundus , acuminatus , plus  
 minus rubens ac dolens , statim augetur & sup-  
**Curatio.** „ puratur. “ Facilius curatur in pueris , difficilius  
 „ in juvenibus & adultis , sed in his rariùs acci-  
 dit. “ In cura a repellentibus cavendum est ; na-  
 tura in hujus suppuratione potissimùm occupata  
 est , ideoque illius conatus adjuvandus est medi-  
 camentis *maturantibus* impositis. “ Applicari po-  
 „ test *diachylum cum gummi* , sed præstat cataplas-  
 „ ma *suppurans*.

**Phyge-  
 thlon.** *Art. 1240.* Phygethlon , Latinis Panus ob simi-  
 litudinem fungi arbori adnascentis , est tumor du-  
 rus , phymate major magisque rubens ac dolens .  
**Curatio.** Curatur ( interdum ) *discutientibus* , pro quo scopo  
 convenit *oleum tartari fatidum* vel *ligni guaiaci* ,  
 his interdum *emollientia* cum *anodynis* junctis ad-  
 duntur , &c. sed frequentius suppurantur.

*Sennerti sententia.*

**Bubo.** *Art. 1241.* Bubo est tumor inflammatorius in  
 inguine vel sub axilla ; cum rubore & dolore ap-  
 paret , & plerùmque febris levis accidit ; & qui-  
 dem si per erisipin accidit bubo , eodem erumpen-  
**Prognosis.** te , statim levatur alius morbus. Bubones *benigni*  
 ( non



[ non enim hic de *venereis* & *pestilentialibus* agitur ] non sunt periculosi præcipuè si statim suppurantur; si verò diu protrahantur, & tardiùs maturantur, periculo non vacant, cùm in fistulas periculosas faciliè abeant.

*Art. 1242.* Curatio bubonum & aliarum inflammationum instituenda est eadem; hoc tamen probè notandum est, quòd *suppurantia*, quæ adhibentur debeant esse *fortiora* quam in aliis inflammationibus; glandulæ etenim sunt frigidiore quàm aliæ partes, neque habent aded exquisitum sensum. “ Quamobrem *cucurbitæ* cum fructu applicari possunt; in hunc finem etiam conducunt *fermentum acre*, *sapo niger*, *stercus columbinum*, *sem. sinap.*, *urticæ*, *caricæ cepæ assatæ*, &c.

*Ettmulleri sententia.*

*Art. 1243.* Parotides sunt glandularum pone aures inflammationes: plerumque post malè judicatas febres protruduntur a fausto naturæ conatu. Maturationi opera danda est, & tractandi sunt sicut *bubones*, & aliæ inflammationes ad suppurationem vergentes.

*Art. 1244.* “ *Ranula* est tumor sublingualis, „ mollis, albicans, & quasi pellucidus, œdematis speciem præ se ferens, linguæ motum ac „ loquelam impediens. Periculo ut plurimum vacat, nisi diuturnior fuerit, vel malè tractatus; „ tunc enim metus est, ne *cancrosus* evadat.

*Art. 1245.* “ Aperiendus est cultro, vel potius „ ferro ignito, prodire solet mucus ovi albumini colore & consistentia similis. Compertum „ est etiam aliquando *lapillos* ibidem generari; „ ideoque a chirurgo semper explorandi sunt. „ Post apertionem os abluatur sæpius in die cum „ decocto *hordei mel. rosar. & tinct. myrrh.*

Parony-  
chia quid.

*Art. 1246.* Paronychia est tumor ordinariò ob-  
veniens in extremitatibus digitorum, ultimis nem-  
pè articulis, ita tamen, ut non excludantur reli-  
qui articuli. Quandoque est erraticus, & ex uno  
digito in alium transit, ita ut uno perfuncto mox  
vicinus inquinetur, donec omnes successivè infe-  
staverit: tantus est dolor, ut subindè universum  
brachium consensu afficiatur. Oritur ex humore  
acri admodum corrosivo, immediatè *periosteum*,  
& ipsi adhærentes *tendines*, occupante; superve-  
nit inflammatio ad apostema vergens, sed frequen-  
tius *gangrænescit*.

Causa.

Curatio.

*Art. 1247.* Quo citiùs ichor maturatur, eò mi-  
nus periculum est ossis cariei, in hunc finem qui-  
dam applicant *sterquilinum*, & sic dolor & tu-  
mor optimè discutitur, & sistitur: "Cataplasma  
,, *Lumbricorum vivorum* subitò atrocem dolorem  
,, sedat, uti testantur plurimi authores. " Ubi  
verò paronychia altiores egerit radices, opus est  
*incisione*, quæ etiam tutissima est, & quidem us-  
que ad ipsum os; facta incisione *theriaca* cum *spi-  
ritu vini* soluta digito applicanda est.

Parony-  
chia pedis  
digitorum

*Art. 1248.* Huc quoque pertinet affectus perni-  
ciosissimus, qui *pollices pedum* cum doloribus atro-  
cissimis infestat, & nihil aliud est quam *paronychia  
pedis digitorum*, cui gangræna & sphacelus; & tan-  
dem mors subsequitur. Ex eadem causa provenit,  
& eandem medendi methodum postulat. Tutissi-  
ma est digiti *resectio*.

Dum spe-  
cies.

*Art. 1249.* " Paronychia revera est malum mi-  
,, nimè contemnendum, *Latinis* dicitur *panari-  
,, tium*; ejusdem duæ sunt species, una *benigna*,  
,, vulgo a *Mbitflavv* appellata; altera *maligna* a  
,, *Felon* dicta; in priori specie suppuratio facilè  
,, procuratur, & materia albicante emissa facilli-  
,, mè sanatur. Altera verò est periculosissimum  
,, malum, & ferè nunquam curatur sine *incisione*  
,, *matura* ad os usque.

*Art. 1250.*

## CAP. XII.

*Aneurisma.*

435

*Art. 1250.* Perniones pedes & manus affligunt tempore hyemali; partes affectæ tument, & ex albedine ad aliqualem cærulescentiam inclinant, (pruriunt vehementer) dolent, & tandem, nunc cum, nunc sine exulceratione evanescent. (præmissis universalibus) Partes affectæ illinantur cum *petroleo*, quod præservat & curat. "*Unguentum rosæ, satum cum ol. terebinth. in rapo affato est remedium* Pernio.  
*comprobatum (inquit Vviseman).* Curatio.

## A N E U R I S M A.

*Sennerti sententia.*

*Art. 1251.* Aneurisma est tumor ex tunicæ interioris arteriarum apertione, & exterioris dilatatione: aperitur vel venæsectione imperita; cum exterior tunica, utpote mollior, coalescit denuò, interior, ut durior, aperta manet; vel a causa externa. Aneurif. ma unde fit.

*Vvisemani sententia.*

*Art. 1252.* Noster clarissimus *Vviseman* existimat aneurismata non fieri ex dilatatione vel relaxatione tunicæ exterioris arteriæ, sed potius ab *ambobus tunicis ruptis*, vel *sauciatis*, undè tumor ab effluxu sanguinis in musculorum interstitiis efformatur: hæc autem opinio multò probabilior videtur; utcunque sit tamen; eodem res redit, quoad curandi methodum. Opinio nostratis Vvisemæ.

*Art. 1253.* "Aneurismata quandoque fiunt proculdubio simplici arteriæ tunicarum dilatatione (ut cum sanioribus quibusdam medicis sentiamus) quemadmodum in *venis varicosis* frequentissimè accidere solet; saltem in hunc modum ab origine plerumque nascuntur, utcunque tamen diuturniora cum fuerint, & in gran-

„ dem molem aucta , tunicæ arteriales multis in  
 „ locis rumpuntur , præcipuè interna , ut ex om-  
 „ ni sectione patuit . Accuratam hujus affectus hi-  
 „ storiam si quis velit , adeat *D. Freind. Histor.*  
 „ *Med. p. 179. &c.* Pro accuratiore adhuc aneuris-  
 „ matis naturæ explicatione , Vid. *Philos. Trans.*  
 „ *N. 402.*

Historia.

*Art. 1254.* “ In *Transact. Philosoph. N. 265.* In-  
 „ signis extat *Historia Aneurismatis Aortæ* , Hò-  
 „ mo per infortunium aliquod violentam pectò-  
 „ ris concussionem passus in *Hæmoptysin* incidit ,  
 „ qua diutius perseverante tandem mortuus est .  
 „ Secto cadavere *Aneurisma Aortæ* repertum erat  
 „ adeo ingenti mole , ut totum latus Thoracis dex-  
 „ trum impleverat .

### *Ettmulleri sententia .*

Aneuris-  
 mus. wau-  
 sa N. B.

*Art. 1255.* Aneurisma est tumor a collectione  
 sanguinis arteriosi ab arteria exesa aut laxata ni-  
 mis , aut rupta ex quacunque violentia , ab im-  
 perita in venæsectione vulneratione . Frequentia  
 sunt aneurismata a vehementi *cordis palpitatione* ,  
 ita ut ramus arteriæ descendens intumescat . A-  
 neurisma frequentius collum occupat , interdum  
 crura & brachia , sed rariùs , ex violenta commo-  
 tionem . Est tumor mollis tactui cedens , aliquando  
 tamen non cedens , aliàs , cum , aliàs sine pulsu ,  
 colore a reliqua cute non variat . “ *Exinde ma-*  
*ximum periculum habet* , “ quod interdum ab im-  
 peritis chirurgis habeatur pro abscessu suppurato ;  
 undè si aperiatur , subito sub manibus ægri cum  
 sanguine animam emittunt . “ In collo nè unum  
 „ quidem curatum vidi ( inquit *Barbette* ) , pallia-  
 „ tiva cura diu vivere possunt .

Diagnos.

Prognosis

Curatio .

*Art. 1256.* Si aneurisma sit a venæsectione ine-  
 pta , mox ligetur pars læsa *ligatura* forti , & fiat  
*venæsectio* in latere opposito . Curiosum est quod  
 obser-

CAP. XII. *Varix, & Hæmorrhoides.* 437  
 observat *Horstius*, quod applicatio *laudani opiati*  
 arteriæ hæmorrhagiam sistat. Notum est empla-  
 strum *Galenii ex thure, aloë, pilis leporinis, & al-*  
*bumine ovi*, item multum conducunt *lamina plum-*  
*bea, emplastra astringentia* (cum *sacchar. saturni*): His irritis cura per operationem chirurgicam  
 facienda est, viz. per *deligationem* arteriæ [super-  
 nè tantum]. De nova methodo *Gallorum* in aneu-  
 rismate vide locum p. 1246.

## V A R I X.

*Ettmulleri sententia.*

*Art. 1257.* Varix est tumor ex laxata venarum tunica; unde sanguis in venis ferè stagnat. Ma-  
 lum est frequens mulieribus in ultimis gestationis  
 mensibus, uti & post partum difficilem. Hic affe-  
 ctus quibusdam non parum proficiuus est ad con-  
 servandam sanitatem, in specie melancholia hy-  
 pochondriaca (unde fluxus hæmorrhoidalis iis sa-  
 lutaris est.) Varix  
quid.

*Art. 1258.* Cura a *ligatione* magna ex parte pen-  
 det, fons ex *alum. suet. acac. [flor. ros. rub. corti-*  
*querc. &c.]* in aceto coct. convenit. In ruptura  
 venarum, & gravi hæmorrhagia optimum eupori-  
 ston est *stercus suillum* forma pulveris adpersum  
 cum linteis ex *astringentibus* expressis & admotis  
 cum *fasciatione*. &c. Curatio:  
In ruptura  
venarum.

## H Æ M O R R H O I D E S.

*Vvisemani sententia.*

*Art. 1259.* Hæmorrhoides ani sunt venarum hæmorrhoidalium tumores *varicosi*, morbus est  
*simplex*, quando venæ solæ intumescant, vel *com-*  
*positus*, cum partes vicinæ efficiantur, vel cum Hæmorrhoides.  
quid.

Ee 3 quasi



quasi novum corpus generetur ipsis adhærens, vel appendens; unde ( ob similitudinem aliqualem ita dicta ) *figus*, *crista Galli*, *condylomata*, &c. producantur.

*Aperitæ*  
*vel cæcæ.* Art. 1260. Hæmorrhoides sunt vel *apertæ*, i.e. sanguinem effundentes, vel *cæcæ*, tumentes, scilicet, sine hæmorrhagia, exquisitè tamen dolentes.

*Curatio.* Art. 1261. Alvus aperta sedulo servetur. Ad inflammationem, quæ sæpè accidit, valet sequens fortus; *℥. Fol. plantag. polygon. summit. rub. equiset. ana Mß. flor. verbasco. Mij. lim. lini ℥ij. flor. ros. rub. cort. granat. balaust. bacc. myrs. ana ℥vj. coq. in q. f. aq. font. & vin. rub. pro fotu. In extremitate doloris, ℥. Ol. vitel. ov. ℥ij. opii gr. vij. m. item bals. sulphur. Rulandi dolorem sedat.*

*In dolore*  
*magno.* Art. 1262. In fluxu nimio sanguinis, *venæsectio*, *cucurbitula*, &c. conveniunt revulsionis gratia. Internè *astringentia* & *opiata*, quemadmodum in aliis hæmorrhagiis; externè *suppositoria ex cort. granat. flor. balaust. thure, mastich. &c. cum. gum. tragacanth. ichthyocol. alb. over. &c.*

### Ettmulleri sententia.

*Differen-*  
*tia ab alio*  
*morbo.* Art. 1263. Distinguendus est ante omnia fluxus hæmorrhoidalis verus, a Diarrhœa cruenta scorbuticorum, alias vocata dysenteria scorbutica mendosa ( 636. ) Hæmorrhoides veræ attritu excrementorum plerumque aperiuntur, & sanguis cum excrementis una evacuatur, sed si sanguis promiscuè excernatur tam ante quam post excrementa sine dolore & torminibus, probabile est, quod sit fluxus scorbuticus. Hæmorrhoides ad venerem omnino impotentes reddunt cum magno foeminarum tædio.

*Aperitiõ.* Art. 1264. Hæmorrhoides consueto fluore suppresso, sive in cæcas degenerantes, aperiendæ sunt; de aperiendis iisdem vide locum p. 173. Remedia

*media aloctica* fluxum hæmorrhoidum promovent .  
 „ Externè. convenit *hirudinum* suctio , vel frictio  
 „ cum *foliis ficus recentibus modicè tritis*, quæ for-  
 „ ti impressione lac acre ac ferè causticum plo-  
 „ rant , cujus acrimonia vasa tumentia successivè  
 „ aperiuntur ; vel si hoc non sufficiat , intrudan-  
 „ tur *suppositoria ex hiera picra cum pulvere co-*  
 „ *locynthidos & melle parata* , quæ hæmorrhoides  
 „ insigniter stimulant , & cataplasma *ex stercore*  
 „ *columbino* , *sem. staphidis agriæ & lupinorum* ap-  
 „ plicari potest . “ In doloribus conducit fons ex  
 decoct. *verbasc. flor. sambuc. & sem. hyoscyam.* Lau-  
 datur *scrophularia* , sed *chelidonium minus* est instar  
 omnium pro usu interno quocunque modo usurpa-  
 tum . *Camphora & sacchar. saturni* pro usu exter-  
 no in unguentis . Ad hæmorrhoidum exulcerationem  
 linimentum *ex auro fulminante* , & *ol. amygd.*  
*dulc.* est singulare experimentum apud *Anglos* .

Dolores.

Varia  
Remedia.*Riverii sententia.*

*Art. 1265. Mercurialis* docet *tamarindos* præcipuè  
 miram potestatem habere ad compescendum hæ-  
 morrhoidum fluxum . In fluxu immodico fons ex  
*verbasc. tapso barbato, sol. plantag. flor. ros. rub. ba-*  
*laust. &c. in aq. ferrat. & vin. astringent. decoct.*  
 convenit ; ut & *unguentum comitiss.* curato hæmor-  
 rhoidum fluxu , præcavendum est , nè redeat , quod  
 fit *victus* ratione convenienti , *venæsectione* bis vel  
 sæpius in anno , *purgatione leni* , &c.

Fluxus  
immodi-  
cus .

*Art. 1266. Oleum buxi* præ cæteris dolorem le-  
 nit , si illius gutta una supra hæmorrhoides appo-  
 natur , vel cum *ol. sem. lini* misceatur , item *sac-*  
*charum saturni in aq. ros.* pro fots dolore sedat .

Ingra-  
dore .

## Mayernii sententia.

Remedia  
 varia, ex-  
 terna, &  
 interna.

Art. 1267. Chalybs seu, ferrum est specificum in hoc affectu obstructions viscerum tollens, atran-  
 bilem domans & plurimum dulcificans, viscera  
 roborans, &c. Cerevisia parari potest cum batti-  
 turis, vel ferri rubigine, & herbis & radicibus  
 specificis, &c. *Aqua Spadenses & minerales aci-  
 dulæ*, multum valent. *Vernix*, qua utuntur picto-  
 res, est remedium singulare in curandis hæmor-  
 rhoidibus, tam apertis, quàm latentibus; si aper-  
 tæ fuerint, & nimis tenaciter vernix cuti adhæ-  
 reat, addatur *ol. rosarum*: hujus usu sanatus est  
*Carolus quintus* a muliere, cum nulla ope curari  
 posset: vernix autem præparatur ex *ol. lin.* ℥xij.  
*tereb. ven.* ℥iv. *sandarac. purissim. sive gum. junip.*  
 ℥iij. liquentur simul lento igne, &c. De *supposito-  
 riis* vide locum. ʒ. *Unguent. popul.* ℥ij. *cochincl.*  
*in alkool. lævigat.* ℥ij. *sacchar. saturn.* ℥j. *ol. hyperic.*  
 q. s. misceantur diuturna agitatione in mortario  
 plumbeo, s. unguentum e bombyce applicandum &  
 continuè gestandum.

## Farrago sententiarum.

Vires  
 scrophu-  
 larum.

Art. 1268. Si quis hæmorrhoidum dolore insa-  
 no torqueatur, (inquit *Sennertus*) minimum quid  
*scrophulariæ*, vel radicis vel foliorum, cum cibo  
 aut potu capiendo, statim dolore liberatur, sive  
 ipsam plantæ substantiam siccam vel viridem, si-  
 ve decoctum ejus assumat. Sedandis hæmorrhoi-  
 dum doloribus (inquit *Chefneau*) præstantissi-  
 mum est *unguentum de linaria a Voulphio* inven-  
 tum, & pluribus medicis *Germania* communica-  
 tum; simile anodynum, licet variis usus fuerim,  
 nunquam inveni; sequenti modo paratur. ʒ.  
*Herb. linar. cum floribus q. v. decoquatur cum adi-  
 pe por.*

Unguent.  
 delinaria.

**CAP. XII.**      *Hernia Varicosa.*      441  
*pe porcin. quousque adeps valdè virescat fiatque  
unguentum, usus tempore adjiciatur vitelli ovi  
tantum quantum unguenti quantitas requirit.*

*Art. 1269. Cepe vel porrum sub cineribus co-*  
*ctum cum ol. ros. & pauco croco valdè laudantur*  
*a Solenandro ( & pro certo porrum cum butyro*  
*in sartagine frixum dolorem quasi ad miraculum*  
*sedat. ) De viribus chelidon. minoris in hoc affe-*  
*ctu consulatur Solenander, qui de hoc morbo é-*  
*gregiè scripsit. Oleum succini per se usurpatum*  
*dolorem atrocissimum compescit. Sequens lini-*  
*mentum est admodum proficuum, ℥. Balsam.*  
*sulph. terebinth. unguent. nicotian. ana p. æ. m.*  
*f. liniment. & sequens Boyleanum, ℥. Sacchar.*  
*saturn. ʒß. acet. opt. ʒiv. ol. sambucin. q. s. m. f.*  
*linimentum. Rosmarinus singulis auroris come-*  
*stus hæmorrhoides penitus tollit. Ad dolorem &*  
*ardorem compescendum, & fluxum immoderatum*  
*lentè sistendum, instar areani ( inquit Dolæus )*  
*medicis junioribus commendo vile sed proficuum*  
*hoc remedium. ℥. Alcohol. lapid. scissil. q. v. cum*  
*butyri non saliti q. s. f. unguent. Aliquando etiam*  
*sequentia in usum adduci possunt; Tabulæ divinæ,*  
*fotus ad hæmorrhoidum dolorem, fotus ad hæmor-*  
*rhydum fluxum immodicum, electuarius styptic.*  
*Cataplasma de ovis, enema de verbasco, unguen-*  
*tum hæmorrhoidale.*

*Cepæ &  
porri, &c.*

*Etmulleri sententia.*

*Art. 1270. Hernia varicosa est tumor varico-*  
*sus venarum spermaticarum; tactu patet, quasi*  
*funiculi tensi hinc inde obliquè distributi & nodi*  
*inæqualiter uvæ in modum conglomerati obser-*  
*vantur, cum testiculi plùs minùs relaxatione; do-*  
*lor aliqualis ( aliquando acutus ) percipitur. Dif-*  
*ficile est malum, & quod etiam interdum can-*  
*crofi aliquid occultum habet.*

*Hernia  
varicosa.*

*Art. 1271.*

**Curatio.** *Art. 1271.* " In genere medicamenta quæ con-  
 ,, ducunt in aliis tumoribus *varicosis*, præcipuè  
 ,, *hemorrhoidibus cæcis* in hoc affectu etiam sunt  
 ,, proficua; *deligationem* aptam vix admittit; o-  
 ,, pem fert *psychrolusia* vasa relaxata contrahen-  
 ,, do firmandoque; ut & lotiones & fofus altrin-  
 ,, gentes frigide usurpati, & præ reliquis sequens,  
 ,, *℞. Liquor. cortiariorum*, quo utuntur *subigendis*  
 ,, *cortis* ℞i. *sacchar. saturn.* ℞i. *alum.* ℞ss. f. so-  
 ,, lutio quæ sit pro usu prædicto; conveniunt *ve-*  
 ,, *næsectiones*, purgationes cum *Hellebor. nigr.* &  
 ,, *calomel.* *Rubigo ferri cum gum. Ammoniac. mil-*  
 ,, *lepedes*, *Tinctura Hellebor. nigri*, *absorbentia*,  
 ,, *antiscorbutica*, &c. sed ante omnia *oleum lini*  
 ,, frequenter intus sumptum expertus laudo.

**Oedema.** *Art. 1272.* Oedemata sunt tumores molles, qui digito prementi cedunt, & pressionis vestigia diutius retinent, frigidi, indolentes, & albicantes, sæpius in cruribus evenientes. In leucophlegmatia totum corpus œdematosum videtur. " Oedema frequentissimè a pituita sola originem trahit, & *perfectum œdema* nominatur; quandoque verò cum aliis humoribus mixtum est, & *imperfectum* appellatur; hujusmodi sunt *Oedema Phlegmonodes*, *Erysipelatodes*, *Scirrholes*, &c. " Hi tumores aliis morbis plerumque supervenire solent, imprimis chronicis, interdum etiam affectibus soporosis & convulsivis, gravidis quoque familiares sunt.

**Curatio.** *Art. 1273.* Conveniunt internè *stomachica* & *aromatica*, intermistis interdum *sudoriferis* & *diureticis*; externè fofus & cataplasmata *discurientia* ex *absynth. roremarin. cham. salv. puleg. rut. flor. sambuc. melilot. cham. bac. junip.* in lixivio & vino coct. addi potest etiam *sulphur vivum* inter coquendum. *Stercus* quorundam animalium cum *urina humana* valde proficuum perhibetur.

*Vvise-*



*Voisemani sententia .*

*Art. 1274.* Oedema ut plurimum non est peri- Prognosis.  
 culosum; quidam corporis crassioris, & crapulosi  
 cruribus oedematosis diutius vivunt; ex hydropse  
 aut phthisi malum caloris nativi defectum osten-  
 dit; in abscessum tendens periculosum est; si in-  
 durefcat, in scirrhum abire solet. Quoad curam  
 medicamenta interna eadem sunt ac in *cachexia*  
 & *hydropse*; externa *discutientia*, *fasciatio*. “Præ  
 „ reliquis verò pro ulu interno recordandum est  
 „ *tincturam Hieram* eximias vires obtinere.

*Ettmulleri sententia .*

*Art. 1275.* Scirrhus est tumor durus tactui re- Scirrhus  
qualis est  
tumor.  
 nitens, indolens, immobilis: ut plurimum sen-  
 sim generatur in partibus mollioribus; præter  
 glandulas occupat alias partes, imprimis carno-  
 sas, sive internas, nempe viscera, sive ex-  
 ternas quasunque. N. B. Scirrhus est vel indo-  
 lens & *legitimus*, vel *dolens* & præterea nonni-  
 hil livescens & nothus qui subinde est cancrusus,  
 undè si curatur periculum est, nè in cancrum de-  
 generet. “ Scirrhus, qui doloris est expers, & Prognosis.  
 „ cui pili increscunt, incurabilis omninò habetur;  
 „ coloris lividi valdè periculosus & sæpius in can-  
 „ crum degenerat; imperfectus exiguus, aliquo  
 „ modo dolorificus, aliquando licet rarissimè cu-  
 „ ratur.

*Art. 1276.* “ Quoad curam instituenda est ca- Curatio.  
 „ tharsis cum mercurio dulci & helleboro nigro,  
 „ & aliquoties repetenda; & in intervallis cum  
 „ fructu exhiberi possunt *pulveres absorbentes*, *an-*  
 „ *timon.* *diaphoret.* *cinnab.* *antimon.* *Elec. nigrum*,  
 „ *decoctum e lignis*, *milleped. viv.* vel *præp.* “ In-  
 terim externè usurpanda sunt *resolventia* fortiora  
 cum

cum *discutientibus* moderatis permista, ut tumor successivè resolvatur. *Stercus bubulum* aceto incotum scirrhum mirificè dissipat; item *oleum tartari rectificatum*, *fatidum* licet, tumores duros potenter emollit & discutit, ut etiam cataplasma ex *brion.* cum *stercore caprillo*. Scirrhus, si non potest sensim resolvi, non est suppurandus, ne canerosus evadat, intactus omnino est relinquendus, aut applicatione *nitri* in aceto dissoluti in lapideam duritiem indurandus. " Scirrhus, qui omni sensu destituitur, est incurabilis.

Scrophula

Curatio;

*Art. 1277.* Strumæ seu scrophulæ sunt tumores vel *indolentes* & benigni, vicinis partibus colore similes, mobiles, &c. vel *dolentes*, fixi, colorem subcæruleum vel sublividum repræsentantes, hæc strumæ malignæ dicuntur, vix aut ne vix quidem curabiles. Prioris generis strumæ *discutientibus* tentandæ sunt; *emplastrum de cicuta cum ammoniaco*; in incipientibus convenit fots cum spongia *aqua calcis* ebria; *empl. de ranis cum mercurio*. Scrophulæ suppuratæ non sunt statim aperiendæ; sed quamdiu fieri potest, abscessus clausus linquendus est, propterea, ut eo major glandulæ strumosa pars per maturationem in pus abeat, nam tota, si fieri possit, est absumenda. Internè convenit *purgatio cum helleboro nigro & mercurio dulci*, & *acidum absorbentia*, &c. ossibus adhærentes ferè incurabiles sunt.

### Vvisemani sententia.

Definitio.

*Art. 1278.* Struma seu scrophula est tumor " durus, inæqualis, rarissimè dolorificus, reliquo corpori plerumque concolor, aliquando leviter rubescens aut livescens " a peculiari feri sanguinis aciditate ortus, quod ubicunque in glandulas, musculos, membranas, imò ipsa ossa incidit, coagulatur & indurefcit. Glandulæ sunt sedes hujus morbi fre.

bi frequentiores, præcipuè autem ac primariò glandulæ mesenterii, quæ nunquam intactæ sunt; si morbus alicubi in corpore vigeat. Cernitur frequentissimè in labiis, maximè superiori, illud incrassat, & fissura obsignat.

*Art. 1279.* “ Prognosis a magnitudine morbi Prognosis.  
 „ & reliquis ægroti constitutionis circumstantiis  
 „ plerumque desumitur; est morbus admodum  
 „ difficilis curatu, & ubi hæreditarius, insanabi-  
 „ lis, ut etiam in ætate grandioribus, vix post  
 „ annum quadragesimum curatur.

*Art. 1280.* Medicamenta interna sunt *cathartica*, *alterantia*, & *specificæ*, *millepedes*, *lac asinum*, *decoct. sarsæ*, “ *Pulv. ad strumas Batean.* Curatio.  
 „ *spongia calcinata*, *paronychia cum folio rutacæ*,  
 „ &c. Sudoris provocatio eodem modo ac mediis,  
 „ ut in *Lue venerea*, instituta hic plurimum facit,  
 „ immo vel sola strumas tollit, &c. “ Externè indicationes sunt *resolutio*, *suppuratio*, & *extirpatio*: Strumæ molliores aliquando resolvuntur; strumæ phlegmonoides frequenter suppurantur, sed antiquæ, duræ ac crudæ rard ad perfectam suppurationem perveniunt. Si struma sit mobilis & libera, extirpatio per *incisionem* est cura promptissima; sin verd strumæ sint grandiores & profundè jacentes extirpatio per *caustica* melius efficitur, inter caustica ad hoc institutum optimum est istud, quod conficitur ex *calce vivâ in lixivio saponis cocta*: Appetitione per causticum facta struma escharoticis est absumenda, huic usui inservire potest *pulvis sine pari dictus ex æquali parte mercurii sublimat. auripigment. & calcis viv.* mitior est mercurius præcipitatur, cum, vel sine *alumine ustô*, lentè tamen operatur.

*Art. 1281.* “ Præstantem hunc tractatum Au- Consulten-  
dus est au-  
tor.  
 „ thoris, chirurgus juvenis iterum atque iterum  
 „ diligenter evolvat.

*Farrago sententiarum.*

De viri-  
bus tussi-  
laginis.

Parony-  
chia, &c.

*Art. 1282.* Notarunt quidam medicamenta ad curandas scrophulas in ultima lunæ phasi majori cum successu assumi, & in novilunium usque continuari debere. Decoctum *folior. tussilaginis* internè sumptum per longum tempus ultra omnia, quæ hæcenus nota sunt, hunc morbum tollit, ut experimento fidelis D. *Francisci Fuller* mihi quondam amicissimi constat: videatur locus medicin. gymnastic. p. 93. Pro specifico etiam habetur *paronychia folio rutaceo in cerevisia infusa*. Infusum *rorismarini* instar theæ, item *rad. scrophulariæ* ab *Ettmullero* summè laudantur. "*Lamium* in lacte, coctum ipsum coagulat; serum intus sumptum, & coagulum ulceribus applicatum sine alio quo, cunque remedio morbum sanant; ut a quodam rustico accepi, qui & ipse & aliquis ejusdem vicinus, ambo deploratissimè strumosi, curati sunt. Extat historia strumarum deletarum applicatione manus hominis mortui in *Act. Philos.* Sequens emplastrum strumas resolvit, vel ad supurationem deducit, & nunquam fallit, ait *Zacutus cum juramento lib. 1. prax. admirand. observ. 101.* 24. *rad. brion. magn. in taleola; terr. sect. lbs. frige in sartagine quousque contabescat, cola & add. terebinth. abietis lbs. cer. 3v. f. unguentum s. a.*

Tumores  
albi.

*Art. 1283.* Sub strumarum nomine veniunt, aut venire possunt; articulorum *tumores albi dicti*, & revera plerumque sunt pessimi commatis, de his empirici, & tyrones nonnunquam graviter hallucinantur, illos cum *artuum luxationibus* confundentes, unde mille mala; quocirca cautela opus est.

Prognosis.

*Art. 1284.* Hi tumores discuti nequeunt, aut saltem rarissimè & quam difficillimè; si autem in abscessus vergant, pandoræ pyxides sæpius includunt,

dunt, ossium caries, ligamentorum putredines, ulcera fistulosa, & curatio denique non raro saltem imperfecta erit, articulis scilicet inflexibilibus relictis, & quod adhuc pejus, tandem aliquando *tabes universalis* induci solet.

*Art. 1285.* Curatio interna eadem est ac in aliis strumosis affectibus. *Suffusio frigida* hic multum prodest, speciatim a fide dignis mihi nunciatum fuit plures curatos fuisse artum aliquamdiu detinendo *sub flumine molari decidentis aque*, idem experimentum aliquoties repetendo. Atque hic attestantem habemus *Cheyneum* hoc remedii genus in isto affectu esse *infallibile*, vid. *Tractat. de Arthritide*, p. 87. Aptā deligatio parti affectæ tempestivè inducta fluxionem plerumque prohibet. Cunctatio periculosa est: abscessus enim hujusmodi summam chirurgi peritiam postulant, ut supra dictum est.

## SPINA VENTOSA.

### *Voisemani sententia.*

*Art. 1286.* Spina ventosa est scrophulæ quædam species, quæ est ossis protuberantia cutis colore non mutato; raro accidit, nisi in infantibus & junioribus: In ossibus minoribus, uti cranii, maxillæ, digitorum, &c. est curabilis; non verò in majoribus.

*Art. 1287.* Aperiendus est locus juxta protuberantiæ longitudinem ac os cariosum eodem modo tractandum est, ac in ulceribus cum ossibus cariosis postea dicetur.

*Art. 1288.* "Chirurgus curiosus consulat *D. Fre.*, ind, *Hist. Med.* Vol. II, p. 54. &c. de hujus affectus natura & indole a libris *Rhasis* & *Avicennæ*.



## C A N C E R ,

*Ettmulleri sententia.*

Cancer  
tumor sin-  
gularis.

*Art. 1289.* Cancer est tumor planè singularis , ac omnino sui generis. Punctio ab ægro primò percipitur ; a pili magnitudine successivè , modò citius modò tardius incrementum capit , & progressu temporis evadit tuberculum durum , nigricans , lividum ; quando exulceratus sit , ardor est acerbissimus instar aquæ fortis corrodens & depascens cum insigni putrilagine & fœtore ; venæ tumorem ambiunt hinc inde turgidæ & nigricantes , tanquam *pedes cancrini* ( unde nomen fortitur . ) Strumas & scirrhus malè tractatos frequentius subsequitur , in mammis verò per se inchoat , in genitalibus utriusque sexus interdum adoritur .

Noli me  
tangere &  
lupus.  
Cura pal-  
liativa.

In partibus faciei externis , ore , naso , labiis , &c. appellatur *noli me tangere* , item *lupus* ; revera sunt *cancrorum* species. Opera danda est progressum impedire , ne exulceretur cancer . “ Postquam enim cutis disrupta fuerit , certò certius hominem miserrimè interimit , carnem ubique avidissimè depascendo , fungos tanquam brassicas floridas ubertim protrudendo , per acrimoniam humoris causticam vasa nervosa & sanguifera destruendo & erodendo ; unde ichoris copiosa effusio cum vitæ ferè dispendio ; hæmmorrhagiæ frequentes & profusæ plerumque agmen claudunt , & mortem optatam accelerant . “ Cataplasma ex *cicuta* potenter mitigat cancrum ( sed cavendum est , ne cutem excoriet ) *fonticuli* sunt inurendi . Internè conveniunt purgantia ex *belleboro* & *mercurio dulci* , decoctum *lignorum* , *millepedes* , “ item *pulveres testacei* & *lac asininum* , &c. Cancer ulceratus vix aut ne vix quidem curatur . *Oleum stercoris humani* in ulceribus cancrosis est sum.

summum remedium; si enim oleo hoc illinitur, ulterior progressus præcavetur. Multum quoque faciunt medicamenta *saturnina*, acidum acre corrosivum mirè absorbentia & edulcorantia; sed cura radicalis in *arsenico* consistit ( si verbis fides habenda sit. )

*Hildani sententia.*

*Art. 1290.* Galenus cancri curandirationem duplicem statuit, quarum prima perficitur medicamentis humores atrabiles expurgantibus: altera consistit in extirpatione tumoris. Quantum attinet ad primam nisi statim ab initio administrata fuerit, parum aut nihil ad sanitatem posse, certum est; quandoquidem jam materia ita compacta atque indurata est, ut medicamentis purgantibus non cedat. Altera via a *Galeno* præscripta est extirpatio tumoris; hanc autem nonnulli *ferro candente*, alii medicamentis *erodentibus*, reliqui verò *cultro incisivo* perficiunt. Quantum ad *cauterium actuale*, illud cum *Albucafi* in *seirrhosis* & *cancrosis* humoribus atque ulceribus suspectum habeo, quandoquidem vi ignis, qui id summo gradu caloris & siccitatis agit, magis indurefcit materia atrabilaris fitque malignior. Porro extirpatio quæ fit medicamentis *escharoticis*, aut *septicis*, sive quovis simili medicamento erodente, mihi quoque propter nobilitatem partis affectæ, suspecta est. Adde experientiam docuisse *cancrosa* ulcera hujusmodi medicamentis exacerbari, atque pejora fieri. Superest extirpatio, quæ manu & instrumentis incidentibus fit, quæ præ aliis eligenda est, & tamen sua habet incommoda & difficultates,

Curatio  
per medi-  
camenta.

Cauterid

Escharoti-  
ca.

Instru-  
menta.

*Farrago sententiarum.*

Cancri  
occulti  
non me-  
dicandi.

*Art. 1291.* Quibus occulti cancri fiunt ( inquit *Hippocrates in Aphorif.* ) eos non curare melius ; curati enim citò pereunt ; non curati verò longius tempus perdurant ; i. e. ( si mentem senis rectè assequor ) remedia plus nocent , quàm profunt , & officiosa medicatio mortem accelerat .

Epithema.

*Art. 1292.* Certè , si quid aliud ; epithema *Vvisemani* cancro occulto cum fructu aliquo applicari potest , quod fit ex solutione *sacchari saturni in aq. spermat. ranarum* , cui urgente dolore graviori , addi possunt *trochisci alb. rhaf. cum opio* . “ Em- , plastrum si velis ; sit *de minio simpl. Pharm. Lond. edit. ult. in linteo extensum* , quod mississimum est ac innocuum .

Qualis can-  
cer extir-  
pandus .

*Art. 1293.* Cancer parvus , incipiens ; liber , loco apto situs , vasis magnis non adcretus , causa externa ortus , in juvenili sanoque corpore ; solus in toto corpore cum bona spe curationis extirpari potest :

Qualis non  
attingen-  
dus .

*Art. 1294.* Quibus sunt cancri in cavitate corporis , aut palato , sede , vel utero , si secentur , vel urantur , ulcera cicatrice induci non possunt .

*Art. 1295.* Inter remedia *Empirica* valdè prædicatur sequens pulvis , *℞. Verrucar. calcibus posterioribus equi masculi adherent. ℥ij.* abluantur aqua communi , deinde in vino albo per noctem infundantur , & postea exsiccentur & in pulverem reducantur , dos. *℥ss.* bis in die in vehiculo qualicunque idoneo . *Sapo veneta ad ℥j.* bis in die exhibita ; vel forma pilulari , vel in vehiculo appropriato dissoluta , cancerum operatione quadam occulta vel specifica sanare dicitur . *Vid. Turneri Art. Chirurg. pag. 83. Vol. I.*

Remediū  
empiricū .

*Art. 1296.* Opportunum est monitum *D. Vvinter* in hoc casu . Cancro laborantes ( inquit ) incipiant ,

piant, ubi plus sæpè finire solent, ad *diatam lacteam* & *aquas Bristolienſes*, tanquam ad ſacram anchoram, confugiendo, & medicamentorum farra- ginem; præcipuè *mercurialium* & *topicorum* vitan- do.

Art. 1297. Internè etiam exhibentur *antimo- nialia*, *mercurialia*, *viperina*, decoct. e *lign. mil- lepedes*; &c. *cereviſia ad càncrum*; *cereviſia ad ſcrophul.* Remedia varia.

## TUMORES FLATULENTI.

*Sennerti & aliorum ſententiæ.*

Art. 1298. Tumores flatulenti (quos Græci *em- phyſemata* vocant) a flatibus ſeu ſpiritu flatuſo oriuntur; materiam flatibus producendis præbet humor craſſus, pituitoſus vel melancholicus. Cogno- ſcuntur hi tumores, quod pars in molem nunc ma- jorem nunc minorem attollitur, ſine coloris muta- tione; ex diſtentione autem interdum dolor aliqua- lis excitatur, nulla tamen gravitas ſentitur, digito preſſi ſoveam nullam relinquunt, & ut plurimum periculo vacant; accidunt frequenter in palpebris, genubus; ſcroto, præputio; &c. Tumor flatulen- tus unde.

Art. 1299. Conveniunt internè ſtatus *diſcutien- tia*. Non temerè aperiendi ſunt hi tumores, præ- cipuè in articulis exiſtentes, in aliis locis punctura facillimè curantur. Applicationes externæ debent eſſe *diſcutientia*. “Emplaſtrum ſi velis; ſit *de cy- , mino cum exigua calce viva*. Plura emphyſema- , ta novi (*inquit Turner*) diſcuſſa applicatione cal- , cis vivæ latæ more cataplaſmatis, ut etiam lin- , teis aqua calcis forti imbutis. Cavendum eſt ut , accuratè diſtinguatur ab *aneuriſmatibus*. Vid. Art. 1155. Curatio.

Art. 1300. Tumores in ſuis propriis folliculis Tumores Capſula- res. incluſi non ſunt adeo difficiles tractatu ac ſtrumæ.

hujusmodi sunt ganglium, lupia, meliceris, atheroma, steatoma, bronchocele, &c. Observatum fuit, quod hi tumores capsulares subinde *Luna phases* imitantur.

Ganglium

*Art. 1301.* Ganglium est tumor in tendine corporis concolor, doloris periculique expers. Curatur frequenter sola *frictione* sicca diuturna, aliquando *frictione* cum *saliva* absque aliorum medicamentorum usu; quidam applicant *laminam plumbeam argento vivo inunctam*; " vel sequens em-  
 ,, plastrum tertio vel quarto quoque die renovar-  
 ,, dum, *℞. Empl. de ranis cum mercur. ℥ss. de*  
 ,, *cicuta cum ammoniac. ℥ij. argenti vivi gr. xvj.*  
 ,, *min. ℥j. cum styrac. liquid. q. s. m. f. emplast.*  
 ,, vel *℞. Mercur. dulc. ℥ij. Galban. colat. ℥j.*  
 ,, *misce pro emplast. his remediis non cedens se-*  
 ,, *ctiōne* tollendum est.

Lupia,

*Art. 1302.* Lupia est tumor mollis & rotundus in juncturis & locis siccis ortus; a Ganglio parum, situ saltem, & mollitie, discrepans; materia frequenter in folliculo continetur; eandem ferè cum Ganglio recipit curationem.

Meliceris.

*Art. 1303.* Meliceris, Atheroma, & Steatoma sunt tumores, qui materiam habent peculiarem in propria tunica aut folliculo clausam: Si enim materia intus contenta sit melli similis, *meliceris*; si pulti frumentaceæ, quæ *ἀθήνη* dicitur, *Atheroma*; si sebo, *Steatoma* appellatur. Omne hi tumores sunt corpori reliquo concolores, a parvulo incipiunt & diu ac paulatim excreseunt. Non sunt periculosi, diu tamen durant, & circumferuntur; interdum verò sponte in abscessum desinunt, quod si non fiat non tam difficulter ut *scrophula* ac *scirrhi* curantur.

Atheroma  
Steatoma.

Curatio.

*Art. 1304.* Curatio eorum omnium eadem ferè est, eandemque requirunt dietam ac pharmaciam cum *œdematosis*: " ut plurimum sunt adeo benigni,  
 ,, ut internis vix indigeant. " Si sponte non aper-  
 rian-



## CAP. XII. Tumores Capsulares.

453

riantur *sectio* instituenda est; ita ut cystis cum suis contentis penitus tollatur; si enim aliquid de tunica illa relinquatur, tumor regenerabitur. " Vel  
 „ ulcus fistulosum fœdissimum difficilis & tardæ  
 „ curationis relinquetur, ideoque quod *cultro* ne-  
 „ quit auferri *cauteriis* absumendum est, ne iterum  
 „ repullulent.

Art. 1305. Talpa seu Testudo est tumor mol- Talpa (sed  
Testudo.  
 lis & latus, ex impuris humoribus inter cranium  
 & cutem putrescentibus collectus, *talpa* aut *te-*  
*studinis* formam referens.

Art. 1306. Hujusmodi apostemata, ut & alii Prognosis.  
 capitis erodentes affectus, propter cerebri viciniam  
 & suturarum cranii proclivem in cariem lapsum  
 periculo non vacant, quæ corruptionem cranii jam  
 induxerunt, mala sunt.

Art. 1307. Quoad curam, præmissis universalibus, Curatio.  
 tumor *resolventibus* & *discutientibus* tentan-  
 dus est, si discutientibus tolli non possit ( quod  
 raro fit ) *suppurantia* adhibenda sunt, & quidem  
 neque semper perfecta suppuratione expectanda est,  
 sed si aliqua saltem suppurationis signa adsint,  
 tumor maturè aperiendus est, ne os *cariem* con-  
 trahat.

Art. 1308. Tumor, quem Natam, Nattam, & Natta.  
 Naptam appellant, est magnus & mollis sine dolo-  
 re, & colore, in dorso præcipuè excreescens,  
 quandoque tamen in humero & alijs partibus e-  
 rumpens, a tenui quidem radice pendens, ita ta-  
 men incrementum sumens, ut aliquot libras pen-  
 dat, & melonis vel cucurbitæ quantitatem æquet;  
 qui cum non semper easdem figuras habeat, ideo  
 etiam diversis nominibus ab authoribus appella-  
 tur. Materia quidem in eo interdum videtur car-  
 nosa, sed non verè caro est, verum adipi similis.  
 Non curatur nisi *exsectione*. " In Transactionibus  
 „ Philosophicis N. extat historia *ingentis Nat-*  
 „ *te* maxillæ inferiori adnascentis, viginti pondus

„ pendentis, cujus basis fuit quinque digitos lata ;  
 „ abscissa erat & homo perfectè sanatus.

## H E R N I A .

### *Etmulleri sententia.*

*Art.* 1309. Herniæ veræ sunt tantùm duæ ,  
Herniæ  
quot. nempe intestinorum vel omenti extra abdomen e-  
 lapsus, horum posterior non est adeo molestus ne-  
 que periculosus, ac prior. Nomen verò latè sum-  
 ptum plures alios tumores comprehendit, ut in  
 sequentibus patebit.

*Art.* 1310. Hernia itaque propriè dicta in ge-  
Hernia  
in genere  
definitio. nere est prolapsus intestinorum tenuium aut omen-  
 ti ex limitibus suis a vulnere aut laxatione peri-  
 tonæi. Aliquando est hæreditarius, ita ut hernio-  
 si parentes herniosos generent filios, sed rariùs  
 ( novi talem progeniem. ) Hernia in adultis ut  
Quibus in  
locis acci-  
dit. plurimum est incurabilis. Ex Hernia frequenter  
 morbus *Iliacus* producitur, interdum intestina in-  
 flammantur, & gangræna corripuntur. Herniæ  
 ordinariò & frequenter fiunt in inguine, scroto  
 aut umbilico; aliquando verò in aliis locis, nunc  
 supra nunc infra umbilicum, nunc in lateribus  
 longè supra inguina, nunc in superiori femoris  
 parte musculosa, nunc juxta spinam dorsì, &c.  
 ex observatione *Barbette*. “ Valdè curiosa est ob-  
 „ servatio *M. Mery de Hernia vesicæ scilicet u-*  
 „ *rinariæ in scrotum prolapsæ*, aut saltem ibidem  
 „ munere suo fungentis: existimat enim hoc vi-  
 „ tium malæ conformationi ortum suum semper  
 „ debere. *Memoir. de l' Acad. Vol. XVII. p. 146. &c.*

*Art.* 1311. Intestina sæcibus cum *enemate* carmi-  
Curatio. nante & emolliente priùs exonerata, in loca sua  
 cum cautela sunt reponenda, mediante *fortu* ex e-  
 mollientibus & carminativis cum *spiritu vini*, &c.  
 & ita reposita in naturali omni arte & debitis su-  
 bliga-

bligaculis retinenda sunt, ne denuò excidant, addè ut peritonæum ruptum aut laxatum consolidetur. Internè conveniunt *vulneraria*, speciatim commendatur *persoliata*, item *symphytum majus*; continuus in dorso decubitus est Herniarum *panacea*, etiam in senibus. "Quicumque *Hernia*, debilitatur summopere debet cavere (ut prudenter admonet *D. Harris in Dissert. Med. & Chirurg.*) a ventriculo cibus incongruis implendo, spiritibusque furibundis nimis perturbando, & a colicis doloribus spasmisque excitandis, atque a tussi importuna contrahenda, quoniam istæ corporis concussiones ac tumultus solent hernias horridè amplificare.

*Art. 1312.* "Herniæ intestinales reductionem respuentes periculum subitaneum minantur. Herniæ reductionem respuentes. Symptomata quasi *Passionis Iliacæ* superveniunt, dolores gravissimi, vomitus enormes, singultus, & demum pulsus languidus, & sudores frigidi, diagnosi indubitata instantis gangrænæ, & mortis appropinquantis. Audentes interdum *sectionem* moliuntur cum successu tamen valdè ancipiti; nam res est perquam difficilis, & periculi plena, nec temerè tentanda; & hac præcipuè de causa, quoniam, serè semper, non nisi serò nimis operatio suscipitur.

*Art. 1313.* Pneumatocele seu Hernia ventosa, Pneumatocele. est tumor membranarum testium a flatibus ortus, estque saltem inflatio testium, nunc unius, nunc utriusque, nunc scroti quoque adest dolor tensivus sine gravitate.

*Art. 1314.* "Infantes ex eorum temperiei humilitate & fibrarum laxitate huic affectui sunt Herniæ temporariae. valdè obnoxii, & a flatibus intra eorum intestina occlusis sæpenumero adoritur *extemporanea quædam Hernia inguinalis*, & quandoque etiam *testiculorum*, quæ statim facta flatuqum explosione subsidit.

Curatio.

*Art. 1315.* Hæc Hernia flatulenta est omnium levissima, & curatu facillima: conveniunt internè flatus *discutientia* & remedia ad *colicam flatulentam*; externè *fotus discutientes*, *cataplasma ex farina fabarum*, *sem. cymin.* *fimo vaccin.* *sulph. viv.* &c.

Hydrocele.

*Art. 1316.* Hydrocele sive Hernia aquosa est tumor aquosus testium a lymphæ recessu testibus impedito; est hydrops testium particularis, & a tumore scroti, qui in ascite accidit, distinguitur; similis est Herniæ carnosæ, sed in aquosa induci potest fovea, quod non fit in carnosa; præterea pelluciditate se prodit.

Curatio.

*Art. 1317.* Tentanda est cura internè cum *hydragogis* & *diureticis*, externè *discutientibus*; hic quoque valet cataplasma, in sectione de Hernia ventosa, descriptum (1315.) cum additione *bal-sam. sulphuris*. De operatione chirurgica vide locum. p. 991.

Sarcocoele.

*Art. 1318.* Sarcocoele seu hernia carnosa est tumor a carne superflua adnascente; ex contusione vel ictu plerumque oritur, & ex insensibili principio sensim augetur, secus ac in aliis testium tumoribus; est ferè indolens, sed ægri pondus percipiunt. "Est revera *sarcoma* vel potius tumor, *scirrhus*; & metus est, ne temporis progressu in *cancrum* abeat: ideoque *castratio tempestiva* imperanda est, de qua consulantur scriptores chirurgici. Caro superflua quandoque *tunicarum scroti communium secunda* adnascitur, & non *testiculis*, quo in casu sine horum læsione tolli potest.

Prognosis.

*Art. 1319.* "Sarcocoele (inquit *Barbette*) medicamentorum ope vix tollitur; chirurgiæ verò opera rarè sine ablatione testiculi; ad inguina, ubi se extenderit ferè incurabilis habetur. "Internè conveniunt medicamenta ad *strumas*."

Curatio.

„ ciatim a scriptoribus ferè omnibus commenda-  
„ tur

„ tur *radix anonidis* intus sumpta per longum  
 „ tempus. “ Externè *resolventia* & *discutientia*,  
*emplastrum de cicuta cum ammoniaco*, de *ranis*  
*cum mercurio*, sed ex hoc vis testis periclitabi-  
 „ tur. “ His nihil proficientibus ad auxilium chi-  
 „ rurgicum deveniendum est. Fiat itaque fora-  
 „ men cauterio potenciali adhibito *in superiori*  
 „ *tumoris parte*, & suppurantia medicamenta ap-  
 „ plicentur, ut hoc modo, si possibile sit, caro  
 „ ea tolli possit: quavis tamen visitatione omne  
 „ pus non est emittendum ut tanto melius carnis  
 „ reliquæ consumi possint. Superest *castratio*,  
 „ ut ante dictum sit. De Hernia varicosa, vide  
 „ sect. de Varice. ( 1270. )

Hernia  
varicosa.

Art. 1320. “ Bronchocele, sive hernia guttura-  
 „ lis improprie dicta, est tumor prominens in  
 „ gutture, amplo spatio protuberans, corpori con-  
 „ color, utcunque mollis & mobilis, & doloris  
 „ expers; modò caro hebes includitur, modo hu-  
 „ mor aliquis melli aquæve similis, interdum et-  
 „ iam minutis ossibus pili immixti; ut plurimum  
 „ periculo vacat; quandoque verò materia putre-  
 „ scens malignam induit naturam, unde in can-  
 „ crum degenerans mortem inferre solet. *Alpino-*  
 „ *rum montium incolis* est morbus *endemicus*.

Broncho-  
cele qua-  
lis est tu-  
mor.

Prognosis.

Art. 1321. “ Præmissis universalibus, humor  
 „ peccans discutiendus & absumendus est. Inter  
 „ *topica* laudat *Aetius bdellium* & *caprinum stercus*  
 „ in aceto liquatum. Si medicamentis non ce-  
 „ dat, ex *Rogerii* consilio admovendi sunt duo  
 „ *setonei*, ut sensim humor defluat: & superfluum  
 „ postea erodentibus paulatim est absumendum.  
 „ Denique si venis, arteriis & nervis implicata  
 „ non fuerit, *incisione* potest extrahi cum cysti;  
 „ hanc operationem *Galli* foeliciter moliantur.  
 „ De hoc tumore consulatur *Turner Art. Chi-*  
 „ *rurg. p. 178. &c. Vol. I. Item in Appendice p.*  
 „ *21. &c.* Etiam si sit tumor in cysta inclusus, ta-

Curatio.

men



„ men extirpatu difficillimi eventus ex structura  
 „ loci. “ Qui hanc operationem aggreditur , *Lupum auribus tenet.*

## ANIPROCIDENTIA.

*Etmulleri sententia.*

Ani pro-  
 cidencia.

*Art. 1322.* Ani procidencia fit , quando sub fæ-  
 cum excretionem intestinum rectum ita prominet  
 & protruditur , ut non possit rursus sponte re-  
 trahi intra corpus , aut licet retrahatur , mox in-  
 cipiat denuð prolabi . Est interdum malum chro-  
 nicum ( præcipuè quando a paralyi ortum ducit )  
 & difficulter curatur . Ani procidenciae causæ sunt  
 alvi adstrictio , diarrhœa , dysenteria , vel præci-  
 puè tenesmus ; difficillima est curatu , quando hæ-  
 morrhoides comitem habet .

Causa.

Curatio.

*Art. 1323.* Si adsit inflammatio prius arcenda  
 est cum fomentis *mollientibus* & *discutientibus* , &  
 remotis impedimentis reponendus anus in situ na-  
 turali . “ Alvum leniter laxantia pro re nata sunt  
 „ quandoque propinanda : “ Aliàs absente inflam-  
 matione aut tumore soveatur *astringentibus* , quæ  
 etiam sub forma *suffitus* usurpari possunt : *Paræus*  
 „ spongiam *astringentibus* imbutam ano applicat .  
 „ Stans alvum exoneret æger , sic enim non tam fa-  
 „ cile excidit . Inter *astringentia* mihi nondum  
 „ innotescit remedium efficacius quàm *fotus pro*  
 „ *hernia varicosa* . ( 1271 . ) “ Tenesmus frequen-  
 „ ter affligit , in tali casu remedia ad tenesmum  
 „ adhibenda sunt .

Reductio.

*Art. 1324.* “ Intestinum rectum foras prolapsum  
 „ a frigore externo periclitatur , ne gangrænes-  
 „ cat , quapropter citissimè reducendum est . Re-  
 „ ductio quandoque perfici potest *artificio sequen-*  
 „ *te* , aliis mediis incassum tentatis , viz. nates pa-  
 „ tientis extensa manu quinquies , sexies aut plu-  
 rics

CAP. XII. *Verruca & Clavi.* 459  
 „ ries verberando, quo musculi ani levatores  
 „ intestinum rectum in priorem sedem attol-  
 „ lent.

## VERRUCÆ & CLAVI.

*Ettmulleri sententia.*

*Art. 1325.* “ Quales tumores vel potius excre-  
 „ scentia sunt verrucæ & clavi nemo non novit. Verrucæ  
& clavi.  
 Verrucæ sunt vel planæ seu sessiles, vel pensiles,  
 acrochordones appellatæ.

*Art. 1326.* Si verrucæ in sola cute sint radicatæ  
 facilè curantur vel tolluntur, sin verò a subjec-  
 tendinibus originem ducant, vix radicatus extirpa-  
 ri possunt citrà ingens periculum; idem etiam de  
 clavis pedum verum est. Succus *chelidon. maj.*  
*vel esule*, vel *dentis leonis*, vel *tithymali*, &c. sæ-  
 pius illitus verrucas absumit. *Aqua*, in qua solu-  
 tum est *sal armoniacum* est experimentum *Boreli*  
 “ Atque hoc est medicamentum unicum certis-  
 „ simum quod se cognoscere in tota medicina fas-  
 „ sus est *D. Mapletost* haud pridem *Professor*  
 „ *Grashamensis*: hoc quidem remedium est ut plu-  
 „ rimùm maximè efficax, sed non certissimum &  
 „ infallibile, neque tamen ars nostra omnium no-  
 „ bilissima, est aded incerta, sicut vir doctis-  
 „ simus suggererit.

*Art. 1327.* “ *Clavus* ( inquit *Celsus* ) nonnun-  
 „ quam quidem etiam alibi, sed in pedibus tamen  
 „ maximè nascitur, præcipuè autem ex contuso,  
 „ quamvis interdum aliter, doloremque movet,  
 „ Clavi a *Plinio Morticini* appellantur. “ Ad cu-  
 ram quod attinet, *emolliendi* sunt cum *emplastro*  
*mynsicht. e galbano crocat. cum sale ammoniaco*, &  
 postea *evellendi* sunt; eidem usui inservire potest  
*emplast. de ranis cum mercurio*. Item recipiatur *ca-*  
*ro bubula recens*, cujus frustulum instar empla-  
 stri

stri iis alligetur, & sæpius removeatur; sic enim citò sponte dilabi dicuntur.

Cornua.

Art. 1328. De cornibus non lubet differere, quoniam pauciora sunt visibilia.



## C A P U T XIII.

*Sive Fasciculus Morborum decimus tertius.*

### CONTUSIO, &c.

*Ex observatione & inter legendum.*

Contusio.

Art. 1329. **C**orpora nostra vel a casu ab

alto, vel ictu violento, vel compressione ponderis incumbentis, &c. sæpissime læduntur; partes carnosæ contunduntur, & ipsa ossa luxantur & quandoque franguntur. Ex prædictis causis accidit plerumque *ecchymosis* cum vel sine tumore, quæ revera est accumulatio vultusculorum cum attritu solidorum & vasculorum, unde liquida stagnant, coeunt, & interdum putrescunt, cohærentibus quandoque integumentis externis, vel iis etiam interdum hinc inde laxis.

Ecchymosis.

*Etmulleri sententia.*

Curtatio.

Art. 1330. In ecchymosi curanda imprimis opera danda est, ut sanguis extravasatus, congruatus, & acore inquinatus, successivè resolvatur, insensibiliter absumatur, & per meatus seu porulos corporis eliminetur. Conveniunt remedia interna *acidum absorbentia*, sanguinem congruatum *resolventia*, simul & blandè *diaphoretica*, eminet *sperma ceti* cum *lapillis cancrorum*, *succin.*

*cin. preparat. coral. rub. &c. Antimonium diaphoreticum, & salia volatilia sunt egregia. Externè imprimis resolventia, & sanguinem grumatum insensibiliter dissipantia sunt usurpanda, huc facit spiritus vini nunc simplex, nunc camphoratus, nunc crocatus, cum linteis applicatus, efficacius erit si addatur theriaca, & etiam balsam. peruv. maximè in contusionibus partium nervosarum. In contusionibus levioribus applicatio carnis bubulae in tenues lamellas sectæ optimè conducit. Quod si his & similibus remediis ecchymosis nequeat dissipari, opera danda est, ut sanguis extravasatus in pus convertatur; si verò metus sit gangrænæ, mox pars contusa profundè scarificetur, & sanguis congrumatus, quantum fieri potest, eximatur, & tanquam gangræna tractetur, de qua alibi (1384.) in omni contusione graviore convenit venæsectio,*

Cavatur  
a gangræna.

### Farrago sententiarum.

*Art. 1331. Quidam adolescens ex alto ceciderat; & omnia membra admodum contusa fuerant, ut brevi moriturus videretur. Pater ipsius accepit favos cum mele & coxit in vino ad consistentiam unguenti, quod extendit super corium vervecis recentè mactati, eoque ægrum involvit, reiterata per triduum operatione, æger omnino curatus est, ex Riverio.*

Remedia  
singulare.

*Art. 1332. 24. Fol. solani lignosi sive dulcamar. Miv. sem. lini subtiliter pulverisat. ʒiv. coq. in vin. moscatellin. cretic. aut larido porcin. ad consistentiam cataplasmati, quod loco contuso tepidè admoveatur: unius noctis spatio tumorem capitis humani magnitudine resolvit & contusiones deploratas musculorum sanavit (inquit D. Hulse apud Raium) vires quoque ejusdem plantæ pro usu interno sunt egregiæ; est enim basis*

Vires dulc.  
in camaro.

infusa

*infusi traumatici* apud *Fullerum*; addit author singulare esse experimentum ad casum ab alto & contusionem: cruorem quippe extravasatum & grumescentem mirificè dissolvit, &c.

In simpli-  
ci contu-  
sione.

*Art. 1333.* In simplici contusione sufficiunt embrocationes cum *ol. rosar. myrtil. & aceto*, & applicatio cataplasmatum sequentis vel huiusmodi *℞. Far. bord. fabar. ana ℥iij. pulv. nuc. cupress. balaust. alum. rup. ana ℥ss. ros. rub. ℥iij. ol. ros. ℥ss. alb. ov. N. iij. acet. q. s. m. f. cataplasma*; *Ex Vviseman.*

Remedia  
varia.

*Art. 1334.* Præter remedia modò recensita interdum in usum venire possunt sequentia; *Bolus ad casum, pulvis ad casum, oleum sem. lini intus sumptum; emplastrum smecticum*, &c.

### *Ettmulleri sententia.*

Contusio  
capitis.

*Art. 1335.* Gravior contusio capitis interdum cranium findit; vel in loco contuso, vel loco opposito [ & vocatur *contrafissura* ]; nunc penetrat utramque laminam, nunc externam illaesa interna, nunc e contra. Signa fissuræ sunt multiplicia, ut vomitus biliosi, vertigo, sanguinis per os, nares, &c. effluxus; subitanea obtutescentia, & brevi superveniens delirium, convulsio, paraly-  
sis: symptomata hæc superveniunt nunc mox in principio, ubi gravior fuerit læsio, nunc quarto vel septimo die, ubi levior. Si æger firmiter teneat funiculum inter maxillas & chirurgus fortiter trahat, si habeat fissuram, in loco fisso dolorem percipiet. Necesse est ut plurimum, ut perforetur cranium, ut sanguini & saniei pateat exitus. Observandum est; quod vulnera simplicia capitis interdum post quartum vel septimum diem contrahant dolores, hinc rigorem & febrem; hæc si superveniant, & alia adsint symptomata, suspicio est fissi vel fracti cranii, sin verò non adsint alia symptomata, non statim ad *trepanationem* acceden-

Signa fis-  
suræ cra-  
nii.



cedendum est; febris enim ex aliis causis oriri potest. " In contusionibus cranii & læsionibus meningum septimo vel undecimo die gravis supervenit *ophthalmia*: & est signum mortis imminuentis, *Baglivi*.

*Boerhaavii sententia.*

*Art. 1336.* In capitis contusionibus; & inde ex collecta materie, interdum creantur varii tumores, erysipelas; œdema, dolores, convulsiones, ossis & periosteï putredines, febres; mors. —

Capitis  
contusio-  
nis effe-  
ctus.

Cranium in junioribus intro-pressum, vel in adultioribus post fracturam intro-pulsam, cerebrum premit; pro varietate loci pressi, pro varia magnitudine; profunditate, acutie, punctura prementis; producit hebetudines, sopores, vertigines, tinnitus, caligines, deliria, vomitum bilis, dolores capitis, convulsiones, paralyses, lotii sæcumque spontaneum exitum, apoplexias, febres; mortem. Concussus validus capitis interdum eadem facit rumpendo; comprimendo &c. " In his, affectibus religiosè consulatur laudatus author in *cap. de capitis vulneribus*, qui ( si quid ego, judicando valeo ) omnium scriptorum est facile princeps. In contusionibus gravioribus semper recordandus est *aphorism. Hippocratis*, nempe omne quod contusum, necesse est, ut putrescat, & in pus vertatur. "

Concussio  
vehemens

*Etmulleri sententia.*

*Art. 1337.* Luxari dicuntur ossa, quando eorum capita ex situ naturali removentur, hæc autem luxatio fit a vi externa ut plurimum, quandoque verò oritur a causa interna; namque hoc malum iis, qui scorbutò laborant, aut qui affe-

Luxatio  
Ossium.

ctibus

Etibus catarrhalibus sunt obnoxii, nonnunquam accidit; in his enim funiculi nervei laxantur & resolvuntur, & ferè insensiles fiunt, unde *paralyti scorbutica* subindè supervenire solet.

Duplex.

Art. 1338. Duplex est luxatio nempe *perfecta*, quando os a sede sua omninò amoveatur, vel *imperfecta*, quando non totaliter a sinu suo extrusum sit os, sed hæreat adhuc in sui receptaculi margine.

Prognosis.

Art. 1339. Præ cæteris omnibus os femoris difficillimè luxatur, istius etiam luxatio est omnium curatu difficillima; in adultis rarè aut nunquam restituitur sine miserrima in perpetuum claudicatione; ratio est, quoniam ligamentum fortissimum, quo in receptaculo suo illigatum est, vel ruptum sit, vel insignitè relaxatum. “ Valde  
„ probabile est [ *observante D. Cheselden ex duabus dissectionibus Anat. pag. 33.* ] quod os femo-  
„ ris nunquam vel rarissimè luxetur, & quod fra-  
„ ctura *cervicis istius ossis* pro luxatione frequen-  
„ tius accipiat, unde femur decurtatur, &c.  
„ Impossibile enim est [ *ut cum illo dicam* ]  
„ quod caput ossis inter musculos firmum ac sta-  
„ bilem locum inveniat ambulationis munere  
„ obeundo, tanquam in acetabulo. Luxatio in  
„ talo seu pedio est omnium periculosissima, ubi  
„ sunt os tali, calcanei, tria ossa innominata, os  
„ cubiculare, &c. ibidem quoque copiosissimi sunt  
„ tendines, unde dolor atrocissimus, inflammatio,  
„ quandoque etiam convulsio. “ Os humeri (*ex observatione Barhettiana*) rarè luxatur, & et-  
„ iam ita rarè reducitur, quin aliquantulum pro-  
„ tuberet, quam ob causam patiens sæpenuerò  
„ manum ad caput porrigere nequeat. Dorsi ver-  
„ tebrarum ad interiora luxatio malum lethale  
„ censetur; idem de costis ad interiora luxatis  
„ plerumque dicendum est.

Curatio.

Art. 1340. Quoad curam luxationis; os luxatum,

tum, membro extenso, maturè reponendum est, quo facto, nil aliud incumbit chirurgo, nisi ut commodis ligaturis os firmet, aptèque colloceat, ac inflammationem facilè superventuram, & alios affectus maturè arceat. Fasciationes non debent esse nimis *strictæ*, nè compressis vel coarctatis vas-  
 is oriantur tumores; neque tamen nimis *laxæ*, nè pars semel restituta denud ex loco elabatur. Si <sup>Inflamma-  
tio.</sup> adsit inflammatio, antequam membrum repositum sit, nihil priùs tentandum est, quàm inflamma-  
 tio discussa fuerit; quamdiu durat, tamdiu pars inepta est extensioni, sin verò violentiùs luxatio inflammata extendatur, supervenit ex nimio dolo-  
 re convulsio interdum lethalis. Ut ergo inflam-  
 matio imminens præcaveatur, vel præsens discu-  
 tiatur, conducit forus sequens, *℞. Summit. hyperic. Misß. beton. chamamel. rorismarin. ana Mj. rad. consolid. maj. ℥iij. aristoloch. rotund. ℥vj. sem. quatuor calid. maj. ana ℥ß. coq. in aq. font. & vin. ana q. s. ad ℥ij.* sit pro lotu, & in eodem humecten-  
 tur fasciæ repidè circumvolvendæ: ubi major ad-  
 fuerit contusio, augeatur quantitas *rad. consolid.* ubi levior *Aristolochiæ*; ubi urgent dolores *capita papaveris* possunt addi. Supervenit quandoque tu-  
 mor <sup>Oedema:</sup> *œdematosus*; in quo casu illinantur partes af-  
 fectæ cum *oleo volatili* penetrante, convenit etiam *petroleum*, item *balsam. peruvianum* cum *spiritu juniperi* temperatum. In luxationibus prodest inun-  
 ctio cum *oleo hyperici* & *ol. terebinth.* Ol. distilla-  
 tum foetidum *tartari* est horrendum ratione odo-  
 ris, sed tamen nihilominus est nobile admodum  
 ratione efficacix; conveniunt ex *lumbricis* parata  
 pro usu externo & interno. Experientia didici-  
 ovum cum *oleo terebinthine* & *pauco aceto con-*  
*quassatum* in luxationibus esse remedium utilissi-  
 mum, omnibusque intentionibus satisfaciens. *Bel-*  
*losse.* Convenit etiam illud *Boyleanum* nempe *sur-*  
*fur tritici in aceto coctum.*

Fracturæ  
Ossium.

Art. 1341. In fracturis ossium, vel frangitur os secundum *latitudinem*, hoc est transversim; vel secundum *longitudinem* finditur, quod propriè dicitur *fissura*. Fracturæ in senibus frequentius occurrunt, quàm in junioribus, quoniam illorum ossa sunt aridiora.

Longitudinales.

Art. 1342. Fracturæ ossium longitudinales, i. e. *fissuræ* difficilè cognoscuntur, sed facillimè curantur: neglectæ aut non ritè curatæ ulcus post se trahunt, imprimis si in loco fisso ossis caries superveniat, admodum periculosæ sunt, & sæpius ad membri abscissionem deducunt.

Transversales.

Art. 1343. Fracturæ *transversales* sunt cognitu faciliores, curatu difficiliores. Os fractum in medio sui dat fracturam leviolem, quàm circa articulum. Fractura cum vulnere & multa partium contusione & læsione est gravius malum & perquam periculosum, ut etiam quando os in plura frustula frangatur. In adultis femur fractum rarissimè aut vix unquam sine claudicatione restituitur. Minora ossa fracta intra 7. vel 14. diem ferè sanantur; ossa majora intra 20. ad 40. præter propter curationem recipiunt.

Curatio.

Art. 1344. In cura fracturarum duo scopi chirurgi incumbunt, nimirum ossa fracta facta extensione in situm naturalem reponere, & reposita per fascias & ferulas firmare; tunc enim natura eadem denuò firmiter conglutinat, & formatur *callus*, qui substantia quidem similis est ossi, conformatione verò sola ab eodem differt. Si adsit inflammatio, curanda est, antequam aliquid circa fracturam tentandum est, qua curata, atque osse reposito illinatur locus fracturæ cum *ol. hyperic.* vel *ol. lumbric. terrest.* cum guttis aliquot *ol. terebinth.* & applicetur *emplast. ex tasamahac.* cum pauco *ol. distillat. rorismar.* malaxatum, applicato emplastro imponantur ferulæ tres aut quatuor ad summum, quæ postmodum conjungantur per tria

liga-

ligamenta; Ligationes autem debent esse moderatæ; nam si sint *arctæ* nimis partem suffocant, & gangrænâ inferunt. Experientia constat præcæteris quibuscunque *lapidem osteocollæ* a ℥ss. ad ℥j. intus sumptum esse remedium singularissimum in callis ossium fractorum generandis, & augmentandis, utrunque obscurissimum sit, quomodo operatur. Hactenus de fracturis simplicibus; quædam cum vulnere complicatæ sunt, post repositionem ergo ossis vulnus considerandum venit; quod, ut alia vulnera, de quibus postea, tractandum est; emplastrum fracturæ applicandum perforatum esse debet in loco vulneris, ut ita beneficio foraminis vulnus commodè tractari possit. Si os iterum frangatur, non frangitur in callo, sed circa callum.

Vires ossis  
osteocellæ.

Fracturæ  
complicatæ.

## V U L N E R A.

*Boerhaavii sententia.*

*Art. 1345.* Vulnus est soluta unio recens; cruenta, partis mollis a corpore duro & acuto facta. Partes vulneratæ sensim magis magisque a se mutuo recedunt; et utrorque plerumque primo cum impetu effluit, dein sensim sponte sistitur; tum crusta sanguinea cavo vulneris innascitur, & liquor dilutus, rubellus, tenuis effluit; labia vulneris incipiunt rubere, calere, dolere, tumere, retorqueri; atque eodem tempore febricula cum calore & siri adest; (in magnis vulneribus) hinc tertio, quartove die serius vel ocylus vulnere adest liquor tenax, albus, pinguis, æqualis, pus; eodem tempore rubor, calor, dolor, tumor, retractorio labiorum, febricula, cessant, vel minuuntur; & sensim cavum vulneris a fundo sursum, & ab ambitu versus centrum, crescente carne im-

Vulneres  
in genera  
historia.



pletur, coeunte margine albo; postremò siccatur vulnus, & obducitur cicatrice.

Vulnera  
arteria-  
rum.

Art. 1346. Ex arteria majori tota dissecta oritur hæmorrhagia lethalis; arteria vero non nimis magna transversim dissecta, retrosiliens, atque inter solidà vicina se recondens, sibimet obturaculo est; sin vero arteria transversim vulnerata non totaliter dissecta fuerit, oritur hæmorrhagia perpetua, ea autem sedata a tenuitate cicatricis cedente aneurisma.

Hæmor-  
rhagiæ.

Art. 1347. " Ad hæmorrhagias vulnerum sistendas, præter vasorum ligaturas & fibularum li-  
nariarum applicationes, *styptica* quamplurima  
in consuetudinem veniunt; usitatiores sunt, quæ  
sequuntur; *Pulvis Galenicus*, *alum. ust. colcothar.*  
*vitrioli*, *muscus Indicæ*, *styptic. regis*, *oleum te-*  
*rebinth. tinctura antiphthisica Ettmulleri*, *vel*  
*potius Michaelis* (vid. *Ettmuller. Vol. I. p. 476.*)  
præstantissimum quidem remedium, *Helvetii*  
*stypticum*, viz. *tinct. chalybis cum tartaro prepa-*  
*rati spir. vin. extract.* atque hoc est ultimum re-  
medium eorum, quæ sunt melioris notæ; nisi  
quis *nova lumina* consecrari velit, *ignes fatuos*.  
Non deerunt Thralones ac fumi venditores,  
quamdiu mundum adeo credulum invenire pos-  
sint. Proh dolor! nunquid sermo hic de vulga-  
ri tantum opinione movetur? Utinam ne di-  
cam hujusmodi impostores *fautores habere Equi-*  
*tes Auratos*, *Camerarios*, &c. Sed regerent *tor-*  
*quem epilepticum* tempore *Oribasii* in usu fuis-  
se; ita quidem majores nostri, omni ævo, &  
*Hippocrates* ipse imprudentissimis agyrtis mun-  
dum infestari conquesti sunt. *Exiguum opii fru-*  
*stulum* in foramen arteriæ sanguinem fundentis  
intrusum *hæmorrhagiam* extemplo sistere dicitur  
*N. B.* *Stypticum* Doct. Eatoni idem esse vel sal-  
tem non multum diversum a *styptico Helvetii*  
apud exteros aliquamdiu obsoleto & nunc de-  
,, mun

„mum tanta cum ostentatione redivivo; in am-  
 „bobus vim maximam a spiritu vini oriri eos-  
 „demque effectus ipsum spiritum vini solum præ-  
 „stare luculenter demonstravit D. Sprengellius.  
 „Transact. Philosoph. N. 383.

Art. 1348. Nervi toti disiecti retrosiliunt, se re-  
 condunt, ramulos vulnere paulò superiores tra-  
 hunt, & vicinis dolorem obstructionemque creant,  
 parti verò infra vulnus positæ stuporem, immobili-  
 tatem, marcoremque. Nervi puncti, vel dimidia-  
 to discissi dolores, aliquando primò obtusos, non-  
 nunquam vivos excitant, primo in loco vulneris,  
 post per omnes nervos nexos, vicinosque; hinc ca-  
 lores; tumores, rubores late sparsos, febres, deli-  
 ria, spasmos, inflammationem, inflammati aper-  
 turam cum evacuatione acris, tenuis, & copiosissi-  
 mi sæpè feri, postea insensibilitatem, rigiditatem,  
 exsiccationem, immobilitatem producunt, vel gan-  
 grænam & mortem. Eadem ferè parum mutata  
 etiam in tendinibus diversimodè læsis obinent; &  
 membranæ, tendinum nervorumque sæpè produ-  
 ctæ quum sint, similiter quoque afficiuntur.

Nervo-  
rum vul-  
nera.

Tendino-  
rum ac-  
meidia-  
narum.

Art. 1349. „Tendines magni recens abscissi vel  
 „rupti sutura resarciri possunt, extremitates ita  
 „conjungendo, ut glutine naturali vel callo quo-  
 „dammodo uniantur, & usus artuum conserve-  
 „tur. Chirurghi Gallici frequenter & etiam aliqui  
 „ex nostratibus hoc præstant cum fausto eventu.  
 „Extat apud M. Petit instantia amborum tendinum  
 „Achillis penitus disruptorum sola ligatione sine  
 „ulla futura curatorum. Vid. *Memoir. de l' Acad.*  
 „*Anna* 1722. p. 68.

Sutura  
curandi.

Art. 1350. „Nervorum ac tendinum vulnera  
 „(inquit *Barbette*) putredinem faciliè concipiunt,  
 „& sunt admodum periculosa; punctura est pe-  
 „riculosior quam sectio. His vulneribus probe  
 „animadvertendum est frigida externa valde no-  
 „cere; hoc non tantum de medicamentis sed et-

Curatio:

„ iam de aere intelligendum est , Medicamenta  
 „ debent esse moderatè calefacientia & exsiccantia , minimè acria , qualia sunt *oleum lumbricorum* , *rutaceum* , *hyperici* , *terebinthinae* , *ce-  
 „ raq. sp. lavend. comp. elixir. propriet. balsamum*  
 „ *peruvianum* , *opobalsamum* , *gum. elemi* , *spiri-  
 „ tus vini* , &c. In punctura recenti tendinis aut  
 „ nervi ( ut loquitur *Job Meÿren* ) illico forami-  
 „ ni imponatur plumaceolum sequenti vel simili  
 „ mistura madefactum *℥. Ol. terebinth. sp. vin.*  
 „ *ana p. j. ol. ceræ in quo aliquid euphorbiæ solu-*  
 „ *tum p. ij. misce* , hunc superimponatur pluma-  
 „ ceolum siccum , mox spatula parum ignita ap-  
 „ plicetur , ut calor & vis mixturæ ad interiora  
 „ læsa deferatur , hoc peracto , plumaceolum un-  
 „ guento *Basil.* inunctum priore remoto admovea-  
 „ tur , & superimponatur *Emplast. stip. Paracels.*  
 „ In punctura tendinis juxta observationes & ra-  
 „ tiocinia *D. Cheselden* brachium in situ acclina-  
 „ to non extenso tenendum est .

Notabe-  
re.

Punctura  
tendinis.

*Art. 1351.* “ Inter venæsectionem celebrandam  
 „ homines interdum , maximè ab imperitis chi-  
 „ rurgis , a *punctura tendinum* in artus amit-  
 „ tendi , atque aded in vitæ discrimen conjiciun-  
 „ tur . Qui verò hujusmodi punctura plectuntur ,  
 „ dolorem non statim sentiunt , sed duodecim  
 „ horis post phlebotomiam se eodem affici con-  
 „ queruntur , non tam in orificio nuper facto ;  
 „ quàm in partibus ad axillam tendentibus , ubi  
 „ tandem dolor se figit , & tunc maximè perci-  
 „ pitur , cum brachium extendatur ; attamen læ-  
 „ sa pars tumore admodum insigni non afficitur ,  
 „ eodem avellanæ magnitudinem vix superanti ,  
 „ sed ex orificio *humor aqueus* vel *ichor* quidam  
 „ jugiter distillat , quod quidem præcipuum pun-  
 „ cturæ tendinis *diagnosticum* est habendum . Cu-  
 „ ratur cataplasmate sequent. ut propriis oculis  
 „ observavi ; *℥. Rad. lilior. alb. ℥iv. coq. ad tene-*

Curatio.

„ ritu-

„ ritudinem in lact. vaccin. ℥ij. deinde ʒ. farin.  
 „ lini avenac. ana ℥ij. coquantur farinæ ad cata.  
 „ plasmatis consistentiam in q. s. lactis a radicibus  
 „ prædictis colati & radicibus confusis miscean-  
 „ tur; s. cataplasma parti affectæ calidè applican-  
 „ dum mane & vespere. Sydenham. Ego quoque  
 „ hujusce cataplasmatum efficaciam semel atque ite-  
 „ rum expertus sum.

Art. 1352. Vulnera sequentia sunt lethalia; ce-  
 rebelli; item cerebri profunda aded, ut medullam  
 oblongatam multum lædant, medullæ spinalis pro-  
 funda vulnora, maximè parte superiori; cordis  
 in cava penetrantia; magna quoque vulnera pul-  
 monis, hepatis, lienis, renum, pancreatis, me-  
 senterii, stomachi, intestinorum, uteri in gravi-  
 dis, vesicæ circa arterias ejus majores, aortæ, ca-  
 rotidum, & similibus arteriarum venarumque ma-  
 gnarum. Vulnera magna bronchiorum, vulnera  
 utroque latere thoracis cavitatem penetrantia,  
 diaphragmatis præcipuè in ejus parte nervosa, vul-  
 nera magna ventriculi, intestinorum tenuium,  
 &c.

Vulnera  
qualia le-  
thalia.

### Ettmulleri sententia.

Art. 1353. Vulnera musculi temporalis sunt pe-  
 riculi plena, & rariùs curantur, (inferunt ple-  
 rumque spasmos horrendos.)

Musculi  
tempora-  
lis pericu-  
losa.

Art. 1354. Cura vulnerum consistit in unione  
 partium separatarum, quod opus est solius natu-  
 ræ, quæ beneficio succi nutritii ad omnes partes  
 distributi sensim sensimque easdem renovat, &  
 reducit; chirurgi autem opus est hic adjuvare  
 eam, in hoc bono opere sequendo ejusdem du-  
 ctum, removendo imprimis impedimenta exter-  
 na, ac applicando remedia, quæ parti sint fami-  
 liariora ac amica, vulneraria & balsamica appella-  
 ta. In curandis vulnerebus internè prodesse vulne-

Curatio.

*varia & alcalia*, inter quæ eminent *album græcum*, *cancer fluvialis*, *mercurialia* &c. "Imò tota,, curatio interna consistit in blandiori *diaphoresi*,,, promovenda & conservanda; ideoque *mixtura*,,, *simplex* vulneratis optimè convenit." In vulneribus recentibus non necesse est, ut cura in longum protrahatur; sed potius suppressa hæmorrhagia, & remotis corporibus extraneis, statim instillantur guttæ aliquot *bals. peruvian. simpl.* quod interdum vulnus citò conglutinat: interdum tamen necesse est, ut neglectis balsamicis, *digestiva* applicentur methodo vulgari, ubi, scilicet, conjuncta est contusio, uti in vulneribus *sclopetorum* evenit. *Digestiva* [ 1367. ] ordinariè constant ex *terebinthina* & *vitello ovi* tanquam basi, quibus pro re nata, nunc *mellis parum* cum *myrrha* aut *bals. peruv.* aut *gum. elemi*, &c. addendum, imprimis si circa partes nerveas, quæ aliàs faciliè putrescunt, suppuratio expectanda est. *Elixir proprietatis* omnes nostri corporis putredines arcet ob *myrrham*, ut & *colcothar vitrioli* ab *Helmontio* laudatum, ex hoc *Felix Vourzius unguentum suum fuscum* parabat. *Balsamum peruvianum* reliquis balsamis præfertur, proficuum quoque est *balsamum saturni therebinthinatum*, & *balsamum sulphuris cum oleo hyperici factum*; laudatur *oleum Momordicæ*, *oleum Hyperici* ex seminibus expressum, cui proprii flores infusi sunt, est egregium; *spiritus theriacalis* pro lavandis vulneribus recentibus, est optimum prohibens, &c.

*Turundæ.* *Art. 1355.* Turundis parcè utuntur saniores practici, neque unquam sine premente necessitate; nam nimis frequenter & diu usurpatæ consolidationem impediunt; item partes cutaneas circa labia ad occalescentiam solent disponere.

Quod sequitur de turundarum usu & abusu; & de rara solutione vulnerum, ex libro valdè raro & vix comparando *Johannis Baptistæ Ma-*



gati de rara medicatione vulnerum, &c. decerpfi.

*Art. 1356.* Turundæ & penicilli nihil aliud sunt quam corpora extranea partis affectæ naturam infestantia, & in illis expellendis semper laborat; partem vulneratam distendunt, comprimunt, eidemque sunt oneri, & propterea fluxionis periculo eam exponunt. Veruntamen turundarum & penicillorum usus aliquando saltem admittendus est ac necessarius, & in quibusdam casibus æstimandus, viz. quando ob complicatum affectum remoranda est vulneris sanatio, ut quando viscera vulnerata sunt, & in cavitate thoracis aut abdominis materia continetur aut sub cranio collecta est, & simili rerum statu olim *Romani Chirurgi*, ne sua laude fraudentur, longa & sedula observatione novum curandi vulnera modum, quo rarissimè solvuntur, adinvenere, qui cum experientiæ potius quam rationi & procerum nostrorum doctrinæ inniti videretur; cum *Cæsar Magatus*, ad methodum reducere conatus est: Modus *Ludovico Septalio* clarissimo *Italiae* ornameto valdè arrisit, ipsumque ad praxin felici successu adhibuit, & suis scriptis commendavit. Quoties vulnus solvitur ac detegitur, toties interturbatur & a proprio munere distrahitur natura: & quamvis accedat utilitas ex nova recentium medicamentorum impositione, attamen majus est detrimentum quod ex crebra solutione sequitur, quam commodum ex nova medicamentorum impositione, quorum virtute vulnus haud destituitur; *sanatio etenim est duntaxat naturæ opus*. Status vulneris sub tegumentis oculis mentis cognosci potest; in quibusdam verd casibus solutio & detectio vulneris est perquam necessaria, nempe, quando manualis aliqua operatio requiratur ad peregrinum corpus vel ossis aliquam portionem evellendam, &c. quando caro spongiosa supercreseat, quando ingentis putredinis, vel sordidorum excre-

Turunda  
& penicilli.

Solutio  
rara vulnerum.

excrementorum abundantia sit suspicio, quando adsit dolor vehemens vel erosio & pruritus; sub his & similibus circumstantiis detegenda sunt vulnera, ut congruis remediis his malis occurratur.

**Ulcera.** *Art. 1357.* In medicina facienda experientia docet eandem curandi rationem a vulneribus ad ulcera transferri posse, idque adeo felici successu, ut sæpè deplorata ulcera, & innumeris tractata remediis facillimo negotio hac via sanabilia evadant, corporibus solummodo prius a cacochymia *benè purgatis* & ulceribus a sordibus deterfis.

**Vulnera  
sclopeto-  
rum.**

*Art. 1358.* Vulnera sclopetorum post extractionem globuli plumbei, sicut alia vulnera cum contusione conjuncta curanda sunt; convenit *venæsectio*; revulsio enim (inquit *Galenus*,) quæ e directo fit, celerrimam utilitatem adfert, die proximo *enema lenitivum* injici debet, & fots sequens usurpari, *℞. Summit. hyperici, centaur. min. scord. absynth. ana Mj. flor. ros. rub. chamam. melilot. sambuc. ana Mss. surf. p. j. coq. in aq. font. ad ℥ijss. colatur. add. vin. auster. ℥j. sp. vin. ℥vj. m. pro fots.* Si pus laudabile obtineatur, nimirum album, æquale, leve, minimè foetidum, &c. res in vado est; sin verò pus non fuerit secundum votum, cum unguentis admisceri debet *præcipit. rub. Voiseman.*

**Periculo-  
sa.**

*Art. 1359.* Sclopetorum vulnera sunt omnium pessima ac periculosissima: nam adest semper insignis contusio, & partium dilaceratio; tardius ad suppurationem perveniunt. Vix ante tertium vel quartum diem.

**Curatio.**

*Art. 1360.* Ad curam quod attinet, omni extraneo ex vulnere prius exempto, loco digestivi communis, optimè applicatur *balsamum Parai*, singulariter commendatum ad curam vulnerum sclopetis infligatorum; descriptio hæc est a *Sennerio & Barbette*, *℞. Ol. lilior. alb. vel violarum ℥iv. in hoc coq. catelli duo nuper nati ad ossi-*  
umu.

um usque dissolutionem, postea add. *lumbricorum terrestrium* in vino coct. ℥ij. coquantur simul, colaturæ adde *terebinth. ven.* ℥iij. *sp. vin.* ℥iss. m. f. linimentum, quod egregie conducit ad sedandum dolorem & maturanda vulnera sclopetorum. Ubi autem suppuratum est vulnus, & omne contusum separatum, *mundificativa* sunt usurpanda, & vulnus s. a. tractandum est donec sponte caro nova succrescat.

*Art. 1361.* Vulnera capitis superficialia facile curantur cum *balsamo peruviano*, vel *oleo hyperici*, imponendo desuper *emplastrum de betonica* sed præ reliquis omnibus quocunque pro capitis vulneribus convenit *emplastrum* è *gum. elemi*, si-ve *linimentum Arcaei*; vitanda sunt omnia unctiosa; convenit etiam *gum. elemicum terebinth. mistum* in cranii vulneribus. De eximiis virtutibus hujus unguenti audi si ipsum inventorem. Hujus linimenti nobis inventi ea vis est ut concoquat, digerat, mundificet, atque carnem etiam inducat; hujus certissimi in omni periculo faciendi usus nunquam me pœnituit; & cui omnes ii quicunque fuerint experti, *balsami nomen* non immerito fecerint.

Capitis  
vulnera.

*Art. 1362.* Pericranio læso, ut nudet diu os, vel ut putrefiat, os privatur vasis periostei adeoque & suis, stagnat in his liquor, putrefactus squamam separat, unde os flavum, fuscum, nigrum, tandem foliolum deponit. In hoc casu curatio (tutè, promptè, & expeditè) fit os leviter *parva terebra* diversis vicinisque locis usque ad medium perforando, unde *exfoliatio* cavetur, periosteum inde renascitur applicando plumaceola *spiritu vin. mastichino* imbuta, & cura citissime præstabitur. Ex *Boerhaave*, „quem chirurgus, „ præcipue minus exercitatus in vulneribus capitis & calvaria læsa præ reliquis omnibus quibus- „ cunque diligenter consulat; & errores in praxi

Cranium  
nudatum.

cvi-

„ evitabit. In omnibus capitis vulneribus, præci-  
 „ puè gravioribus, ubi cranium denudatum fue-  
 „ rit, danda est opera, inter medicandum, par-  
 „ tem vulneratam, quantum poterit a frigore ex-  
 „ terno tueri.

Balsamum  
Samarita-  
num.

*Art. 1363.* Balsamum *Samaritanum* in curan-  
 dis vulneribus valdè commendatur a quibusdam,  
 privatim a *M. Le Clerc*, quod conficitur ex *vino*  
*& oleo oliv.* diuturna coctione in balsamum re-  
 ductis: est etiam aliud magis compositum, quod  
 frequenti usu comprobatum est; *℥i. Vin. Hispan.*  
*ol. ros. ana ℥ss. sacchar. cand. mel. violar. ana*  
*℥ij.* coquantur simul lento igne & f. balsamum,  
*Belloste.*

Inflam-  
matio  
vulnorum.  
Synovia.

*Art. 1364.* Inflammationem vulnorum præ reli-  
 quis sistit *aqua calcis*, vel per se, vel cum *cam-*  
*phora* aut *sacchar. Saturni* sociat.

Curatio:

*Art. 1365.* Synovia est fluxus aquæ albicantis  
 ex articulis vulneratis, estque periculosum sym-  
 ptoma, & subinde partium atrophiam relinquit,  
 ut compescatur, inspergatur pulvis astringens;  
 quidam chirurgus recepit *usneam cran. human.* &  
*laccam pictorum ana.* Aliàs singulare experimen-  
 tum est *stercus porcinum* cum sanguine vulneris  
 invicem mistum, ac coctum, & ita vulnere ap-  
 plicatum instar cataplasmati. *Ettmuller.*

## U L C E R A .

*Ettmulleri sententia.*

Ulcus;  
quid.

*Art. 1366.* Ulcus est solutio continui ab acre-  
 dine corrodente cum partium quarundam abla-  
 tione; corrodens hoc in ulceribus est acre aci-  
 dum, alimentum parti proprium in excrementum  
 acre, sive in saniem immutans; ulcus autem est  
 vel simplex vel complicatum, sinuosum, fistulo-  
 sum,

sum cariosum, &c. Ulcera antiqua maciem, febres lentas, aliaque mala æquè excitant, ac ulcera pulmonum.

Art. 1367. Ulcera diuturniora sine internorum Curatio:

usu rarissimè curantur; interna autem debent esse *acidum absorbentia & destruentia*, & *sudorifera*, præcipuè decocta *lignorum*, *antimonialia*, *viperina*, *volatilia*; inter purgantia optimum est *extractum hellebor. nigr. cum mercurio dulci*; sed omnibus præferenda sunt *vomitiva*, sæpiùs repetita, ad facilem ulcerum curationem reddendam: His etenim & hujusmodi internis omninò neglectis, frustra frequentissimè chirurgicum imploratur auxilium. In ulceribus pertinacissimis, & aliàs incurabilibus ipsa *salivatio mercurialis* in auxilium vocanda est. Antiqua ulcera interdum claudi non possunt, nisi in loco opposito fiat *fonticulus*.

Quoad remedia externa, in genere sunt *digestiva*, *mundificantia*, *sarcotica*, & *epulotica*, quæ pro varietate conditionis ulceris curandi a prudenti chirurgo usurpanda sunt. Sequens est *digestivum* probatissimum, ℞. *Terebinth. venet.* ʒj. *vitel. ovi unius*, *mel. ros.* ʒvj. *ol. hyperic.* ʒj. fiat unguentum;

*Digestiva*

interdum addantur *gum. elemi*, *unguentum basilic. thus*, *massiche*, *farina hordei*, &c. *Mundificantia* a chirurgis usurpata quamplurima sunt, insigniora tamen, quæ sequuntur; *radix apii*, *aristolochiæ utriusque*, *fol. nicotianæ*, *flor. hyperici*, *album græcum*, *camphora*, *balsamum peruvian. myrrha*, *aloe*, *euphorbium*, *ex sulphure præparata*, *saturnina*, *æs viride*, *arsenicum*, *aqua calcis vivæ*, *mercurius dulcis*, *mercurius præcipitatus*, *balsamum sulphuris*, *oleum* & *unguentum nicotiana*, *unguentum ægyptiacum*, *apostolorum*, "item", *oleum camphoræ*, viz. *camphora in dupla quantitate spiritus nitri soluta*, &c. " *Sarcotica* & *Epulotica* gradualiter tantum differunt; sequens valdè proficuum perhibetur, ℞. *Unguent. diapomphol.*

*Mundificantia*

*Sarcotica & Epulotica*



*phol. tutia ana p. j. diasulph. Rulandi p. ij. ol. nicotian. parum M.* " Vix datur præstantius quàm , emplastrum de lapide calaminari D. Turner.

*Art. 1368.* In ulceribus vetustis emplastrum sequens est egregium , *℥. Calcis vivæ bis vel tertio lot. & parum exsiccet. q. v. ol. lini. q. s. misce ; & cum bolo armen. vel bol. rub. tingatur ad carneum quasi colorem.*

Callus .

*Art. 1369.* In ulcere diuturniore aut malè tractato aliquando supervenit *callus* , qui nunc cingit simpliciter ambitum seu orificium ulceris ipsius , nunc verò totum sinum ulceratum incrustat , & occupat , & talia ulcera sinuosa cum callo interno vocantur *Fistula* ; quæ difficiles sunt curatu propter callum , qui nisi auferatur , sunt incurabiles . Amplificandus est sinus cum *rad. gentian. & absumendus est callus cum pulv. alum. ust. mercurio præcipit. succ. nicotian. &c.* Aliquando necesse est , ut tota fistula cultro incidatur , & aperiat , & deinde callus absumendus cultro vel antedictis remediis .

Caries .

*Art. 1370.* Caries ossis frequenter accidit in ulceribus inveteratis , quæ est corrosio ipsius ossis , & quasi ejusdem ulcus ; si os denudatum fuerit , primò oleosum quodammodo & pingue apparet , hinc successivè flavescit , deinde nigrescit , & postea foraminulatum redditur , & quasi teredinibus perforatum ; si absconditum fuerit os , specillo expiscanda læst caries ; tunc enim os in fundo non glabrum sed inæquale , & scabrosum percipitur , quin & quæ effluunt ex ulcere sordes & excrementa pingua oleosa & acrida majorique copia , & ulcera nequeunt ad cicatricem perducì . Labia ulceris sunt dilatanda , remedia unctuosa vitanda , pulvis *euphorbiæ* est expertissimum remedium , huic proximum est *radix irid. florent. mercurius dulcis* valdè commendatur , ut & *oleum garyophyllorum* ad exfoliationem promovendam . " *Oleum camphoræ,*

Curatio .

„ *phora*, viz. *camphora* in *dupla* quantitate *spiritus nitri soluta* à quibusdam prædicatur. *Hist. de l' Acad.* Vol. IX. p. 74. Si hæc & similia, successu careant, denudandum est os, & abradendum; & si corruptio sit profundior, terebrum, vel quod potius est, *cauterium actuale* adhibendum est; nam ultra omnia ferri igniti tactus ossis humiditatem exsiccat, idemque ad promptam desquamationem disponit.

*Vvisemani sententia.*

*Art. 1371.* In ulceribus simplicibus tractandis non raro mihi fuit usitatum ulcus digerere, detergere, & incarnare cum *unguento basilic. & mercurio præcipit.* proportionem majori vel minori pro re nata invicem committis, & postea ulcus *cicatrizantibus* claudere: Sed rarissime inveniuntur ulcera simplicia; complicantur enim ut plurimum variis accidentibus, uti intemperie, dolore, fluxione, &c.

*Art. 1372.* “ Ulceribus quandoque accidit *intemperies* curationem tantoperè impediens ut hanc expectare non datur, nisi illa prius corrigatur; hæc autem est quadruplex. In intemperie calida pus acre est, labra ulceris rubra, & adest insignis dolor. “ Usurpanda sunt *refrigerantia*; moderate *astringentia*, & *repellentia*; talia sunt *fotus astringentes*, *unguentum album camphoratum*, *refrigerans Galeni populn. & similia.*

*Art. 1373.* In intemperie frigida “ labia ulceris mollia sunt, albicantia, & ubi res malè succedit, livida evadunt. “ Conveniunt *fotus discutientes & attenuantes* quemadmodum in tumoribus *œdematosis*, & unguenta ac emplastra debent esse *exsiccantia & detergentia* quæ satis nota sunt.

*Art. 1374.* In intemperie humida “ caro mollis est & flaccida, sepè supercrescens, humorum flu-

„ xus copiosus ; “ hic indicantur *exsiccantia* & *astringentia*, qualia sunt *unguentum diapompholyg. tutiæ*, & *calce lota*, *nutritum*, *desiccativum rubrum*, &c.

Sicca.

Art. 1375. “ Ulceræ cum intemperie sicca conjuncta, ubi pus paucum aut ferè nullum, diffusi, culter sanantur. “ Topica debent esse *humectantia*, foci ex *emollientibus*, unguenta & emplastra & *digestiva* conveniunt ; *unguentum basilic. & mercur. præcipit.* apprime conferunt. In his omnibus hæctenus memoratis remedia interna non sunt negligenda.

Ulceræ  
cum dolore.

Art. 1376. In ulceribus cum ingenti dolore vix ferendo, præmissis ritè internis, quæ indicantur, attendendum est ad conditionem ipsius ulceris, ut deprehendatur vera doloris causa ; inspicendum est, an humor sit crassus, qui *sordes* vocatur, vel tenuis & ichorosus, qui *sanies* appellatur ; uterque peculiariter *detergentibus* corrigendus est, his ritè peractis manente adhuc dolore ad *lenientia* & *anodyna* confugiendum est ; cataplasmata ex *mucilag. sem. psyllii*, *cydoniorum*, *far. hord. croc. vitel. ovi*, &c. *unguentum populi. refrigerans Galeni*, &c. refrigerant & dolorem leniunt ; sed pro varietate causarum varia exurgit indicatio.

Fungus.

Art. 1377. In ulceribus frequenter caro *spongiosa* sive *fungosa* succrescere solet, a nimio humorum affluxu ortum duens, vel a chirurgi imperitia ; supprimenda est medicamentis *exsiccantibus* ; imò *cathæreticis* & *causticis* absumenda est ; mitiora sunt *lapis tutiæ*, *alumen ustum*, *mercurius præcipit.* fortiora *vitriolum romanum*, *aq. lapidis medicamentos. aq. viridis Fallopii*, &c. “ De reliquis, ulcerum affectionibus & accidentibus consulatur, author, qui candidè & modestè scripsit.

*Bellostii sententia.*

*Art. 1378.* Coronidis loco subnectere haud pigebit & experimentum illud *M. Belloste* propter singularem illius virtutem in ulceribus curandis; quod quidem *euporiston* nihil aliud est quam decoctum foliorum juglandii in aqua cum paucis saccharo; modus utendi est linteolum imbuendo, & ulceri imponendo, & non sæpius quam secundo vel tertio quoque die eandem applicationem renovando, donec ulcus sanatur. Hoc medicamentum utcumque simplex & vulgare videatur, suppurat, detergit, incarnat, putredini resistit, & ceterius & scelicius quam aliud quodcumque remedium hactenus notum, inquit author, qui multò copiosior est in illius laudibus, p. 260.

*Vvisemani sententia.*

*Art. 1379.* Ad ulcera pertinet *Fistula in Ano*; quæ est ulcus sinuosum a phymate vel hæmorrhoidibus internis ut plurimum ortum ducens. *Fistula in Ano.* *Fistulæ* quæ a phymate oriuntur, sunt peiores, dolentes admodum & curatu difficiliores, utpote in musculorum interstitiis profundè penetrantes, & cuniculos agentes, & quanto sinus ab ano sunt remotiores, tanto deteriores, quoniam apertionem per incisionem non admittunt. " Sic arbitrat<sup>us</sup> est *author noster*; quoniam in isto rerum statu necesse est, ut musculus ani sphincter disceindatur: Sed *D. Berbeck Chirurgus Eboracensis*, vir probus, & hac operatione speciatim celeberrimus, asseruit se sphincterem ani frequenter penitus divisisse, & etiam si ægri durante vulneris curatione sæces continere nequeant, post consolidationem facultatem sphincteris re-

Hh

,, tentri-

„ tentricem redintegratam fuisse . *Vid. Cheselden*  
 „ *Anat. p. 63.*

Ab hæ-  
 morrhoi-  
 dibus.

*Art. 1380.* Fistulæ ab hæmorrhoidibus internis originem trahentes inter tunicas intestini recti sensim generantur, & perforationem exiguam habent juxta ani ambitum, unde saniem tenuem sive ichorem sine dolore emittunt; progressu vero temporis superveniunt pruritus & excoriationes; orificia tandem callosa evadunt, & quandoque ad tempus clauduntur, & deinde certis intervallis denud erumpunt.

*Sennerti sententia .*

Fistulas  
 non teme-  
 re curan-  
 dæ .

*Art. 1381.* Fistulæ, si copioso fluxu, aut fœtore, aut alio modo, nihil incommodi afferant, sed potius natura superfluos humores e corporibus *rachymicis* & *cachecticis* cum ægri commodo per eas evacuet, curari non debent, sed servari. Fistulæ vero simplices & recentes sine periculo curari possunt.

Incisio  
 per filum.

*Art. 1382.* Incisionem quod attinet, si ea sine periculo, nè scilicet musculus ani lædatur, & fæces præter voluntatem egrediantur, tentari possit, fit vel *filo seu laqueatione*, ut appellant, vel *ferro*. *Filo* ita fit: Sumatur filum ex serico, vel seta equina, aut aliud, quod non facile putrescat; id immittendum in extremitatem specilli stannei vel plumbei, instar acus perforati, & in fistulam intrudendum, digitoque, oleo rosaceo inuncto, in rectum intestinum immisso, filum apprehendendum, specillum extrahendum, & duæ extremitates ejus connectendæ, & quotidie vela chirurgo, vel ab ipso ægro arctius constringendæ, donec tota fistula incisa sit; hinc callus absumendus, & ulcus curandum.

Incisio  
 cum instru-  
 mento fer-  
 reo .

*Art. 1383.* Ferro *incisio* celerius hoc modo fit; in fistulam specillum plumbeum immittendum, usque



CAP. XIII. *Gangræna & Sphacelus*: 483  
 usque dum intestinum rectum penetret, & hinc  
 instrumento falcato digito in anum immisso se-  
 cundum styli plumbei ductum fistula incidenda,  
 cavendo tamen, ne hæmorrhoides lædantur, &  
 hæmorrhagia exciteretur. Incisione parata, penicil-  
 lum albumine ovi & pulveribus astringentibus il-  
 litum immittere decet; die sequente Hippocrates  
*æris flore ustō* conspergit, & frustulum spongiæ  
 melle illitum intrudit, ut fistula aperta servetur,  
 idque diebus septem continuat, donec callus absum-  
 matur; interim spongia vino austero madida im-  
 ponenda; ut humores reprimantur. De Callo ab-  
 sumendo alibi dictum est. ( 1369.)

## GANGRÆNA & SPHACELUS,

### *Ettmulleri sententia.*

*Art. 1384.* Gangræna significat incipientem par- *Gangræna  
& Sphac-  
lus quid.*  
 tis mortificationem, cum dolore tamen & ali-  
 quali ardore conjuncta est: Sphacelus verò seu  
 necrosis e contra est perfecta mortificatio, in qua  
 omnimoda vitalitatis est carentia; differunt ergo  
 saltem gradualiter gangræna & imminens sphace-  
 lus.

*Art. 1385.* Interdum supervenire solet fracturis, *Causa.*  
 vulneribus malè tractatis; ulceribus eacoeth. &  
 tumoribus; imprimis sanguineis; aliquando au-  
 tem a causis internis oritur. In partibus gangræ- *Diagnosis.*  
 nosis color mutatur in pallidum, obscurum, sub-  
 livescens, aut cæruleum, & tandem in nigri-  
 cantem: caro autem tensa mox evadit flaccida &  
 mollis, & sphacelo facta; cutis sponte a partibus  
 separatur, & aqua quadam decolor pravi odoris  
 effluere solet, & pars affecta halitum cadavero-  
 sum spirare.

*Art. 1386.* Certissimum est gangrænam a cau- *Prognosis.*  
 sa interna lethalem esse: Auferatur enim licet

484 *Gangræna & Sphacelus*. CAP. XIII.  
membrum, iterum regerminabit malum, & nec-  
cessariò mortem post se trahet.

*Curatio.*

*Art. 1387.* Ad gangrænam sistendam interna omnia sunt *sudorifera & alexipharmaca*; externè autem decoctum *calcis vivæ* est mirabile, vel solitarium, vel efficacius, si in eodem incoquatur *sulphur*, & dissolvatur *mercurius dulcis*, addito *spiritu vini* (*camphorato*.) In graviore gangræna, præmissa profunda scarificatione, conducit *fi-mus equinus*, in vino aut urina coctus, fuit experimentum & secretum *Sylvii & Barbettii*, (& melius esset si adjiciatur *spiritus sal. armoniac.*) In usum quoque venire solet *unguentum ægyptiacum* calidè usurpatum, facta priùs, ut artis est, scarificatione, &c. "Chirurgis nostratibus solen-  
,, ne est locis scarificatis *oleum terebinth. calidum*  
,, *cum triente tinctura myrrha & aloe* adhibere,  
,, *& emplastrum e theriaca Londinensi calefactum*  
,, *superimponere*,

*Boerhaavii sententia.*

*Signa gan-  
grænae.*

*Art. 1388.* Signa Gangrænae sunt phænomena inflammationis subitò ablata sine correctione cau-  
sæ, sensus hebes, color pallidior, cinereus, fus-  
cus, lividus, &c. mollities, flacciditas, ad tactus  
vestigia non resurgens, pustulæ ichore lymphati-  
co subflavo vel rubello plenæ in loco inflamma-  
to; ubi a frigore, pruritus & punctura ingens,  
unà cum rubore intenso, quem brevi nigredo  
mortifera sequitur.

*Perfecta  
necrosis.*

*Art. 1389.* In perfecta necrosi sensus morusque  
integrè tolluntur (gravitas aliqualis quodammo-  
do in parte sentitur;) color est lividus, fuscus,  
niger; caro est flaccida, & frigida; adest foetor  
cadaverosus, corruptio mortifera profunda, om-  
nia vicina depascens in ossa usque. Gangrænae il-  
licd

CAP. XIII. *Gangræna & Sphacelus.* 485

licè succurrendum ; sphacelus illicè extirpandus ; In senio ferè semper a quacunque causa lethalis est, ita in hydropicis, phthisicis, & scorbuticis.

*Art. 1390.* Ut suppuratio acceleretur, conducit Curatio.  
*scarificatio* putrefacti usque ad vivorum initia, sic enim suffocatione nimia imminuta, loco serpentis gangrænæ sit abscessus, quo cutis & adeps gangrænosa plerumque a subjectis adhuc vivis separantur. Incisa pars *calidis liquoribus, corruptioni resistentibus, & duritiem escharæ emollientibus* fovenda ; toti parti affectæ assiduè applicanda *cataplasmata calida*, & cum calore continuo sustentato agentia ; huc etiam plurimum facit rarior partis detectio, quàm vulgè fieri solet. Si ab impacto *acri gelu* gangræna fiat, pars *nive imposita* vel impositis linteis *aqua gelida* humectatis operienda erit, donec spiculis frigoris in nivem vel aquam receptis, iterum solvi incipiat, redeunte vita : aliter caloris applicatu pars putrescit ; actis spiculis ; eo autem peracto *calidis* refocillandus *cardiacis*, & in *sudorem usque* calefaciendus æger est. De *amputatione* videatur locus N. 469. & consulantur reliqui scriptores chirurgici.

A peste gangrænæ.

*Bellostii sententia.*

*Art. 1391.* Bellostius sequens unicum remedium Remedium singulare.  
instar omnium ad gangrænâ & sphacelum venditat. *℞. Spirit. nitr. vel aq. fort. p. ij. argent. viv. p. j.* fiat solutio ; in hoc liquore madefiant lintea, & parti gangrænosa circumvolvantur, & promptè separabitur mortuum a sano, neque opus est, inquit author, ut aliud quodcunque medicamentum ad gangrænâ sistendam excogitemus ; non enim reperitur aliud, quod tam citò, & tam certò, penitus absolvit.

## C A P U T XV.

*Sive Fasciculus Morborum decimus quartus,*

## C H L O R O S I S.

*Estmulleri sententia.*

*Art. 1392.* **C**hlorosis sive febris alba virginum longè distat a *cachexia muliebri*, hæc enim antecedit aut insequitur mensium suppressionem; chlorosis verò est affectus proprius virginibus & viduis, saltem extra consortium virorum viventibus, aut quibus mariti non satisfaciunt. Hoc morbo affectæ pallent, habentque sub oculis coronam subcæruleam vel subrubescentem, tristes sunt, & adest sæpiùs febricula lenta, & quasi erratica, pulsus inæqualis & varius, vomitus etiam interdum infestat, ac præcordiorum anxietas, &c. Mensium suppressio est ferè tantùm effectus hujus morbi. Tales volunt (inquit *Lindanus*) cohabitare viro.

Chlorosis quid.

A cachexia muliebri differt.

*Riverii sententia.*

Morbi de febre.

*Art. 1393.* Pallent ægrotae, & adest gravitas corporis, segnities, intumescencia faciei & palpebrarum, palpitatio cordis, difficultas spirandi, somnolentia, rerum absurdarum appetentia &c.

Curatio.

*Art. 1394.* Præmissis universalibus *chalybeatis* & *amaris* restituendæ sunt; & in frigidioribus decoctum *ligni guaiaci* multum juvat.

## M E N S T R U A T I O .

*Art. 1395.* "Mulierum profluvii menstrui ra-  
 „ tiones expedire & theoriam exponere admodum  
 „ difficile & longum esset, & professæ nostræ  
 „ brevitati minus congruum; ideoque paucissimis  
 „ solummodo attingam. Menstrua, perinde, ut  
 „ *de cæteris quibuscunque humoribus* notum est,  
 „ (quantumcunque a medico quodam magni no-  
 „ minis nuper defuncto dissentire videar) è solis excre-  
 „ toriis ductibus glandularum uterinarum, ibidem  
 „ locatarum, & isti muneri inservientium prodire  
 „ sine difficultate asserere audeo: quod satis ma-  
 „ nifestum est ex ipsa partium anatomia, ex chy-  
 „ lo scilicet supervacaneo in humorem istiusmodi  
 „ viscidum cocto, & in orbe sanguinis paulatim  
 „ accumulato. Insignis est menstruorum præ eo  
 „ sanguinis *lentor ac visciditas*, ingratum quoque  
 „ ac inusitatum odorem in plerisque spirant, non  
 „ qualem sanguis e venis missus, aut ex hæmor-  
 „ rhagiis effluens. Rubent quidem menstrua, quod  
 „ & serum & sanguinis integri globuli rubri unâ  
 „ cum isto humore transmittuntur, *ob ampliatas*  
 „ *præter modum in istis ductibus commissuras*,  
 „ unde materia excreta est *compositum quiddam*  
 „ ex sanguine & prædicto humore glutinoso,  
 „ crasso, & viscido. Quantitas singulis vicibus  
 „ ordinariò excreta, in statu sano & naturali,  
 „ sit ab unciiis quinque vel sex ad octo vel de-  
 „ cem ad summum, non a viginti ad triginta,  
 „ secundum laudatum authorem. Fœtus in utero  
 „ chylo materno, in gremio sanguinis circulan-  
 „ te, per vasa umbilicalia delato omninò nu-  
 „ tritur, non sanguine menstruo; sicut idem  
 „ loqui amavit. Lac in mammis a chylo,  
 „ eoque non multùm mutato, secernitur, non a  
 „ materia per vias uterinas excerni solita; quem-

Menstrua  
sic.



„ admodum vir eruditus somniavit, qui tractatum  
 „ de emmenologia in juventute scripsit.

*Etmulleri sententia.*

Fœminis  
 propria.

*Art. 1396.* Fluxus menstruus est fœminis proprius; ( “ memorantur tamen *quædam fœmine*  
 „ menstruis prorsus immunes “ ) nam inter animalia nullum præter *simium & barbum piscem* similem pati fluxum dicitur: Nonnulli tamen, licet pauci, *vir* singulis mensibus talem fluxum per penem patiuntur. “ Hujusce phænomeni præ-  
 „ ternaturalis & rarissime accidentis in toto vitæ  
 „ curriculo duo tantum exempla mihi cognovisse  
 „ obtigit. Viris quoque ( inquit *Lister in dissertatione de humoribus* ) menstruum chyli super-  
 „ pondus, æque ac fœminis, accrescit; sed in *urinam* convertitur, profluitque menstruatim per-  
 „ rinde ut virginibus forte ante pubertatem, &  
 „ vetulis rursus a cessatione menstruorum. Hæc  
 „ opinio in *Aphorif. 65. & 66. Lib. I. Sanctorii*  
 „ fundatur, viz. Corpora quoque virorum sana &  
 „ moderatissimo victu utentia singulis mensibus  
 „ fiunt solito ponderosiora, unius scilicet duarum-  
 „ ve librarum pondere, & redeunt ad consuetum  
 „ pondus circa finem mensis, ad instar mulierum;  
 „ sed facta crisi, per urinam pauld copiosior  
 „ siorem, vel turbidior. Ante dictam crisin  
 „ menstrualementem a somno factam, vel gravitas capitis,  
 „ vel corporis lassitudo perſentitur, & de-  
 „ inde pauld copiosiore urina evacuata omnia sedantur.

Tempus  
 erumpendi, & de  
 sinendi.

*Art. 1397.* Fluxus mensium ordinariè incipit quasi motu naturæ critico ad finem *secundi septennarii*, & desinit similiter circa finem *septimi septennarii*; nonnunquam citius inchoat, & diutius fluit. “ Cuidam puellæ *quinto ætatis anno* menses eruperunt. Alias nonnullas *novi octennes* &  
 „ noven-

„ novennes, quibus earundem fluxus incepit ; sed  
 „ in hujusmodi ætate præmatura, utcumque una  
 „ vel altera vice fluxerunt, vix unquam ( quan-  
 „ tum ego observare potui ) constanter menstrua-  
 „ tim evacuatæ fuerunt. Novi sceminam, adhuc  
 „ viventem, nunc *septuagenariam*, si non ali-  
 „ quot annis seniozem, quæ ab ineunte pubertate  
 „ menstruatim rectè purgata fuit, & jam nunc  
 „ in tam provecta ætate catameniis colore & con-  
 „ sistentia usitatis, periodis solitis, haud desti-  
 „ tuitur, cui per totum vitæ cursum uno tenore  
 „ minus interrupto cum optima valetudine jugiter  
 „ fluxerunt. Haud scio, an universa medicinæ hi-  
 „ storia par exemplum suppeditet, necne. “ Ex  
 quo hoc scripsi aliud exemplum inter legendum  
 mihi occurrit, viz. in Transact. Philos. N. 337.

## M E N S I U M   S U P P R E S S I O.

*Ettmulleri sententia.*

*Art. 1398.* Quibus menses nunquam fluxerunt, <sup>Mensium suppressio-  
tionis cura-  
ratio.</sup> & tamen sanæ sunt medicamentis non sunt ten-  
 tandæ; menstruatio enim est opus naturæ. In sup-  
 pressionem mensium inter purgantia *colocynthis* (ideo-  
 que *pil. ex duobus*) & *helleborus niger* menses sti-  
 mulare & uterum sollicitare solent, præsertim si  
*mercur. dulcis* adjungatur. *Radices angelica, fol.*  
*marrub. alb. &c.* in vino infus. cum *aromat. quibus-*  
*dam & amaris* in frequenti usu sunt. *Sabinum*  
 est fortissimum remedium, & ejus oleum est po-  
 tentiæ stupendæ ad menses ciendos & foetum pel-  
 lendum, ut etiam *borax veneta*; *atrifolochia* est  
 fere specificum.

*Art. 1399.* Indicationes curativæ sunt quæ se- <sup>Indicati-  
ones cura-  
tivæ.</sup>  
 quuntur. 1. Ventriculi chylosis imprimis est recti-  
 ficanda. 2. Sanguinis cruditas volatilibus, salinis,  
 aromatibus, est corrigenda. Humoribus viscidis

tas vasa uterina obstruentium isdem incidenda .  
 4. His peractis, remediis appropriatis fermentatio  
 menstrua stimulanda est . Menses stimulandi sunt  
 stato fluxionis tempore, si cognosci possit, si non,  
 interrogandæ sunt, an non singularem interdum  
 in corpore percipiant sanguinis motionem, &  
 agitationem, & insolitos dolores lumborum, &  
 pulsationes in locis vicinis, aut febriles effervescen-  
 tias &c. tunc enim temporis propinanda sunt *sti-  
 mulantia* : Si verò nulla horum adsunt, monent  
 practici, quodd convenientissimè dentur specifica  
 tempore novilunii & crescente luna . “ Empiri-  
 cum est ( inquit *Forestus* ) menses in extenuata  
 „ provocare niti . “ *Rosmarinus* aliquid singulare  
 habet in morbis mulierum a mensibus obstructis  
 ortis . Urina nigra in mensibus suppressis est bo-  
 num signum,

*Farrago sententiarum .*

Virtutes  
 Mercurii  
 & auri in  
 hoc & a-  
 liis mor-  
 bis domā-  
 tis .

*Art. 1400. Mercurius* [ inquit *Pitcairnius* ] me-  
 lius cum vi ejusdem generis & majori, fluxum  
 menstruum provocat quàm *mars* . Idem affirmare  
 licet de *auro*, si atteratur ( & atteri potest ) in  
 partes adeo parvas, ut earum superficies, habita-  
 ratione molis tantæ sint, quæ reddant partes illas  
 aquæ levitate pares . Morbi lepra, fluor albus,  
 lues venerea, scorbutus, &c. *auro quàm mercurio*  
 tutius atque citius sanabuntur .

Radix  
 hellebor.  
 nigr.

*Art. 1401. “ Radix hellebori nigri veteribus*  
 „ in frequenti usu *humoribus attenuandis*, &  
 „ *privatim mensibus movendis* nuperis annis mo-  
 „ derna praxi redintegratur, & non infimum lo-  
 „ cum inter *emmenagoga* obtinet, præcipuè, ubi  
 „ ob calorem hecticum *chalybeata* porrigere ne-  
 „ fas esset . In mensium suppressionibus quando-  
 „ que etiam locum habent externa remedia, qua-  
 „ lia sunt *suffitus, balnea, fomenta* &c. pro cer-  
 to

CAP. XIV. *Mensium difficultas.*

491

„to his plurimum usus est Hippocrates. “ Præ-  
 ter dicta *emmenagoga cantharides cum camphora* Medicæ  
mēta alia.  
 (dos. ana a gr. ij. ad vj.) menses movent; *mar-*  
*tiata omnia*, *ens veneris extractum ecephracticum*,  
*tinctura martis*, *enema hystericum*, *enema tere-*  
*binthinatum*, *electuarium martis*, *infusum chaly-*  
*beatum*, *amarum*, *mistura ecephratica*, *vinum*  
*chalybeatum*. &c.

## MENS IUM D I F F I C U L T A S.

*Ettmulleri sententia.*

*Art. 1402.* In quibusdam mulieribus præcipue Mensium  
difficultas.  
 sedentariis [ & quæ nunquam pepererunt ] men-  
 ses cum vehementi dolore & perturbatione fluunt;  
 dolores patiuntur tanquam colici, & parturien-  
 tium similes, aut hystericæ affectu laborantium,  
 &c. & si non maturè succurratur, metus est ne  
 omnino supprimantur menses.

*Art. 1403.* “ Si medicus in ipso paroxysmo & Curatio.  
 „præsentis dolorificæ excretionis consulatur, præ-  
 „scribere debet *carminativa & stomachica*. Extra  
 paroxysmum eadem exhibenda sunt ac in catame-  
 niorum suppressione; in paroxysmo conveniunt  
*clysteres carminantes & terebinth.* qui difficiles men-  
 ses facilius promovent; laudatur *sperma ceti*. Si  
 dolores sint maximè atroces & symptomata gra-  
 vissima, *laudanum* propinari debet, sed non sine  
*mensibus moventibus consociatis*. Pro usu externo fo-  
 tus sequens, *℥. Fol. laur. artemis. ana Mij. puleg.*  
*Mj. flor. cham. sambuc. ana p. j. rad. angel. levisst.*  
*ana ℥ij. bac. laur. ℥j. junip. ℥β. concis. & contus. coq.*  
 in q. s. vin. Hispan. vase clauso.

*Art. 1404.* Cum menses per loca aliena effluant Menses  
per loca  
aliena e-  
gredientes.  
 (per oculos, aures, nares, gingivas, vias salivæ,  
 œsophagum, alvum, vesicam, mammas, cutim,  
 vulnera, ulcera, &c.) *saphena* secari debet, aut

CUCUR-

492 *Mensum fluxus nimius.* CAP. XIV.  
*cucurbitula* inguinibus, femoribus internis vel suris applicari.

*Hamiltoni sententia.*

Remedium ad dolores catameniorum.

*Art. 1405.* Fœminæ nonnullæ sub tempus catameniorum corripiuntur doloribus ita acerbis, ut illorum, qui parturientes excruciant, pœnè sint æmuli: ad quos leniendos nihil unquam novi præstantius, quàm *oleum amygdalarum dulcium* vel *lini* recenter expressum ad ℥ss. vel ℥vj. vel per se vel cum *syr. violar.* sing. noct. per mentes aliquot. [ hoc remedium expertus laudo, sed in majori quantitate exhiberi debet. ]

## MENSIUM FLUXUS NIMIUS.

*Erismulleri sententia.*

Fluxus mensium nimius.

*Art. 1406.* In omnibus nimio mensium fluxu laborantibus ventriculi robur enervatum est, & ut plurimum adest dolor in dorso, & circa lumbos; fœminæ sunt scorbuticæ, tactu molles, & habitu quasi aquoso præditæ. In mulieribus senescentibus nimia menstruatio plerumque incurabilis est.

Curatio.

*Art. 1407.* In curatione fluxus non est subito nimis sistendus, ne graviora mala inducantur. *Rhabarbarum* præ reliquis purgativis laudatur, quoniam pollet vi astringente; *venæsectio* culpatur, fluxum enim vehementiorem reddit. " Quo-  
,, tidiana tamen experientia docemur *venæsectio-*  
,, nem Revulsionis gratia celebratam plurimum  
,, prodesse; secunda est vena in Brachio, & san-  
,, guis partitis vicibus mittendus *digito per vices*  
,, *foramini imposito*: ita enim multas vidimus,  
,, quæ detracto sanguine multo convalescerunt,  
,, cum nullis aliis remediis posset reprimi fluxus.

Con-



Conveniunt opiata speciatim semen hyoscyami (unde valet electuarium Boyleanum); item succus plantaginis, urticae, menthae, decoctum cort. granatorum visc. quercin. tinctura & syr. e coral. saccharum saturni, &c. cum fructu usurpantur. Ex Marte preparata, licet menses stimulant, tamen fluxum nimium constringunt; chalybeata enim propriè sunt astringentia. "Mercurius & Mars [inquit Pitcairnius] fluxum nimium ventris & menstruum immodicum tollunt, æqualiter tollendo impedimenta aliarum secretionum, & sic eas augendo, cum per circularem motum ad omne corpus æqualiter ferantur, "Sicut alias hæmorrhagias, ita in specie uterinas sistunt sterco-  
ra animalium, imprimis caninum, asinum, & suillum (hoc ultimo utuntur rustici in mictu sanguineo jumentorum). Pulvis sequens vel huic similis in frequenti usu est cum vino rubro, ℞. Coral. rub. præp. lapid. hæmatit. bol. armen. ana ʒj. borac. calcinat. alum. crud. ana ʒss. laudan. opiat. gr. iv. f. pulv. pro chart. vj. sumatur una bis in die. Spongia cum vino rubro & aceto imprægnata vulvæ applicari potest, vel sperma ipsum ranarum cum paucis aceto & alumine linteis multiplicatis eodem loco usurpatum a quibusdam laudatur. Si mulier sit bibacula omnia erunt frustra. "Malum hoc frequenter diuturnum est (inquit Vvaldschmidius) & viam sternit ad hydropem vel atrophiam; & quæ semel morbo hoc graviter laborarunt, plerumque manent valetudinariæ. Conveniunt blandiora evacuantia non fortiora; sudorifera sunt proficua, privatim rob. sambuci, juniperi, &c. Viscus quercinus est expertum remedium Paracelsi ad nimium catameniorum fluxum.

## Hamiltoni sententia.

Remedia  
singulare.

*Art. 1408.* In nimio mensium profluvio eminet apozema sequens, *℞. Cort. aurant. N. viij. coq. in aq. font. ℥iij. ad ℥ij. colatura edulcetur cum sacchar. alb. dosis sit coch. x. ter quaterve in die.* Hoc medicamentum magno cum successu præscripti, præcipuè si nulla pars placentæ post partum vel abortum remanet. (*expertus laudo*) In nimio etiam mensium fluxu *pil. cathartic. cum opio* exhibere soleo; unde fluxus menstruus & ventriculi morbi diminuti sunt. *p. 41.*

Alia remedia.

*Art. 1409* "*Usnea cranii humani* ad fluxum sistendum a quibusdam multum laudatur; sed præ omnibus quotcumque mistura acida [*16. 191.*] cum vino Florentino copiose sumpta utriamque adimplet paginam, ut frequentissimè expertus sum. Sunt & alia quamplurima remedia; quæ sunt usus eximii in hoc affectu, uti *haustus japonicus, pulvis hæmoptoicus, tinctura rosarum, sotus ad hæmorrhoidum fluxum immo-*dicum, &c.

## FLUOR ALBUS.

## Sydenhami sententia.

Fluoris  
albi de-  
scriptio.

*Art. 1410.* Quod effluit modò album, modò pallidum, modò flavum; viride, aut subnigrum; modò acre & erodens, tetrum quandoque & graveolens; decoloratur facies; dolet spina dorsi, prosterinitur appetentia; oculi pedesque intumescunt. "*Animi moeror, gravis & diu protractus fluorem album frequenter producit teste Sylvio Deleboe.*"

Methodus  
curendi.

*Art. 1411.* Ut cura rectè incipiatur, instituenta est *vena-sectio*, & postea *catharsis* ad tres vi-

invigorandum corroborandumque omnino dirigenda sunt ; itaque ægra aggrediatur usum sequentium remediorum ; ʒi. Theriac. androm. ʒß. conserv. flaved. durant. ʒj. diascorid. ʒß. zinzib. condit. nuc. moschat. condit. ana ʒiij. pulv. e chel. cancr. comp. ʒß. cort. exter. granat. rad. angelic. hispan. coral. rub. præp. trochis. de ter. lemn. ana ʒj. bol. armen. ʒij. gum. arab. ʒß. cum q. s. syr. e ros. sicc. f. elect. de quo sumat ad magnitudinem nuc. mosch. major. ter in die hor. medicis per mensem integrum, superbibatque infus. sequent. coch. vi. ʒi. Rad. enul. campan. imperator. angelic. calam. arom. ana ʒß. sol. absynth. roman. m. rhub. alb. centaur. min. calaminth. vulg. salv. sicc. ana Mj. bacc. junip. ʒj. incidantur minutim, & infund. frigidè in vin. canarin. ʒiij. coletur usus tempore. Vescatur cibus eupeptis, & abstineat ab usu oleorum & fructuum qualiumcunque, & singulis passibus bibat vinum Hispanicum. Eadem serè methodo, atque iisdem remediis diabetes sanatur, omissis solummodo venæ-sectione & catharsi.

## Fulleri sententia.

Art. 1412. Fluorem album ab ulcere uteri & gonorrhœa scitè distinguere operæ pretium est. In fluore albo dantur plerumque lassitudo spontanea & lumbago gravativa. Humor effluens ut plurimum albidus, subinde flavescent, serosus plus minus puitosus, & mucosus, in mali initio inodorus & mitis; pedetentim verò acrescit, & exoriat. In ulcere dolor sentitur, & mordicatio in utero, vel ejus cervice, idque a principio; materia extillans est saniosa, cruenta, vel purulenta, alba, levis, æquabilis, & sæpè fœtida. In gonorrhœa acerrimus torquet urinæ ardor, & stranguria, quæ inter meiendum exacerbantur. Colluvies depluens est plerumque parcior, quàm in fluo-

Differen-  
tia.Ab ulcere  
uteri.A Gonor-  
rhœa.

re albo, crassior tamen multò alba primùm, postea flava, virescens, aeris, exedens, sed raro foetida. Pudendum mucosa quadam materia conspurcatur; & interdum etiam exulceratum deprehenditur. *Gonorrhœa* [ quod habet *Carleton de Catameniis*, p. 151. ] certò potest ab uterino fluore internosci, quòd prorumpentibus catameniis, non desinat, sed cum his, & mox ab iis sanatis persistat: *uterinus* verò *fluor* esset in mensium eruptione & aliquanto post tempore,

*Ettmulleri sententia.*

Qualis est  
morbus &  
quibus  
contingit.

*Art. 1413.* Fluor albus in initio plerumque est mitis, progressu verò temporis est aeris ac mordax, & a colore albo flavescit, vel viridescit, & graveolet; omnibus ætatibus contingit, puellis trium vel septem annorum natis, vetulis, &c. menstruatis & non menstruatis, ante & post mensium periodum, gravidis etiam; typum aut periodum certam nullam observat, sed nunc copiosius nunc paucius fluit, nunc menses comitatur, nunc iisdem cessantibus aliquamdiu persistat; *circa menstruationis tempus tamen uberius ante & post scaturit*. Nihil aliud est procul dubio quam *gonorrhœa muliebris*, virili non virulentæ analoga ex glandulis prostaticis effluens (de sede & ætiologia hujus morbi optimè differit Author noster.) Quod in naribus coryza, in oculis nimia lacrymatio, in faucebus tussis & screatus; talis est fluor hicce in foeminis.

*Curatio.*

*Art. 1414.* In curando hoc affectu exhibendum est vomitorium imprimis, & postea stomachica sunt propinanda, & cruditas cachectica corrigenda per chalybeata & volatilia, & postremò specificis morbus est profligandus; purgantia paucius administranda nisi rhabarbarum & mercurius dulcis; sudorifera & diuretica præcipuè in scorbuticis sunt profi-

proficua, maximè decoctum e lignis & terebinth. Decoctum e roremarino diutius continuatum hunc morbum sanat; decoctum nucis pinea cum ligno visci quercini sæpius haustum; item lamii flore albo pænè specifica audiunt; ut & ostecocolla (camphora teste Greenfield). "Electuarium ex visco arboreo (parum enim discriminis est in qua, lemuncque arborem crescat) cum q. s. albumini ovi & tantil. Syr. de Alth. larga dosi exhibitum diuque continuatum ex multiplici experientia fluorem album certò certius sanare comperit habeo. Vires mucilaginis haccarum, nondum expertus sum.

## Farrago sententiarum.

Art. 1415. Differentia inter fluorem muliebrem Gallicum & non Gallicum [inquit *Piscairnius* in MSS.] est quodd in Gallico humor sit tenuis & serosus plane; in fluore albo & non Gallico viscidus.

Art. 1416. Fluor albus etiamsi non sit virulentus [secus ac in viris] tolli non potest nisi remediis sui venereæ propriis. De curanda gonorrhœa vide [980.] ex MSS. *Piscairnii*.

Art. 1417. Remedia quoque sequentia quandoque in usu sunt; electuarium de colophonia, elect. styptic. emulsio styptic. haustus contra fluorem, haust. japon. haust. saturn. pil. ad colluviem, pil. saturn.

## FUROR UTERINUS.

## Sennerti sententia.

Art. 1418. Furor uterinus pertinet ad maniam, & peculiaris ejus species est. Fœminæ in infania illa venerem potissimum appetunt, vel ea non satiari possunt. Causa est semen nimis copiosum & præservidum.



Eutatio.

*Art. 1419.* Hic insanus amor curatur, si nimius feminis proventus prohibeatur, aut legitima venere evacuetur, vel medicamentis absumatur.

## CONCEPTUS &amp; GRAVIDITAS.

*Sennerti sententia.*

Concep-  
tionis si-  
gna.

*Art. 1420.* Conceptionis signa præcipua sunt ; retentio feminis in utero, suppressio menses, ciborum fastidium, ventris tumor versus ventriculum acuminatus, motus in utero perceptio, non fluctuantis aquæ, nec flatus vagantis speciem referentis, sed motus lenis, blandus ordinatusque, tandemque mammarum intumescens papillarumque color in lividum mutatus, & lac in mammis collectum : hæc signa si omnia adfuerint, non amplius scemina dubitet se esse gravidam. Urina est mendax. Vide plura sub titulo Mola [ 1426. 1429. ]  
“ Gravidam mulierem cognosces ( inquit *Hippocrates de superf.* ) si oculi cavi videantur, &  
„ album oculorum nativam non habeat albedinem, sed lividum sit ; necnon si cibum aversetur, oris ventriculi morfu torqueatur, & saliva abundet. Recensita signa ( ut rectè *Sponius* in locum ) sunt æquivoca, tam in gravida quàm in non gravida reperiri possunt : ex his itaque solis non licet medico graviditatem asserere, sed tantùm si cum aliis multis concurrant ; cumque intricatissima res sit graviditatis cognitio, caveat medicus, nè uno aut altero tantùm male fretus signo, temerè nimis suam de illa proferat sententiam : debet itaque tota signorum syndrome perpendi.

*Ettmulleri sententia.*

*Art. 1421.* Nonnullæ mulieres extra gravidationem libidine pruriunt, sed facta conceptione ardor videtur extinctus. Clausura uteri est signum conceptionis; exploranda est obstetricis digito. Signum conceptionis pathognomonicum non datur. Cuius post conceptionem mulieres frequenter sentiunt frigus quoddam vel horrorem vel horripilationem quandam circa corporis peripheriam; saltem mulieres dicunt se sentire nescio quid: hinc succedunt symptomata varia circa stomachum ac digestionem, vomitiones; pica, &c. venter sensim attollitur; maximè circa regionem umbilicalem & sursum, imprimis circa lineam albam prominet; regiones laterales quodammodo æquales, & quasi depressæ, quod probè observandum est.

*Art. 1422.* "Fœminæ nonnullæ, paucissimæ li-  
 „ cet, fluxum regularem menstruorum per totum  
 „ gravidationis cursum patiuntur, aliis eisque fre-  
 „ quentioribus ad quatuor vel quinque primos a  
 „ conceptione menses minore licet singulis vicibus  
 „ quantitate solent fluere; donec omnino sup-  
 „ primantur. Ordinario, si catameniorum fluxus  
 „ ultra quartum mensem diutius protrahatur,  
 „ fœtum imbecillum ac valetudinarium reddit,  
 „ si ultra sextum, mulier abortione periclitatur.

*Art. 1423.* Gravidatio a tumore hydropico ex signis sequentibus discernitur; color faciei vividus; vivacitas & vigor oculorum significant gestationem; in hydrope. verò perit oculorum nitor, &c. In gravidis tumor abdominis sursum vergit, estque inæqualis; contra in hydrope. Quo se vertunt hydropicæ, ed labitur aqua; sitis in hydrope est major; sentitur fluctuatio in hydrope; ephelides [ 1150. ] in facie apparentes est si-

Alia signa.

Nota b. g.

Quomodo  
distingui-  
tur ab hy-  
drope.

gnum ingravidationis . ( Gravidis facies ) inquit *Barbette* ( aut nativa est , aut valdè collapsa ; morbidis tumida plerumque & decolor . )

*Sterilitas.*

*Art. 1424.* " Quoad sterilitatem , Adhuc in tenebris ( inquit *Lister* ) sunt generatio & utriusque sexus virtutes : uteri qui sani & secundum naturam se habent , prolis quidem concipiendæ potes sunt ; at in quo consistit ista sanitas , quæstio est , Quando mas ( inquit *Estmullerus* ) emittit genituram ( debitæ consistentiæ ) largiter ; & quando nullum adest vitium conformationis , mas absolvitur , & vitium sterilitatis est in foemina , quæ mille modis potest impediri ,

## M O L A .

### *Sennerti sententia .*

*Mola quid*

*Art. 1425.* Mola est massa informis sine ossibus & visceribus ex imperfecta conceptione loco foetus genita ; aliquando una , nunc plures molæ excluduntur ; nonnunquam solæ , sine foetu , nunc ante , nunc cum , nunc post foetum , nonnunquam pluribus annis in utero gestantur . ( Mola nulli foeminæ accidere potest sine viri consuetudine . )

*Quomodo  
distingui-  
tur a vero  
conceptu .*

*Art. 1426.* Mola distinguitur a conceptione vera per motum : motus enim molæ est saltem tremulus & palpitans , non verd in omnem situs differtentiam , ut in vero foetu accidit : præterea si foemina de latere in latus convertitur , mola in latus , in quod decumbit , instar lapidis volvitur cum insigni ponderis sensu . Quinetiam foetus verus a mola discernitur a figura ventris , qui cum foetu præcipuè versus umbilicum attollitur & acuminatur , & versus latera utrinque molliter coarctatur ; in mola verd in omnem dimensionem æqualiter intumescit . Mammæ quidem in mola intumescunt .

me-

## CAP. XIV. Uterus Inflatus.

301

inescunt, sed lac verum in iis non generatur, sed cruda tantum materia a mensium suppressione. Molæ sunt periculosæ, si solæ sint; pluribus annis utero hærent, quibusdam etiam consenscunt; interdum verò nullum incommodum præter molestiam & pondus afferunt.

Art. 1427. Ad deturbandam molam ex utero, primo conducit *venæsectio*, deinde fortis *purgatio*, eaque repetenda, & ultimò *mensēs moventia* sunt exhibenda; & etiam quæ foetum mortuum vim habent expellendi, & secundinas retentas movendi; *pessus* quoque interdum usurpatur; his incassum tentatis ad *chirurgiam* deveniendum est. Interdum etiam accidit, ut foeminæ *varia monstra vivensia* præter & contra naturam generent, ut passim videre est apud autores practicos.

Molæ ex pulso.

Monstra.

### Estmulleri sententia:

Art. 1428. Ex liquorum & membranularum confusione sub primis gestationis mensibus oritur mola aquosa vesicularis ex pluribus membranaceis particularibus capsulis constata; "nempe ex hy-

„*datidibus* infinitis inter se connexis varia magnitudine, & vasculis sanguiferis plurimis in im-

„mensam molem, tactu mollem, & undique de-

„fluentem constare solet; hujusmodi *molam vesicularem* ipse vidi ex utero foeminæ exclusam,

„cum ingenti fluxu sanguinis; illa verò convul-

„luit, & alios liberos peperit.

Mola aquosa vesicularis.

## UTERUS INFLATUS.

### Estmulleri sententia:

Art. 1429. Uterus inflatus intumescit non solum ac in gravidis, & sensim augetur, menses si-

„mul supprimuntur, aut parcius fluunt, quin &

Uterus inflatus.

Mela ven-  
tosa.

lac in mammis generatur, unde tales se gravidas esse credunt; in hoc statu manent ultra gestationis tempus ad annum integrum vel diutius, & postmodum vel medicamentis, vel supervenientibus doloribus parturientium, vel interdum sine his excludunt ex utero solummodo aliquos *bombos* & *flatulentias*, & venter subsidet; unde hic affectus *mola ventosa* seu *flatuosa* appellatur a quibusdam: interdum vero sine manifesta talium flatuum eruptione insensibiliter flatus exhalant, & venter subsidet. Videtur fieri occasione geniturae maris sine conceptione in utero contentae. Tumor non prominet praecise in medio abdominis, sed in omnes dimensiones se expandit, nunc augetur nunc diminuitur; insignis tensio dolorque sentitur, pondus est minus, quam in conceptione legitima.

Quomodo  
flatus discutiendi  
sunt.

Art. 1430. Flatus uterum distendentes ejiciendi sunt aperto uteri orificio interno, item remediis internis fortiter *purgantibus* & *alterantibus* discutiendi sunt.

### Sydenhami sententia.

Excrescentia catnosa in abdomine.

Plautus.

Art. 1431. Sunt duae species tumorum abdominis hydropem mentientes foeminis familiares. Prima est *carnium* in partibus intra abdomen excrescentia praeternaturalis, quae ventrem in molem haud minus conspicuam attollit, quam solet inclusa aqua. Altera species *flatibus* ortum debet, qui non tumorem tantum; sed & alia ingravidationis signa pariunt, & veram conceptionem amulantur, tandem vero venter, pari quo increverat, gradu, sensim detumescens spem vanam eludit, (1429.)



## UTERI HYDROPS.

*Boerhaavii sententia.*

*Art. 1432.* In cavo uterino, clauso accuratè ejus ore interno, sæpè colligitur tanta aquæ copia, ut integrum abdomen mentiatur *ascitem*; morbus est difficulter cognoscendus ob signa fallacia *graviditatis*. ( 1423. ) Hydrops uteri.

*Art. 1433.* Curatur laxatione oris uterini per *fo- Curatio.*  
*menta, vapores, uterina adhibita, &c.*

*Ettmulleri sententia.*

*Art. 1434.* Uteri hydrops est tumor ejus aquo- Uteri hy-  
sus, qui foeminas decipit, ut se gravidas æsti- drops.  
ment; constat ex copiosa limpida aqua, rariùs crocea; interdum conjunctus est hic hydrops cum gravidatione vera ( quod ipse novi. ) Signa sunt fluctuatio, & delapsus a latere ad latus, indolentia tumoris pressi, insignis gravitas in vulvam incumbens “ & frequenter labiorum intumescen-  
tia œdematosa. “ Hydrops uteri discernitur ab ascite, si color faciei sit bonus, sitis nulla, tumor incipiat a parte inferiore, &c. Hydrope uteri post conceptionem correptis foetus inter aliquot menses abortu ejicitur. Observandum quod post fluxum aquæ intereant mulieres.

Quomodo  
distinguitur  
ab as-  
cite.

*Art. 1435.* “ Verus uteri hydrops est morbus Curatio.  
,, rarissimus; si cum foetu jungatur parum aut  
,, nihil tentandum est, nam partu incipiente aqua  
,, *hydropica* ultro effluere solet. “ In genere eadem remedia, quæ alias in *ascite* usurpari solent, hic locum habent, speciatim *elaterium cum mercurio dulci*, ut & *vomitória & clysteres acres*, item *uterum stimulantia*, ut *borax, crocus, extractum*

*sabina, castoreum, myrrha, &c.* Iniectiones uterinae ex decoct. mez. therma sulphurea, &c.

## HYDROPS OVARIUM.

*Sydenhami sententia.*

Hydrops  
ovarum unde  
oritur.

*Art. 1436.* Hydrops ovarii oritur ab obstructione in testiculorum alterutro, quæ sensim ejusdem crasin subvertit, ubi reposita morbi minera, tunica ejusdem mirum in modum distenditur; quæ jam tantum non crepante, natura humori excipiendo vesiculas quasdam suggerit, quibus tandem disruptis, & in abdominis cavitatem se exponantibus, eadem occurrunt symptomata ac in *ascite*.

*Boerhaavii sententia.*

Quibus  
accidit.

*Art. 1437.* Notabilis hydropis species ovaria mulierum sæpè occupat, qui morbus ut plurimum steriles annosæque mulieres obsidet, difficulter cognoscitur, & vix sine inciso cadavere; curatur verò nunquam, sed transit sæpè in *ascitem*.

Historia.

*Art. 1438.* "Fœmina innupta viginti quinque, circiter annos nata ventrem sensim intumescens, tem habuit anni spatio ad parturientis magnitudinem. Medicis, quos consuluerunt, gravitatis suspicio incidebat; obstetrices remota se habere audacter affirmabant; mulier ipsa insonantem accusare constanter instabat. Ego accersitus, certiorque de rerum statu, examine prius instituto, factus, illam *hydrope ovarii* laborasse, & morbum incurabilem esse, pronunciavi. Post septimanas aliquot mortua est; sectoque cadavere, vere in abdominis cavo invenimus aquæ coloris citrini sesquicongium; in infimo ventre tumorem

„ morem caput humanum æquantem ad hypoga-  
 „ strum dextrum aliquanto vergentem; *sinistrum*  
 „ tamen esse *ovarium* in adeo ingentem massam  
 „ turgescens, altero sano, statim agnovimus; in  
 „ superficie conspiciuntur nonnullæ *hydatides*, u-  
 „ na ovum anserinum æquans, reliquæ minores.  
 „ Tota moles septem pondo pendebat. Tumorem  
 „ facta incisione planè *strumosum* esse, & de spe-  
 „ cie *steatomatis* liquidò deprehendimus. Uterus  
 „ erat sanus, & in statu virgineo; glandulæ me-  
 „ sentericæ tumefactæ, tres reliquis insigniores o-  
 „ vum columbinum æquantes, strumosaque erant  
 „ de genere *Meliceridis*, Jecur & lien parùm di-  
 „ scolorata, non verò scirrhusa. In thorace aquæ,  
 „ illi in abdomine analogæ, libræ duæ repertæ  
 „ sunt, alter pulmonum lobus paulisper absum-  
 „ ptus; cor sanum; totum corpus valde emacia-  
 „ tum. In nosocomio D. *Thomæ* plusquam trigin-  
 „ ta abhinc annis cadaver fæminæ eodem morbo  
 „ defunctæ sectione patefactum vidi, unde justam  
 „ ac legitimam *diagnosin atque prognosin* præce-  
 „ dentis casus proferre mihi contigit.

„ Art. 1439. “ In transactionibus *Regiæ Societa-*  
 „ *tis Londini* N. 381. insigne & singulare exem-  
 „ plum habemus hujus morbi larga sectione cu-  
 „ rati per D. R. *Houstoun* in fœmina quinquæ-  
 „ gesimum octavum annum agente. Medici &  
 „ chirurgi locum videant.

„ Art. 1440. “ Hujusmodi quoque sunt *hydropsi-* *Hydrops*  
 „ *es enkistæ* Gallis appellati, sive *hydropes in ci-* *in cista*  
 „ *stis inclusi*. Integrum abdomen quandoque adimi- *inclusus.*  
 „ plent visceribus coarctatis, & in angustias de-  
 „ trusis, sacco ab ovario, vel partibus circa ova-  
 „ rium originem ducentes. Admodum curiosa est  
 „ historia hujus affectus apud *Du Verney Memoir.*  
 „ de l' *Acad.* p. 187. lectu dignissima.

## ABORTUS.

*Riverii sententia.*Abortus  
signa.Signa im-  
minentis  
& instan-  
tis abor-  
tus.

Prognosis.

Præcautio

*Art. 1441.* Abortus est immaturi foetus exclusio. Signa antecedentia sunt lumborum coxarumque gravitas insolita, & ad motum segnities, appetentia dejecta, rigor aut horror per vices recurrens, capitis dolor, præsertim circa oculorum radices, laterum ventrisque superioris constrictio, mammarum detumescencia & extenuatio; si verò dolores frequentes & ferè continui renes & lumbos excrucient, qui versus pubem & os sacrum exporrigantur, cum quodam ex utero egerendi conatu, certum imminetis abortus indicium est; si autem dolores illos & conatus sanguis purus vel serosus vel aqua ex utero profluens subsequatur, abortum instare, & disrupta vasa & membranas, atque os uteri apertum esse significat. "In genere, re quicquid foetui in utero mortem affert, id, abortus quoque causa est; quippe foetus emortuus citra corruptionem in utero diutius retineri nequit, & quanquam insolita quædam dantur exempla foetuum emortuorum in utero diu detentorum, ibique ferè consumptorum, hæc admodum rara sunt. *Deventer.* " *Arætaus* testatur se nullas vidisse servatas ex iis, quibus in abortu vel post abortum *convulsiones* supervenerunt. Abortus in primipara periculosior est.

*Art. 1442.* Ad abortum præcavendum maximo in usu sunt *radices tormentil. mastiches*, & *grana kermes*, circa *emplastra* hoc animadvertendum est, ea non diu esse gestanda, sed per intervalla removenda; alioqui diutius lumbis affixa renes addè calefaciunt, ut miseræ mulieres aliquando urinæ ardore afficiantur, vel arenulas aut sanguinem mingant.

*Art. 1443.*

*Art. 1443.* Mulier quædam, quæ tres abortus consequentes passa erat, a duobus mensibus gravida patiebatur dolores circa umbilicum & lumbos, qui abortum minabantur, *venæsectionem* imperavi, statim liberata est; sed eadem symptomata accesserunt eo prorsus tempore, quo menstruas purgationes pari consueverat extra graviditatem, ideoque iterata fuit *venæsectio* mense 3. 4. 5. 6. 7. & 8. recurrentibus doloribus, & tandem mense 9. peperit filium, &c.

*Venæsectio aliquoties repetita.*

*Estmulleri sententia.*

*Art. 1444.* Interdum per aliquot septimanas aut per mensem fit aquarum ex utero effluxus immaturus, quod periculosum est; metus enim est, ne fœtus moriatur; hoc verò aliquando evenit citra ullam noxam.

*Effluxus aquarum immaturus.*

*Art. 1445.* Ad abortum præcavendum commendatur *decoctum verben.* item *grana kermes*; ex regno animali *caneri fluviatiles*, *tinctura coral.* *succus cydon. citri*, *pulvis pelliculi ex ventriculo gallinarum exsiccat.* Externè *panis tostus vino generoso madefactus*, & aromatibus conspersus abdomini & lumbis applicatus. Abortus a serosa *cachexia* metuendus decocto *lign. guaiaci* optimè præcavetur.

*Ad præcavendum abortum.*

*Art. 1446.* Vomitus in gravidis, si diutius continuatur circa medium gestationis tempus, potius *phlebotomia*, quam aliis remediis compescendus est: ultimis mensibus est admodum periculosus, tunc blandè *laxantia* sunt exhibenda, & appropriata *stomachica*; externè *emplastr. stomachicum magistral.* " Vomitus in gravidis, (inquit *Hamilton*) quæ sitim excitat, & linguam aridam reddit, *leni catharsi* (viz. cum *pil. tartar. Quercetan.* ʒʒ. vel ʒij.) foelicissimè sanatur; propinari etiam debet *oleum amygdalarum dulcium*, p. 13. & 48.

*Vomitus in gravidis.*

*Farra.*



## Farrago sententiarum.

**Prognosis.** Art. 1447. "Quæ abortum consequuntur symptomata enixarum communia sunt; periculosior tamen est abortus quàm partus maturus; periculosior quoque est 6. 7. & 8. mense.

**Remedium singulare.** Art. 1448. Sequens est medicamentum Solenandri, ʒj. Mastich. thur. alb. ana ʒss. myrril. bol. armen. orient. lacrym. sang. dracon. ana ʒss. m. si pulvis ʒj. Hujus pulv. ʒj. infarciatur dactylus, ejecto nucleo ligneo, involvatur charta, madescat deinde vino clareto, & calefiat sub cineribus; deinde edatur. Hoc remedium in fluxu nido mensium, & etiam in foetu retinendo efficax esse experientia didici (inquit author) primum Bononiæ a præceptoribus edoctus.

**Alia remedia.** Art. 1449. Oleum. sem. lini contra abortum est singulare experimentum auctore D. Hamilton p. 42. In usu quandoque sunt emplastr. smectic. tabulæ embryonum (instar omnium) fetus astringens, fetus stomachic. electuarium contra abortum; mistura consolans, mistura acida, tinctura rosarum, &c.

## PARTUS DIFFICILIS.

**Termini parus.** Art. 1450. Experientia constat (inquit La Motte) mulieres alias aliis diutius foetum in utero gestare. Usitatissimus partus terminus ad finem nonni mensis accidere solet; nonnullæ verò mense 7. 8. 10. 11. immò, addit author, non ante integrum annum pariunt. "Ex observatione liquet in-  
", fantes 8. mense natos frequentius mori, quam  
", qui 7. nascuntur, quod valde obscurum est.

## Etmulleri sententia.

*Art. 1451.* Dolores parturientium legitimi & optimi sunt, qui continuè ex lumbis incipientes secundum abdomen deorsum protenduntur ad regionem pubis usque; hinc clunes & coxas occupant, & ita tremorem genuum inferunt, qui *spasmodum* est effectus. “ Si quando dolores ad pedes

Dolores parturientium legitimi.

„ & brachia tendunt, malè ominantur. Ex observatione constat quod foeminae, quae partum primum facile absolvent, de partu in partum difficilius habent, & saepe vel in partu vel in puerperio moriuntur, quo verò laboriosius pariunt primiparae, eo melius habent de partu in partum.

*Art. 1452.* Dolores nothi, qui foeminis aliquando accidunt sunt plerumque *colici*, *iliaci*, aut *hysterici*; at a veris parturientium distingui possunt; quandoque verò eum *veris* conjuncti sunt.

Dolores nothi.

*Art. 1453.* Non semper consultum est membranas discindere, & non faciendum, nisi indicia imminuentis partus sufficientia adsint, & foetus legitimum habeat situm.

De dissectione membranas.

*Art. 1454.* Tres sunt circumstantiae praeter reliquis, quae partum difficilem periculosum reddunt; foetus mortuus, haemorrhagia partum praecedens, aut convulsiones. Funiculus umbilicalis foetus frontem communiter cingit; quando verò aliquot gyris circa collum aliamve partem circumvolvatur, casus est periculosus.

Partus difficultatis causa.

*Art. 1455.* Situs foetus vitiosus est maximè periculosus, quando pedibus primò prodeit infans, ita ut etiam manus deorsum inclinent: Nam sic fit, ut egresso corpore orificium uteri internum circa collum se stringat, ita ut caput adhuc in utero hæreat (tales foetus dicuntur *Agrippae*;) ubi non potest emendari talis positura, obitetrix saltem alterutrum brachium eo dirigat, ut sursum versus ad caput vergat, &c.

Situs vitiosus.

*Art. 1456.*

Enema  
quandoq;  
injiciendū

Art. 1456. Alvo existente clausa, vel intestinis flatu turgidis *enema carminativo-emolliens* ad facilitandum partum omnē conducit, imō in ipso partu.

“ De agendis instante partu, & de officio ob-,  
stetricis ex sequentibus colligere licet.

*Stricturæ quædam breves perfectam obstetricandi artis ideam complectentes, maxime ex Deventerio deprompta, qui ultra omnes hanc chirurgiæ partem luculentissime tractavit, partus difficilis causas clarissime demonstravit & modum partus incommoda arte removendi significanter indicavit.*

Pelvis co-  
gnitio ne-  
cessaria.

Art. 1457. Cognitio ossium pelvem constituentium, ejusdemque pelvis figuræ obstetricibus imprimis utilis est, imō necessaria: aliter enim cæcutientes, temerè, & inconsultò auxiliatrices acturæ sunt; atque ut *distinctam pelvis ideam* concipiant; *Sceleton* iterum iterumque conspiciere debent; ubi observare licet in sceleto muliebri partes infimas ossium sedentariorum magis plerumque distare, neque adeo deorsum versus ossis coccygis acumen inflecti, quam in masculo sceleto, id quod sapientissimus atque benignissimus Creator ita constituit, ratumque habuit ad evitacionem plurium adhuc partuum difficultium, qui tamen satis frequentes sunt.

Figura &  
capacitas  
varia.

Art. 1458. Capacitas & figura pelvis in mulieribus varia est. Magni interest qualis sit pelvis forma sive conformatio in gravidis æque ac in parturientibus; linea recta est norma sui & obliquæ; ita pelvem bene formatam qui cognoverit, præavam dispositionem facile deprehendet. Pelvis in quibusdam est *nimis angusta*, in aliis *nimis ampla*, & patentior quam par est, in quibusdam denique non satis distantia intercedit inter ossa pubis & os sacrum ejusdemque appendicem os coccygis, hujusmodi *pelvis plana* dicitur. Omnes hæ  
pelvis

pelvis pravæ formæ diversa incommoda afferunt in praxi occurrentia.

*Art. 1459.* Obstetrices inexpertæ tangentes foeminam digitos in vaginam recta protendunt secundum longitudinem foeminæ, & hoc pacto offendunt ossis sacri curvamen, unde digitis resilientibus ore uteri non invento confunduntur; sed ex constructione pelvis luculenter patet (quod probe animadvertendum est) *cavitatem ejus longitudine suâ non secundum longitudinem spinæ dorsî tendere, sed ab imo oblique anticam versus ascendendo progredi, quasi per eam umbilicum ventris attingere velis*: quare quærentes os uteri non recta versus curvatum os sacrum digitos intendere debent, sed ab imo sursum tendere, quasi per muliebria *umbilicum* attingere velint.

Sicut ossis  
uteri.

*Art. 1460.* Uterus & vagina sibi invicem coadunata sunt, uterisque qua in acutum terminat parte, prope ipsius os, in vaginam intrusus est, vel acuminatus prominet; ita ut in foeminis non imprægnatis, immo & prioribus graviditatis mensibus, *tactu percipiatur acuminatus*: at in partu os pariter cum utero laxatum adeo & extensum est, ut vagina cum utero videatur *unicum quasi utrem* constituere; orisque uteri & vaginæ differentia sentiatur nulla, nisi quod vagina tenuior molliorque; Os vero uteri callosius sit, nec tum *acuminatum* quid tactu percipiatur. Ex hac rerum mutatione, si opus fuerit, optimè conjecturare licet *propinquitatem & longinquitatem temporis pariendi*; certum autem tempus inde infallibiliter præfiniri non potest.

Quomodo  
se habet  
ante & in  
partu.

*Art. 1461.* Certissimum est veras difficillimorum partuum causas non adeo dependere a *pravis positionibus* infantum in utero quam a *perverso ipsius uteri situ*. Quo majorem gravidæ foetum gestant, eo altius uterus in ventrem assurgit, cum enim *cavitas pelvis non sufficiat ad capiendum prægrandem*

Uteri pos-  
sitionem va-  
riam.

dem uterum, uno vel pluribus infantibus ex omni parte absolutis una cum secundinis & humoribus repletum, exindè neecessario sequitur, ultra oram pelvis in cavitatem ventris, uterum ascendere; atque tum posituram naturalem aut retinet, aut non; si retineat, vocatur *uterus rectus* & *bene situs*, atque tunc acuminata ejus pars recta tendit in cavitatem pelvis, fundus vero circa umbilicum versatur; Positura autem mutata, huc vel illuc aliquantulum inclinatus *uterus obliquus* vel *pravè situs* appellatur, quorum insigniores sunt quatuor; *primus*, quando os uteri nimis suspensum ab antica parte ad ossa pubis adigitur, & infans capite in ossa pubis facile impingens hæret immobilis, aut quod deterius est, capite super ista ossa transfertur. *Secundus* pravus uteri situs est, quando in ventrosis mulieribus uterus pronus propendet, ore ad os sacrum converso. *Tertius*, quando fundus uteri in latere sinistro paulo altius vel demissius ponitur, ore ad spinam dextri ossis ili vel pubis converso; huic contrarius est *quartus* & *ultimus*. Ex his & hujusmodi obliquis uteri posituris oriuntur partus difficiles, unde matris vel infantuli utriusque interitus sequitur, nisi solertis obstetricantis opera serventur.

Uteri descensus  
ante puerperium.

*Art. 1462.* Aliquot diebus ante puerperium prægnantis venter aliquantulum extenuatur, quod tunc temporis bene situs infans in cavitatem pelvis *prone capite delabitur*, quod felicis partus est præsagium: Infans enim pravè situs vel uterus obliquatus in cavitatem pelvis hæud ita promptè illabitur. Sed isthæ descensio plerumque gravidis *aliquid incommodi* affert siue eundo, siue mingendo, siue deijciendo, siue hæmorrhoides produciendo, &c. Scilicet a pressione capitis infantis, immò interdum muliebria intrumescere facit. Hæc incommoda non facile nisi post partum evanescent.

Signa instantis partus.

*Art. 1463.* Tandem tempore partus jamjam imminet.



minente dolores lumborum ac inguinum cum *vi deprimente* per vices ingruentes sentiuntur, & humor aliqualis glutinosus profluit; qui, cum rubescere incipiat, certissimum partus indicium est. Callida obstetrix genuinos dolores a spuriis *tactu facile dignoscat*; hi enim os uteri arctius constringunt, genuini verò illud dilatant. Adest insuper sanguinis vehemens commotio, faciei rubor, concussio & tremor totius corporis, maximè genuum, aliis concitatur vomitus, &c.

*Art. 1464.* Partus naturalis (ubi scilicet recta datur uteri ac infantis positura) est, qui *solanatura vi* sine arte vel alieno auxilio perficitur, obstetrice haud indigens, nisi ut infantulum excipiat, & funem umbilicalem abscindat &c.

Partus  
naturalis.

In quibusdam verò maxime in mulieribus an-  
nolis res non adeo facile expeditur. Ideoque in-  
stante partu, obstetrix, ut laboranti opem quam  
maximam ferat, altera manu in vaginam immis-  
sa & dorso conversa, digitorum apices quousque  
potest, subter caput infantis insinuet, cautè ta-  
men, manum ibi tenens immotam, donec dolor  
irruat: alteram manum extrinsecus, abdomini im-  
ponat, super fundum uteri; deinde doloribus ir-  
ruentibus ipsa simul incipiat utraque manu coo-  
perari; manu scilicet intra corpus deprimat con-  
tra ossis sacri acumen, quod retrorsum premen-  
dum est; altera manu extrinsecus uterum deor-  
sum leniter premat. *N. B.* Maxima apertio &  
amplificatio pelvis, qua pateat foetui via, a re-  
trocessu ossis sacri vel totali vel quoad acumen ejus  
sive ossis coccygis expectanda est. In ipso parturiendi  
articulo, præcipuè *pelvi plana existente*, optimum  
ad partum facilitandum adjumentum datur *osse coc-*  
*cygis* fortissimè detrudendo, idemque singulis do-  
lorum paroxysmis irruentibus repetendo.

In difficili  
partu quo-  
modo par-  
turians  
adjutanda  
est.

*Art. 1465.* Ad partum felicem facilemque re-  
quiruntur dolores naturales, suo tempore & mo-

Dolores  
naturales  
& genuini

Dolores  
tergiver-  
santes.

do, *instar nimbi irruentes*, quibus ventris & intestinorum muscoli adstricti tantam depressionem impetumque in uterum faciunt, quasi a corpore expellendus esset; atque horum dolorum impulsu aperitur uterus, foetusque in ostium expellitur & mulier partum edit: hi verò dolores quandoque *pravi vel irriti* sunt, quos vocant aut vocare possunt *feroces aut tergiversantes dolores* quodammodo irruentes quidem sed non penetrantes, neque veram depressionem facientes, sed tandem re infecta cessant, ac in cruciatum aut spasmus laborandique impotentiam mutantur. In hujusmodi tergiversantibus doloribus medicamentis propellentibus non est utendum, quia exinde cruciatus ingraveſcunt; sed contra lenientibus & anodynis.

Parturiens  
tactu ex-  
ploranda.

Art. 1466. Obstetrix parturienti advocata, habito brevi examine, illam sine mora *tactu explorare* debet, tactus autem fit duobus prioribus digitis, ut eo melius singula sensu distinguantur. Ex quo cognitionem *situs uteri* assequetur: certior facta erit, an os uteri situm sit *super mediam pelvim*, an *in antica ad ossa pubis*, an *in postica ad os sacrum*, an *in dextro*, an *in sinistro latere*, an *os uteri apertum sit*, & *quam late pateat*, & *quid in eo prævium exhibeatur*, *caputne an aliud membrum*, seu *aquæ protuberantes*. Si os uteri sit in media pelvi & vertex infantis in ostio oris uteri, tunc nullo negotio opus est, & solum expectandum, dum natura parturientem dolorum impetu ad laborandum concitet.

Indicia  
partus dif-  
ficilis.

Art. 1467. Sin vero, ore uteri in pelvim directo, obstetrix tactu nec caput, nec nates possit sentire, nihil in ostio se exhibente præter aquas quæ coeperunt extuberare, isthæc *partus difficilis* indicia sunt, & obstetrici incumbit non otiosam esse, & nisi habilis sit *ad peritum chirurgum obstetricantem* confugiendum est; infans enim transversus prodit, quare mox post *aquarum effluvi-*  
um ca-

CAP. XIV. *Partus difficilis;* §15  
in caput in ostium producendum est, aut infans  
pedibus extrahendus.

Art. 1468. Si loco capitis altera solum manus, pes, genu, cubitus, vena umbilicalis, aut manus una cum pedibus prodeant; idem periculum imminet. Si podex prævius exhibeatur; tunc minus periculi, siquidem infans cum valentioribus doloribus complicatus excludi potest, at vero si obstetrix egregiè callet artem, *sub aquarum effluvi- am* infantis situm faciliè mutare potest, pedesque in ostium producere, unde facilius adhuc enixus. Si pes unus prodeat, alter adjungendus est; aliter metus est; ne *coxa luxetur*.

Art. 1469. Si obstetricis tactu deprehendatur; quod os uteri super mediam pelvim non situm sit, sed in antica in ossa pubis, aut in postica ad os sacrum, aut in latere ad ossa coxendicis nimis conversum sit; grave periculum imminet, præcipuè *quanto magis uterus a recta positura declinat*; tunc a natura enixus non sperandus est; cunctatio nihil commodi sed multum mali inferre potest; ideoque maturato opus est; istiusmodi enim uteri positura mortem afferre solent infanti, & parturienti etiam, *si soli natura id negotii committatur, aut non nisi vulgares suppetiæ ferantur*. Partus experto chirurgo excludendus est; periculum subinde ingravescit, opera fit difficilior; cruciatus parturientis aggravantur; viresque ad ferendos dolores deficiunt; cunctando remisque velisque plenissimis in discrimen fertur parturiens, sed maturata partus exclusione periculum subterfugit.

Art. 1470. Licet uteri positura sit percommoda; *si fœtus in illo prave sese versat*, difficilem partum sequi necesse est: & vice versa utut infans recte ad exclusionem situs sit; uteri tamen perversa positura partum dabit difficilem, major difficultas pariendi e prava hac uteri positura resul-

Prava huius  
fantis pos-  
itio.

Positura  
uteri ta-  
ctu explora-  
tanda.

Difficul-  
tas ex ma-  
la uteri  
positura  
& ex pra-  
vo infan-  
tis situ.

tat, quam a pravo infantis situ, sed maxima omnium adhuc & ferè insuperabilis difficultas *ex ambobus simul conjunctis exoritur.*

Nota bene.

*Art. 1471.* Utero denique seu rectè seu plus minus obliquè posito, si aquis effusis, membrum aliquod (sive manus sive pes, &c.) exclusum sit, id indicat partum confestim ac sine mora excludendum esse.

Vis Uteri contractiva.

*Art. 1472.* Mirabilis est vis uteri contractiva, instante partu; cum aquæ effluxerunt, illicd uterius decrescit, & strictè adeo coangustatur, ut infantem compressè concludat; quare mox post defluvium aquarum infantem excludi necessum est. *vel partus difficilis expectandus est.* Si foetum exclusum non statim secundina sequitur, fundo adhuc adhærens, uterus mox contrahitur, & nisi quid sanguinis concreti remanserit, post aliquot horulas non nisi multo labore potest recludi ad secundinam extrahendam. Partu jam edito, & secundina exclusa, si manus aliquamdiu in utero retineatur (quod obstetricantium est officium) sentiet uterum circa manum *contrahi & occludi*, quod semper evenit nisi corpus quoddam heterogeneum contractioni obstat.

Quid faciendum sit partu excluso.

*Art. 1473.* Quocirca potius ab exclusione infantis *manus utero immittenda est* extrahendæ secundinæ causa; quoniam, si hoc sit sine mora, sine ullo puerperæ dolore vel incommodo fieri potest ore uteri adhuc patente; hoc modo puerperium tutissimè ac certissimè penitus absolvitur; ex hoc enim optimo scrutinio obstetrix certior facta est, non solum an secundina libera sit vel cohæreat, & num unus adhuc vel plures infantes adhuc vivi vel mortui restent, vel si quid alienum excludendum sit, sed etiam num frustula quædam secundinæ, aut membranarum residua sint in utero aut sanguinis grumi, &c.

Precautiones.

*Art. 1474.* In pelvi *ampliore* periculum est, ne inter

inter parturiendum uterus ipse vel vagina ligamenti nimium laxatis *una cum fœtu prolabatur* : ad hoc grave malum præcavendum obstetricis est diligenter operam navare manibus suis os uteri fortiter sustinendo.

præcavenda est.

Art. 1475. Si funiculus umbilicalis solus, vel cum manu, cubito, humero vel genu prodeat obstetrici accurate observandum est *momentum effluviū humorum* ut immediatè manu immissa in situm infantis inquirat, secum dijudicans, an consultius sit caput in ostium dirigere, aut infantem pedibus extrahere; & quod tutius censet & commodius, efficiendum: præstat enim infantem sine mora *pedibus extrahere*, quàm capiti in ostium dirigendo diutius immorari, & nihilominus vel tandem ad pedes quærendos necessitate adigi.

Effluxus aquæ urgentes est partus.

Art. 1476. In genere in qualicunque uteri obliqua positura, vel infantis prava versione methodus tutissima, promptissima, minusque dolorifica, partum accelerandi est *infantem pedibus extrahere*, idque in principio laborum; mox post effluviū aquarum, quamprimum constat parturientem genuinis parientium doloribus laborare: hoc pacto plures mulieres ac infantes aliter perituri servarentur.

In omni fœtè difficultate tutior methodus est infantem pedibus extrahere.

Art. 1477. Parturientibus solenne est vel *clysterem emollientem* adhibere ad intestina crassioribus excrementis exoneranda, & meatus laxiores reddendos, vel nonnunquam *stimulantem*, ut pigri dolores excitentur. Insuper nonnulli chirurgi obstetricantes maximè commendant *syphonem*, quo inter labores oleum in internos corporis meatus quaqua versum injiciatur, sed hoc tanquam necessarium non est judicandum.

clysteris usus.

Art. 1478. Instrumenta ad partum educendum quod attinet; rarissimè dicam? immò ne unquam quidem usui esse possunt, præterquam

instrumenta.



infantibus incuria neglectis, vel monstris excludendis.

Infans in  
utero mor-  
tuus.

*Art. 1479.* Pro certo cognosci vix potest vivine an emortui sint infantes in utero: ex tactu maximè signum omnium certissimum obtinetur, viz. *cuticula capitis supremæ dissolutio*, quæ non nisi post obitum infantis contingit.

Infanti-  
bus ma-  
gnis hæ-  
morrhæ-  
giis foetus  
exclusio  
artè præ-  
standa est.

*Art. 1480.* Prægnantes quandoque ex vehementi animi affectu, casu, collisione vel nimia extensione hæmorrhagia faciliè corripuntur, quæ *profusiva immodica & continua* ex avulsione secundinæ oriuntur, nec sisti possunt, adeo ut sanguis conglobatim distillans deliquia tandem inferat, & nisi foetus excludatur, convulsiones sequuntur, & mors; quocirca in hoc casu extrema non expectanda, sed in tempore *foetus extrahendus est*.

Foetus  
mortuus.

*Art. 1481.* " Inter signa foetus mortui in utero  
,, ab auctoribus recensita certissimum ( inquit *Ba-*  
,, *glivius* ) & ferè infallibile est *Tenesmus*, sive  
,, crebra voluntas sæces deijciendi mulieri super-  
,, veniens. Puerperæ sæpiùs inopinatè moriun-  
,, tur, ( inquit *Vvaldschmidius* ) quatenus ob ni-  
,, mium parturiendi conatum aneurisma internum  
,, rumpitur, & sanguis in cavitatem nobiliorem  
,, effunditur, cujus causam sæpè non cognoscunt  
,, adstantes & medici, nisi post mortem aperto  
,, cadavere.

Aneuris-  
ma inter-  
num.

Remedia  
pellentia.

*Art. 1482.* Non conveniunt remedia *pellentia* nisi in partu naturali, in præternaturali ab iisdem abstinendum. Præter remedia usitata ad partum facilitandum, & foetum pellendum commendatur decoctum *stercoris equini* item *aurum fulminans*, tanquam singulare & ultimum remedium; *pulvis testiculorum equin.* a practicis laudatur. *Sternutatoria* aliquando foetus exclusionem adjuvant. In casu desperato, foetu mortuo, *vomitória fortiora* sunt exhibenda, privatim *mercurius vitæ* ad expellen-

CAP. XIV. *Secundina retenta.* 519  
 pellendum foetum. Quidam exhibent *ol. succin. a*  
*gt. xii. ad xxx.* usurpantur etiam quandoque *balnea*  
*emollientia & laxantia, mistura hysterica spirituo-*  
*sa, trochisci hysterisci, trochisci de myrrha, &c.*

## SECUNDINA RETENTA.

*Vvaldschmidii sententia.*

*Art. 1483.* Obstetrices & adstantes sapientius ni- Secundina  
retenta.  
 mis indulgent parturientibus, easque post enixum  
 partum e sella dimittunt, utut *secundina* nondum  
 extracta sint; verum in eo errant gravissime,  
 quandoquidem parturiens nunquam dimitti vel in  
 lectum deduci debet, nisi prius secundinas reddi-  
 derit. Hæ autem tutius ac commodius manu pe-  
 rita ab utero divelluntur, & extrahuntur; ubi fu-  
 nculus umbilicalis, qui indicis loco est, recens  
 adhuc est: Quod si orificium uteri jam clausum  
 sit, debet apice unius digiti iterum aperiri, &  
 digitus prudenter circumduci, donec & alter inferi  
 potest; Jam si digitos ad fundum uteri usque ex-  
 porrigere possis, querendus est locus, ubi *secun-*  
*dina* utero adherent, & digito inter uterum &  
 placentam inserto cautè hæc divellenda; caven-  
 dum verò ne forte ipsum apprehendas uterum,  
 quem facile dignoscas, cum placenta ob vasorum  
 congeriem admodum inæqualis & durioris sit su- Sympto-  
mata se-  
cundinae  
retentæ.  
 perficiei. “ *Secundina retenta* brevi post putrescit,  
 „ hinc febris & dolor ventris insignis & tormina  
 „ infra umbilicum circa uteri regionem superve-  
 „ niunt; sin frustulati prodeat, aliquando cru-  
 „ delem hæmorrhagiam excitat, adest difficultas  
 „ anhelitus, halitus foetens intolerabilis, lipothy-  
 „ mia, & tandem convulsiones. Quæ per geni-  
 „ talia excernuntur, post aliquot dies sunt saniosa,  
 „ & horrendè foetida, unde etiam lochia foeto-  
 „ rum cadaverosum referentia partem secundina-

Remedia  
pellentia.

„ rum in utero relictam indicant, quæ successivè  
 „ sub putrilaginis forma ex utero effluit.  
*Art. 1484.* “ Remedia secundinas pellentia ea-  
 „ dem ferè sunt ac ea quæ in partu difficili &  
 „ foetu mortuo usurpari solent, speciatim *pulvis*  
 „ *secundin. human. præp.* item *pulvis sabin.*  $\mathfrak{ss}$ .  
 „ *cum croc.*  $\mathfrak{ss}$ . & *oleum succin. borax, castore-*  
 „ *um*, &c. Euporiston vulgare pro usu externo  
 „ est cataplasma *ex sem. lini in oleo lini coct.*  
 „ De injectionibus & pessis vide locum p. 1128.

## LOCHIA.

Etmulleri sententia.

Lochio-  
rum flu-  
xus ratio.

*Art. 1485.* Post partum uterus denuò fibrarum  
 suarum beneficio se contrahit, sicque spongiæ in-  
 star compressæ liquores contentos exprimit, un-  
 de purgamenta seu lochia succedunt. Effluit pri-  
 mò sanguis ferè purus, hinc dilutior, & postre-  
 mò materia mucosa alba: quantitas & tempus  
 durationis hujus purgationis varium est; nonnul-  
 læ ad dies quindecim purgantur, aliæ ad octo so-  
 lummodo.

Sudor.

*Art. 1486.* Sudor puerperis est proficiuus usque  
 ad diem septimum vel nonum; & si hoc eveniat,  
 incolumes sunt, aliter vix sine febre aut aliis gra-  
 vioribus symptomatibus puerperium transigunt,  
 sed cavendum est, nè *nimius sudor* lochiorum flu-  
 xum sistat.

Cautela.

*Art. 1487:* Cautus sit medicus; nè turbet mo-  
 tum naturæ, cum lochia per aliena loca excern-  
 untur; fit enim aliquando cum euphoria. “ Si  
 „ quando cum lochiorum suppressione sanguinis  
 „ perturbatio insignis cum vomitu siti & vigiliis  
 „ adfuerit; sæpè *laudanum croco* admistum cum  
 „ foelici successu exhibitum novi ( inquit *Vuilli-*  
 „ *fius.* ) Dolentibus mammis post partum lactis

Delochio-  
rum sup-  
pressione.

causa

CAP. XIV. *Dolores post partum.* 521

„ causa, lochia supprimuntur frequentissime; re-  
 „ mittente mammarum dolore lochia libertati re-  
 „ stituuntur, ut rectè observavit *Baglivius*.

*Art. 1488.* Ad lochiorum fluxum promovendum Remedia  
ad fluxum  
promove-  
dum.  
 conducunt sequentia, ex *myrrha preparata*, *cro-*  
*cus*, *borax*, *castoreum*, *radix zedoaria*, *antimo-*  
*nium diaphoreticum*, *sperma ceti* ad sanguinem  
 fluidum reddendum in symptomatibus gravioribus,  
*laudanum*, *emmenagoga omnia*, *aristolochia* ferè  
 præ cæteris foetum mortuum secundinas, & lo-  
 chia, potenter movet.

*Art. 1489.* Ad fluxum lochiorum nimium con- In fluxu  
nimio.  
 ducunt *cydoniata*, *tinctura* & *syrupus e coralliis*,  
*lapis hamatilis*, *crocus martis astringens*, *blanda*  
*acida*, *trochisci de carrabe*, *Alumen ad ʒj. in con-*  
*serv. ros. rub.*

## DOLORES POST PARTUM.

### *Ettmulleri sententia.*

*Art. 1490.* Dolores post partum sunt quasi te- Remedia  
ad dolores  
post par-  
tum.  
*nesmus uterinus*, & cum vehementiores sint, flu-  
 xum lochiorum impedire solent. *Herb. chærefol.* &  
*sperma ceti* à practicis valdè laudantur, & præ-  
 cipuè *oleum amygdalarum dulc.* item *decoctum flor.*  
*chamæm.* *antihysterica*, & *nervina* (*anodyna* cum  
 cautela adjunctis *antihystericis* & *croco*) “ *Tin-*  
 „ *ctura succini* cum aq. *cinnamon.* extracta &  
 „ cum *exigua cinnamon. quantitate* temperata  
 „ est specificum (inquit *Baglivius*) egregius et.  
 „ iam est *bolus ad casum*. Cepæ cum vino co-  
 „ ctæ, & postea cum oleo in sartagine frixæ,  
 „ contusæ, & supra ventrem calidè more cata-  
 „ plasmatis applicatæ statim dolorem sedant. (in-  
 „ quit *Bayrius*.)

DE ACCIDENTIBUS QUIBUSDAM ALIIS,  
quibus aliquando obnoxia sunt gravida  
& parturientes.

*Etmulleri sententia.*

Tumores  
œdemato-  
si.

*Art. 1491.* Gravida aliquando circa labia pudendorum œdematosè intumescunt; in tali casu foris discutiens ex *calce viva* est egregius, teste *Lyfero*. Item convenit fons ex decoct. *fol. cham. & sambuc.* in vino & aq. (vel potius in vino & *lixivio ten. coct.*) item *flor. melilot. & sem. sænagr.*

Alia acci-  
dentia.

*Art. 1492.* In pudendorum excoriatione vel ruptione prodest *oleum hyperici & rosar. cum. ovis contus.* In fissuris *decoctum raparum* aut linimentum sequens, *℥. cer. alb. ʒß. ol. amygd. dulc. ʒj. balsam. peruv. ʒiv. M.* De ruptura *Perinæ* & curatione per suturam vide locum p. 1140. "*Ruptura Perinæ* est malum miserabile & valdè molestum, & si non tempestivè curatur, admodum indecorum futurum: ideoque obstetricis est officium (quandocunque istud infortunium acciderit) rem non celare, (uti pessimus mos obtinuit) sed statim auxilium *periti chirurgi* advo- care, ut partes disruptæ futura, ut artis est, conjungantur.

De lacte  
fugando  
& mam-  
marum af-  
fectibus.

*Art. 1493.* Ad lac fugandum applicetur mam- mis *emplastrum de cicuta*, lac imminuet, & indurationem prohibebit, item *diachyl. simpl.* & emulctio lactis in *ferrum candens*. Solenne est, etiam mulierculis *lindea duplicata spiritu vini*, *intincta* axillis supponere in eundem usum. " In genere in omnibus mammarum affectibus mam- milla affecta rardè ad sanitatem perducitur, nisi altera sana lacte exsicce- tur. Inflammationes mam- marum rarissimè discutiuntur; aqua *calcis vivæ* si quæ



si quæ alia [ forsan cum sale armoniaco ] inflammationem resolvit, & discutit; prodest etiam *cataplasma ex farinis, emplastr. e spermate ceti, de cicuta*, &c. De tumore duro indolente scirrholo periculum est, ne in cancerum degeneret, *discutientibus & penetrantibus* tractandus est, ut *empl. de vanis cum mercurio, de cicuta cum ammoniaco*, &c.

## FEBRIS LACTEA.

*Etmulleri sententia.*

*Art. 1494.* Circa tertium vel quartum a partu <sup>Febris lactea facili-  
limè cura-  
tur.</sup> diem supervenire solet febris, quam vocant *lacteam*, biduum vel triduum durans, dum lac perfectum in mammis generetur. circa septimum aut nonum a partu diem sudore blando terminatur, & raro sub praxin medicam cadit. *Pulveres testacei*, & *blanda diaphoretica* indicationi satisfaciunt; promovendus est quoque *lochiorum fluxus*, eodem tempore, si non sufficienter fluant.

*Art. 1495.* In omnibus febribus acutis & malignis puerperarum respiciendum est ad *lochiorum fluxum*, & ad symptomata in primis viis. Admodum periculosa sunt hæ febres, nisi statim in principio diarrhœa, lochiorum fluxu, aut simili evacuatione solvantur. In specie tinnitus aurium & gravitas capitis tertio aut quarto die supervenientes generis nervosi symptomata graviora innuunt; quibus si accedant summa præcordiorum anxietas, respiratio difficilis cum pulsu debili & inæquali, res desperata est.

*Art. 1496.* In his febribus summa habenda est <sup>Curatio.</sup> ratio lochiorum; nam si suppressa fuerint, fluxus eorum est provocandus; si verò non amplius fluant, & antea ritè fluxerint, febres hæ, *ut aliæ*, curandæ sunt: Puerperarum febres sunt plerumque

que malignæ; in quibus *sal volat.* CC. *succini*; *cinnabaris antimonii*, *antihæcticum Poterii*, *tinctura coral.* &c. sunt valdè proficua.

## FEBRIS MILIARIS.

*Hamiltoni sententia.*

Ratio not  
minis, &  
accurata  
morbis de-  
scriptio.

*Art. 1497.* Febris miliaris a pustulis sive vesiculis seminis milii speciem referentibus nomen accepit; febris *vesicularis* etiam appellari potest. Vesiculæ primò sunt plenæ sero limbo deinceps subflavo, perlarum colore non abssimili. Hæc febris est specie duplex, viz. *simplex*, quoties hæc pustulæ erumpunt solæ; *composita*, cum pustulæ papillares rubræ miliaribus sunt interspersæ, quæ ubi solitariae sunt, vulgò appellantur a *Rash*. Hanc febrem sæpè comitantur dolores colici, nephritici, pleuritici, rheumatismatici, vel parturientis æmuli; nec non oppressio pectoris cum depressione spirituum, vigiliæ & spirituum commotio a *Hurry in the Head* vulgò dicta, quoties ægræ ad somnum se componunt, pulsus frequens & debilis, &c. Hæc pustulæ plerumque in pectore, collo & digitorum interstitiis, interdum etiam in toto corpore sunt conspicuæ. Difficillimum est eruptionis diem assignare; quantum autem assequi possum, eas opinor decimo aut undecimo die a principio plerumque pullulare; si modò febris habet progressum regularem; & circa decimum octavum, vel, ubi materia morbifica abundat, circa vigesimum primum vel secundum diem desiccare.

Puerperis  
frequenter  
accidit.

*Art. 1498.* Est morbus usitatissimus in puerperis [vocatur ab *Ettmullero febris purpurata* pag. 401.] a primo calore interno vel dolore ante partum, ad eruptionem a partu, frequenter dies non undecim. In puerperis hac febre correptis diar-  
rhœa

# CAP. XIV. Delirium in puerperio: 323

rhœa est symptoma periculosum eruptionem & lochiorum fluxum impediens. Respiratio difficilis, vox faucibus hærens, & linguæ tremor, præcipue dyspnœa nervosa periculosa sunt.

Art. 1499. Ad curationem quod attinet, *testa*. Curatio cœa sunt exhibenda, quæ calorem foveant medicamentum, simul & edulcorant, & diaphoresin promoveant; *vesicatoria* sunt applicanda alia post alia per totum ferè morbi decursum. ℞. *Sperm. cet. pulv. e chel. cancer. comp. ana* ℥j. *croc. gr.v. syr. paralyf. q. s. m. f. bolus* sexta quaque hora sumendus. Spirituum defectus & pectoris oppressio cum suspiriis sunt hujus febris signa pathognomonica. *Antimonium diaphoreticum* est medicamentum ad pustulas militares emittendas; nec non ad levandum delirium a me sæpissimè comprobatum dos. ℥j. sexta quaque hora.

## DELIRIUM IN PUERPERIO.

Art. 1500. " Delirium in puerperis est symptoma gravissimum in morte sæpissimè desinens, <sup>Delirium in puerperis.</sup> vel in maniam diuturnam aliquando perpetuam transiens.

Art. 1501. " Remediis internis fluxus lochiorum, si opus sit, est sedulò promovendus; tibis applicanda sunt *emplastra epispastica*, & plantis pedum cataplasma sequens, ℞. *Capit. papav. cum seminibus contus. ℥iv. sal. armoniac. ℥ss. stercoris bovis recent. ℔j. sp. vin. q. s. m. f. cataplasma.* Curatio

## UTERI PROCIDENTIA,

*Ettmulleri sententia,*

Art. 1502. Uteri procidentia vel magis propriè prolapsus sinus pudoris, seu vagina in initio <sup>Uteri procidentia.</sup> est tan-

est tantum exiguus tumor foras propendens inter pudendi labia, in maiorem molem condescere solet ad magnitudinem ovi anserini, aliquando capitis infantis, & ad genua usque propendens; interdum ulceratur; immo gangrænescit. Ortum plerumque ducit a fluore albo vel a partu difficili, vel ab impetu obstetricis; hæc postrema est ferè incurabilis.

*Curatio.*

*Art. 1503.* Pars prolapsa convenienter in situm naturalem reponenda est; *fotus astringentes* sunt usurpandi in *vinò rubro* & *aqua ferrariorum decoct.* quemadmodum in ano prolapso [1323.] item *fotus metroproloticus* Sydenhami sequens; *℥i. Cort. querc. ʒi. coq. in aq. font. ℥iv. ad dimid. sub finem addendo cort. granat. contus. ʒi. flor. rub. granat. ana Mij. deinde add. vin. rub. ℥ss. colatura sit pro fotu.* “*Pessi suberei* syndone involuti interdum adhibentur. Interna sint *Rhabarbarum, camamel, thalybeata & amara*, & ut verbo dicam, remedia ad *cachexiam & fluxum album*. Decubitus in lecto ad aliquot septimanas nonnullas hoc malo liberavit. “*Abscindi potest imminente Gangrena*, de qua operatione consulantur scriptores chirurgi. “*Utcunque recordandum est peritissimi Barbetti effatum.* Uterum (inquit ille) sine vitæ periculo posse excindi, quemadmodum multi medici scribere ausi fuerunt, perito anatomico intolerabile censetur.

## C A P U T XV.

*Sive Fasciculus Morborum decimus quintus.*M O R B I I N F A N T U M  
in genere.*Harrissi sententia.*

*Art. 1504.* **T**emperies infantum humidissima est, & morbi eorum universi ejusdem generis sunt, & ab una eademque causa ut plurimum producuntur: quemcumque enim affectum pati deprehenduntur infantes, hoc vel illo nomine insignitum; raro aut nunquam iis deesse *feces acidum redolentes*, & maximè ab initio ructuum acidorum copiam observare potui; ergo symptomata infantum singula, *acido*, ut parenti, ortum suum debent. “*Ἄρα ὅξος χυμὸς ἀντιπρὶνθεός*, „ *τῶν λοιπῶν μάλιστα ἔστι* (inquit *Hippocrates de vet. med.*)

*Infantum morbi ab una causa nempe acido plerumque oriuntur.*

*Art. 1505.* Facillimè in morbos dilabuntur infantes, & nisi imperitiùs tractentur, facillimè in sanitatem restituuntur. Percunctandum est, an nausea & vomitu, & quandiu laborarint, an lac vel cibum coagulatum ejecerint; an importuni vagitus, vigilæ & inquietudo torminibus ventris eos excruciaci indicarint; an ructus acidi vel singultus emittantur; an tussis adsit; an sedes vel pauciores quàm par est, vel frequentiores fuerint; quo colore demum inficiantur, an albidæ, viridescentes, vel bile sint admodum saturatæ; an sitiant & febricitent; an sint ulcuscula in ore [*Aphtha dicta*;] an iis solennis sit ichor depluens pone aures; an epileptici sint; an tempus sit dentitionis;

*Diagnosis morborum quibus criticis investiganda est.*



nis; an tumescat abdomen; an color sit ictericus, vel phlegmonoides, &c.

**Nulla pulsus aut urinae habenda est ratio.** *Art. 1506.* Totidem sunt, quæ infantum pulsum accelerant, vel alijs immutant, ut sententia exinde lata ut plurimum fallax futura sit. Urinae infantum sanitate recta gaudentium sunt crassissimæ, adeò ut ferè nulla exinde exurgat indicatio.

**Causæ procatareticæ morborum infantilium.**

*Art. 1507.* Causæ procatareticæ morborum infantilium sunt variæ, nimirum interdum præexistunt diatheses morbosæ hæreditariæ a principiorum generationis conditione ac statu deductæ, aut a matre gravida plurimum pendentes; post has, causæ eorum affectus propius respicientes ad quatuor capita referri possunt. 1. Ad *frigus susceptum* quod affectibus febrilibus infantes disponit, &c. 2. *Nutricis lac magis crassum*, quod debetur vel intemperantiæ lactantis circa liquores spirituosos, vel circa amplexus venereos (unde moventur menses,) vel passioni hysteriæ, si nutrix sit hysterica. 3. Ad *præmaturam carniū deglutitionem*, quæ cruditates parit, exinde lumbrici & plurima incommoda. 4. Ad *potum liquorum spiritibus abundantium* concessum. Venter infantum, a quacunque causa id primariò pendet, in acidam intemperiem nunquam non facessit, unde fit quod alimentum suum nequaquam in homogëneam chyli substantiam ritè coneratur, verùm in quoddam coagulatum transeat, ex quo morbi ferè omnes iis contingunt; quodque istiusmodi coagulatio aut cuiuspiam aciditatis gradui jugiter innitatur, aut saltem exinde proficiscatur multò sæpius, quàm ab alia quavis causa, luculentissimè constabit, si quæ sensibus ipsis, aut demum curationi (quæ acidum obtundentibus, & coagulationes solventibus optimè instituitur) fides certò adhiberi possit.

**Hypothesis de acido confir-**

*Art. 1508.* Saltem si omnimodò vera non sit nostra hypothesis de acido in omnibus puerorum affecti-

CAP. XV. *Infantum Morbi in genere.* 519

affectibus prædominium habente, votis nostris abundè sufficiet, si per *testacea* & *remedia absor-* matur ex  
curationis  
methodo  
per absor-  
*bentia* dicta curationis methodus efficacior ac certior, quàm ea, quæ hæctenus passim obtinuit, evadat ( quod experturo facilè patebit. )

*Art. 1509. Corpulenti & obesi infantes*, pituita Prognosis  
ex confor-  
diffluentes, verricis regionem mollem [ *pulpæ* matione,  
& corpo-  
adinftar tremulæ ] & apertam, quam dicunt, Anglice *an open Mould*, ab anteriore ad posteriorem cranii futuram persæpè excurrentem diutius retinentes, Rachitidi, tussi convulsivæ, aphthis difficulter cedentibus, ac tandem scrophulis, maximè sunt obnoxii. *Macilenti & strigosi* sunt omnium tenerrimi, acerrime calore adurantur, & in febres pessimi moris, hoc est, summè inflammatorias ( pro ratione ætatlæ ) & nervoso generi adversas, sunt ut plurimum proclives. — Pueri ex matribus hysteriis, teneris, morbosis, &c. orti a graviore aliquo morbo difficiliter convalescunt.

*Art. 1510.* Quod ad infantilium affectuum curationem attinet, in genere semper eorum imbecillitatem naturalem præ oculis habere imprimis oportet; & eligenda sunt medicamenta, quæ tenerrimis maximè conveniunt: etenim quod mitiora ac tutiora sunt remedia, quæ adhibemus, ed certius ex animi sententia succedet eventus. Curatio.

*Art. 1511.* Quod ad *venæsectionem* puerorum attinet, quamvis materiæ febrilis in pulmones metathesis insignior, & tusses convulsivæ eam in minimis infantibus quandoque exigant, tamen aperte constat eam non esse medicinam iis naturalia consentaneam, neque magis huic tenerrimæ, quàm decrepitæ ætati accommodam. Et proinde minimè necessarium duco ejus auxilium implorare in quibuscunque infantum affectibus, nisi in *tussibus istis convulsivis*, vel ubi *febrim* subito exortam *tussis importuna* concomitari solet: vel

Phlebotomia rardè  
necessaria.

530 *Efflorescentia Purpurea.* CAP. XV.  
in *contusionibus* gravioribus, quæ nonnunquam  
contingunt.

*Ettmulleri sententia.*

Vires  
mercurii  
dulcis &  
auri ful-  
minantis. *Art. 1512.* In infantum cura latet quid singu-  
lare in *mercurio dulci*, sed adhuc melius est *au-  
rum fulminans*, dosis lactantibus est gr. j. vel gr.  
iv. pro dos. ij. horrendas dejectiones efficit, inter-  
dum etiam vomitus movet. In epilepsia, asth-  
mate convulsivo, torminibus, convulsionibus, &c.  
*Aurum fulminans* est sacra anchora. p. 1177. &  
1179.

De meco-  
nii purga-  
tione. *Art. 1513.* Infans recens natus purgetur cum *ol.  
amygd. dulc. & syr. violar.* vel *de rhabarbaro*, vel  
*e spin. cervin.* quod est optimum, idque toties, &  
tam diu repetatur, donec liberetur a sero muci-  
laginoso ventriculum occupante, & a *meconio* ni-  
gricante, & spisso excremento in intestinis stabu-  
lante. *Colostrum* seu lac primum est alimentum  
medicamentosum, quod natura eum in finem ge-  
neravit, ut modice nutriendo leviter pro infantis  
imbecillitate purget per aliquot dies.

*Art. 1514.* "*Syrupus flor. malorum persicor.* est  
„ optimum; lenissimum, ac tutissimum emeti-  
„ cum pro infantulis; alvum quoque blandè la-  
„ xat. Infantibus recens natis apprimè propina-  
„ tur loco *ol. amygd. dulc. & syr. violar.* dos. a  
„ ℥ij. ad ℥j. Est medicamentum praxi moderna  
„ comprobatum.

EFFLORESCENTIA PURPUREA.

*Ettmulleri sententia.*

Efflores-  
centia  
purpurea. *Art. 1515.* Infantes tertio vel quarto a partu die  
[ aliquando tardius ] *efflorescentia cutis miliari pur-  
purea* [ Anglicè *the Red-Gum* ] affliguntur, quæ  
cilio

CAP. XV. *Febres Infantum.* 531  
 cito evanescit. Mulierculæ pulv. Gasconicum, con-  
 fect. alkerm. crocum in vino generoso, &c. solent  
 exhibere; ope medica raro indiget.

## FEBRES INFANTUM.

*Harrisii sententia.*

*Art. 1516.* Prima indicatio in curandis febribus  
 est acidum ritè præparare, quo melius id elimina-  
 tur; hoc autem necessarium videtur antequam hu-  
 mores acidi poterint cum *diapoeia* expurgari; nam  
 secundum Hippocratem cocta, non cruda sunt me-  
 dicanda; hæc præparatio, non aggredienda est su-  
 doriferis propriè dictis; sed potius *absorbentibus*,  
 scilicet, pulveribus *testaceis*; *salia volatilia*, aut  
*lixivialia*, aut *spiritus volatiles*, in tenellis non  
 usurpanda, utpote ipsorum ætatulæ tenerrimæ mi-  
 nus congruentia.

In febris  
 bus curan-  
 dis dum  
 indicatio-  
 nes humo-  
 rum præ-  
 paratio &  
 expurga-  
 tio.

*Art. 1517.* Infanti anniculo febricitanti, aut  
 torminibus (ut plerumque fit) excruciato in hunc  
 fere modum succurrere soleo, quarta quaque ho-  
 ra exhibeo chartam pulv. testac. ex sequentium  
 nonnullis, ocul. & chel. cancerorum, test. ovorum,  
 ostrearum, cancerorum, os. sepia, cret. coral. coral-  
 lin. margar. matr. perlarum, lap. bezoar. pulv. Ga-  
 scon. spec. de hyacinth. &c. dosis circiter ℥j. cum  
 julap. sequent. exhibere soleo, ℥j. Aq. lact. ℥iv. ce-  
 ras. nigr. ℥ij. pæon. comp. epidem. ana ℥ij. sacchar.  
 perlat. q. l. m. f. julap. facillimè variari potest for-  
 mula, servata semper eadem intentione. Conve-  
 nit interdum emulsio ex amygd. dulc. &c. ad sitim  
 extinguendam, & humores contemperandos.

Methodus  
 medendi.

*Art. 1518.* Tertio die a quo sum advocatus,  
 nisi variolæ, morbilli, aut febris scarlatina, ca-  
 put attollant, purgandum esse præcipio, infantem  
 unius anni in hunc fere modum: ℥j. Syr. de ci-  
 chor. cum rheo ℥j. rhabarb. elect. pulv. gr. xv. vel

Catharsis  
 instituen-  
 da.

℞j. *aq. lact. alexiter. cinnam. ten. ana* q. s. ad diluendum, misce. Vel 2℥. *Syr. de rhamn. cathartic.* ʒij. *pulv. diasen. gr. viij. m.* vel 2℥. *Pulv. cornachin. gr. vj.* sumat in coch. *aq. ceras. nigror.* nullum verò medicamentum magis accommodatum est ætati puerili ac *rhabarbarum*. Ad vim purgationis accelerandam *cristall. tartar. genuin.* ℞j. aut ʒij. in haustul. juscul. avenac. exhiberi potest, & catharsis repeti debet alia atque alia vice pro re nata. “ Sed oportet medicum cavere: Febres etenim „ infantum *tumoribus criticis* terminari non raro aptæ natæ sunt, quales sint *phyma vel phylgethlon* sub mento, *parotis* pone aures, &c. „ Ideoque in isto rerum statu catharsis omnino „ differenda est, & suppuratio promovenda.

Quid faciendum  
in sympto-  
matis dis-  
sonis.

Art. 1519. In symptomaticis *αἰκνῶν*, ex summa humorum putredine oriundis sæpè ex usu est *Æthiopis mineralis gr. vj.* [ imò ad ʒj. vel ʒʒ. ] vel *mercurii dulcis gr. iv. cum flor. sulph.* tantundem admixta in syr. alicujus grati cochleari parvo, nocte catharsin præcedente exhibere. His ritè peractis plerumque cessant graviora symptomata, vel saltem multum leniuntur, ut proinde in vado jam res sit, quæ in extremo discrimine paulò ante fuerat.

## I C T E R U S.

### Sylvii sententia.

Icterus.

Art. 1520. Icterus plerisque infantibus mox a partu solet supervenire, imò nonnunquam illo infecti nascuntur, adeoque ipsius causam quandoque ante nativitatem in se continent; probabile est, quodd ab humore glutinoso, pituita, scilicet viscosa ortum ducat. Existimo in his infantibus icterum sæpè fieri posse absque ductus biliar-



CAP. XV. *Tormina Ventris.* §§§  
 biliarii obstructione, a bilis, scilicet, spirituositate, & ideo ad effervescendum ineptitudine.

Art. 1521. Omnia remedia icterum curantia infantibus non ita rursus exhibentur, quam adultioribus; pulvis sequens ex lacte materno exhibitus semel aut bis in die intra paucos dies icterum infantum curare solet, *℥. Pulv. croc. angl. bezoar. min. ana gr. j. m.* quoties alvus est adstrictior commodè sollicitatur ac laxatur *rhaborbaro*, ac imprimis *syrupo de cichor. cum rheo*; prodest etiam *pulvis viperarum* (item *millepedes*, *sal succin.* &c.)

Art. 1522. "Rara est mentio hujus affectus in practico-  
 rum libris, nihilominus tamen plures  
 sanè infantuli recens nati hoc morbo intereunt,  
 ex muliercularum plerumque negligentia: aiunt  
 enim, flavescent, & moriuntur, neque ulla  
 suppetias aut quærunt aut explorant."

Flavescit  
 hoc morbo  
 perirent.

## TORMINA VENTRIS.

*Etmulleri sententia.*

Art. 1523. Tormina ventris frequenter mirum in modum affligunt recens natos, continuo plorant, pedibus calcitrant; crepitus copiosi emittuntur, excrementa sunt viridia; sunt planè motus convulsivi intestinorum; aliquando Hernia producitur.

Tormina  
 ventris.

Art. 1524. Præmissis enemate & aliis laxantibus & pulveribus absorbentibus, *sperma ceti cum ol. anisi* est egregium; externè *ol. cham.* & *rut.* cum gutt. aliquot *ol. anisi*, *junip. nuc. moschat.* cui addi potest *sel. bubul.* q. s. pro linimento. *Enema ad tormina* Fulleri.

Curatio.

Art. 1525. "Hoc duntaxat seriò admoneo [inquit *Harris*] tormina omnia, inquietudines, & vigilias infantum *testaceis* aptè exhibitis æquè

Nota bene.

334 *Alvi Adstrictio, & Diarrhœa*. CAP. XV.  
 „ certò demulceri, ac dolores ac vigilias adultor-  
 „ um ipsis *narcoticis* ad tempus tolli.

## V O M I T U S.

*Ettmulleri sententia.*

Vomitus. *Art. 1526.* Vomitus est utilis in infantibus, ex  
 quacunque causa oriatur, nisi sit nimius; in cul-  
 pa est lac frequentissime.

Curatio. *Art. 1527.* Si sit nimius, & discolorata rejici-  
 antur, *clyisma* injiciendum est, & per os *carmi-*  
*nativa*, *nux moschat.* &c. sunt exhibenda; exter-  
 nè stomacho frustulum *panis tostii in vino genero-*  
*so madefacti* & cum *aromatibus conspersi* appli-  
 candum &c.

## A L V I A D S T R I C T I O, & Diarrhœa.

*Ettmulleri sententia.*

Alvi ad- *Art. 1528.* Alvus infantum ordinariò est laxa,  
 strictio saltem bis in die exonerari debet: adstrictio ple-  
 rumque oritur ex vitio lactis vel pulvis.

Curatio. Præter usitata *laxantia* in hoc affectu præstan-  
 tissimum remedium est *muscerda* a N. ij. ad vj.  
 pro ratione ætatis in pulculla exhibitæ; usarpa-  
 ri etiam possunt *linimenta laxativa ex colocynth.*  
*scammon* &c. “ In tenellis sufficit *inunctio ventris*  
 „ cum *butyro* ante focum; item ablutio quoti-  
 „ diana clunium & femorum cum *aqua frigi-*  
 „ da.

Diarrhœa. *Art. 1529.* “ Diarrhœa infantum ( inquit *Har-*  
 „ ris) non *adstringentibus* aut *narcoticis* cohiben-  
 „ da est, sed potius humores ferocientes cum pul-  
 „ veribus *testaceis* compescendi sunt, & contem-  
 „ perandi, ut demum *rhabarbaro* expurgentur.  
 Dylen-

„ Dysenteria infantibus ( inquit *Barbette* ) sæpiùs  
 „ perbenigna reperitur ; illa enim ad menses ali-  
 „ quot quandoque afficiuntur sine quovis incom-  
 „ modo , modo res naturæ permittatur ,

Dysente-  
ria.

## A T R O P H I A I N F A N T U M ,

*Etmulleri sententia ,*

*Art. 1530.* Macies & atrophia infantum ex de-  
 negato nutrimenti transitu ab obstructione lacteq-  
 rum & glandularum mesenterii accidit . Membra  
 macilenta evadunt , venter tumet , & indurescit ,  
 ut plurimum secessus liquidi & copiosi observan-  
 tur ; causa ut plurimum est viscositas ingestorum ;  
 periculosum est malum . “ Quotquot hoc affectu  
 „ extinctos aperii ( inquit *Dolæus* ) in iis glan-  
 „ dulas mesenterii tumidas & obstructas reperi ,  
 „ denegato enim sic nutrimenti transitu , neces-  
 „ sario partes necitare suo rorido privantur .

Macies &  
atrophia  
quomodo  
fit .

*Art. 1531.* Alimentum debet esse tenuissimum  
 & subtilissimum ; conveniunt *volatilia & martiata*  
*mitiora* ; externè linimentum *ex gum. ammoniac.*  
*&c.* “ Marasmus seu extenuatio infantum ( inquit  
 „ *Sydenhamus in sched. mon. p. 55.* ) quasi phthi-  
 „ sica curatur exhibitione *infus. rhabarbari* in  
 „ cerevisia ten. quod ipsum ego quoque aliquo-  
 „ ties expertus sum . *Reusnerus* affirmat *Hillerum*  
 „ infantes atrophia laborantes cum *tussilagine* ad  
 „ instar homini frixa frequenter restituisse . ( Suc-  
 „ cus quoque ejusdem plantæ est maximè efficax . )

Cura.

*Art. 1532.* Pro aridura partium valdè commen-  
 datur *arcanum aluminis Fælicis Vourzii* p. 473.  
 valet etiam *unguentum ad atrophiam* ut & reme-  
 dia *ad Rachitidem* .

Aridura  
partium .

## TUSSIS CONVULSIVA.

*Etmulleri sententia.*Tussis  
convulsi-  
va.

Asthma.

Causa.

Catarrhus.

Curatio.

Venæse-  
ctio.

*Art. 1533.* Frequens est tussis infantum ferina , in qua multum ac diu tussunt , donec per vomitum rejiciant mucosum quid ex ventriculo , postea ad tempus cessat per dimidium præter propter diem , tum revertit simili modo . Ex ventriculo oritur , ut etiam *asthma infantum* , quod est anhelosa & sibilosa respiratio . “ Tussis infantum ” ( ut rectè observavit *Vvaldschmidius* ) est ferè semper *stomachalis* . Materia acida , mucilaginosa & tenax [ inquit *Dolæus* ] in ventriculo hospitans sæpissimè est causa hujus affectus ; interdum verò causa ferox advenire videtur , & nihil aliud esse , quam sal quoddam mediante aere corporibus tenellulis communicatum lymphamque coagulans , a qua acriori & stagnante vel præterfluente larynx afficitur , unde *tussis illa* oritur *convulsiva* . Frequentissimè infantibus accidunt *catarrhi* cum stertore in pectore a quo malo plures intereunt ; febricitant enim , & suffocantur ; quare muniendi sunt infantes ab aere frigido ; si enim ventis frigidis exponantur ex incuria nutricum vel matrum , facilè in hunc morbum incidunt , & dein difficulter curantur .

*Art. 1534.* Quoad curam hujus tussis furibundæ semper ad stomachum erit respiciendum ; absque vomitu vix curari potest , cum eo tamen facilè depellitur , ut & *asthma* dictum ; provocari potest cum penna oleo tincta , &c. Jusculum raparum est mulierum euporiston , *sperma ceti* in jusculo est egregium , “ Ingens solatium ( inquit *Sydenhamus* ) adfert *venæsectio* infantibus tussi convulsiva laborantibus , & remedia quælibet pectori dicata longo post se linquit intervallo *method.* ”

CAP. XV. *Tussis Convulsiva.* 537

„ *method.* p. 207. *Phlebotomia* & repetita ca- Cathartica  
 „ *tharsi*, eaque sola expugnatur hæc tussis, sed  
 „ leniora cathartica hic conveniunt, eaque sunt  
 „ cochleatim ingerenda pro ratione ætatis *Ep. p.*  
 „ 29. Potus & alimenta liquida ( inquit *Vuillisi-*  
 „ *us* ) in quantitate solito minori sumantur, isti-  
 „ us vice *bochetum ex sarsa, chin. santal. ras-*  
 „ *ebor. C. C. cum ingredientibus diureticis* & Decoctum  
 „ *antispasmodicis* usurpetur; decoctum vel syr. elignis.  
 „ *ex castor. & croco item decoct. rap. pæon. mar.*  
 „ *visc. quercin. hyssop.* multos juvarunt.

## Farrago sententiarum.

*Art. 1535.* Caro murium fixorum comesta vul- Remedia  
 gè specificum audit; sed super omnia muscus pyxi- nonnulla  
 datus, quocunque modo sumptus, est remedium alia.  
 probatissimum, & rard fallax. Decoctio ex musco  
 arboris ( inquit *Baglivius* ) præsertim a quercu pen-  
 dente omnium præstantissima est, ut nos experti  
 sumus, valet quoque in aliis morbis convulsivis.  
*Aurum Mosaicum* ( in aliis morbis convulsivis ma-  
 ximè efficax ) in pauld ætate provectioribus tentari  
 meretur, ut & *ol. sulph. per campan. serum lactis*  
 recens a cæseo pro potu ordinario bibatur. *Expres-*  
*sio millepedum ad pertussim, julap. moschat. syru-*  
*pus ad tussim convulsivam, &c.* quandoque cum  
 fructu usurpantur. *℥. Milleped. in vin. alb. de-*  
*mers. q. v. exprime succum, & add. sacchar. alb.*  
*q. s. & f. s. a. syrupus*; hic syrupus cochleatim  
 sumptus ( inquit *D. Cheyne in tractatu de Arthri-*  
*tide* p. 116.) Tussim convulsivam infallibiliter tollit.



## E P I L E P S I A.

## Vvillifii sententia.

Epilepsia  
quando  
potissimum  
accidit &  
a qua cau-  
sa.

Signa præ-  
sagientia.

Curatio.

*Art. 1536.* Epilepsia puerorum circa duo potissimum tempora in pueris convulsionibus maximè obnoxiiis reperiri solet, viz. intra primum a partu mensem, & circa dentium eruptiones; quam hujus morbi insultus etiam aliis temporibus, & quibusdam aliis de causis, non rarè eveniant; cujusmodi sunt nutrix invaletudinaria, aut prægnans, lac in ventriculo coagulatum, aut in putrilaginem acidam aut amaram degenerans, intemperies febrilis, capitis aliarumque partium ulcera, aut exanthemata, subitò evanescentia, aeris mutationes, lunationis periodi, &c.

“ Quando in infantibus (inquit *Dolaus*) frequentes oscitationes, pandiculationes; oculorum & palpebrarum leves motus, manuum commotiones, brachiorum extensiones, pavores & tremores, vigiliis nimias observamus; epilepsia timenda est, quia sunt ejusdem prodromi.

*Art. 1537.* Antispasmodica medicamenta nutrici exhibeantur; sumat mane & vespèri rad. *Œ sem. pæon. mar. Œ sem. fœnic. dulc.* in haust, ser. lact. coct. Linimentum sequens circa nares, tempora & cervicem infantis epileptici usurpari potest, *℥. Ol. capivi, castor. ana ℥ij, succin. ℥ß. m.* nuper mihi retulit medicus eruditus se novisse plures hoc remedio curatos, viz. *℥. Fol. cham. minutim incis.* Mij. includantur in duobus sacculis a lino tenui aut serico confectis, qui lacti calido intincti & expressi abdomini successivè applicentur. *Untzerus* valdè commendat *fel catelli* lactantis nempe ut totus succus cisti fellea exemptus puerulo cum pauca *aq. flor. tilie* propinetur.

Harri-

*Harrisii sententia.*

*Art. 1538.* Ad convulsiones seu insultus epilepticos tollendos apprimè etiam valent *pulveres testacei*; maximè si *castoreum* iis adjiciatur. In convulsionibus quamplurima pro specificis vulgò habita tam ab auctoribus gravissimis quam a prætictis celeberrimis decantari solent: veruntamen virtutes eorum ( quantum observare licuit ) nostram de se expectationem videntur vix ac ne vix quidem explevisse. In paroxysmis infantum convulsivis, utpote a torminum prægredientium materia acri nervos omnes vellicanti jugiter abortis; ea, quæ *acidum* obtundunt, contemperant, aut infringunt, idque sine corporis novo æstu aut calefactione, quæque aciditatem sic infractam atque aculeis orbatam *per inferiora* deducunt, post alia infinita incassum tentata, veras continere vires huic symptomati horrendo debellando pares tandem agnoscentur.

Ad convulsiones testacea optima remedia.

*Ettmulleri sententia.*

*Art. 1539.* Epilepsia infantum plerumque ex his *causis* sex causis originem ducit. 1. A meconio retento. 2. A lactis vitio, 3. A dentitione difficili. 4. Ab immoderato animi affectu nutricis. 5. Ab excretis cohibitis. 6. A lumbricis.

*Art. 1540.* Mirabilis est vis *sulphuris antimonii & auri fulminantis* in epilepsia dos. gr. j. vel in imbecillibus gr. iß. pro dos. ij. cum aliis appropriatis. ( 1512. )

Aurum fulminans.

“ *Ol. succin.* gr. ij. vel iij. cum pari quantitate *spiritus vitrioli* in *aq. ceras. nigr.* exhibiti, pueris rulos a paroxysmo statim plerumque liberant; sed præ omnibus quotcunque mihi hætenus innotescunt *oleum sulph. per. campan.* hunc morbum

Alia remedia.

„bum in infantibus præcipuè primo mense fel-  
 „citer expugnant; sumi potest in julapiis cepha-  
 „licis ad sufficientem aciditatem. *Pulvis de gut-*  
 „*ter.* utilis est ad præcavendam recidivam.

## D E N T I T I O.

*Hippocratis sententia.*

*Art. 1541.* Ad dentitionem accedentibus, gin-  
 „givarum pruritus, febres, convulsiones, alvi pro-  
 „fluvia, & maximè ubi caninos dentes producunt;  
 „& iis qui inter pueros sunt crassissimi, & qui al-  
 „vos duras habent. “ De plumis exuendis & no-  
 „vis nascentibus ( inquit *Lister* in locum ) idem  
 „gravis dolor atque febricula avibus contingit;  
 „unde mutæ sunt, & canere desinunt. Idem  
 „quoque crucis in veteribus cuticulis deponendis  
 „accidit. Germen dentis ( inquit *Dolaus* ) in  
 „maxillis est instar albuminis ovi, mucosi & te-  
 „nuis, in cellulis eorum contenti, quod de die in  
 „diem durius redditur, usque dum illa materia  
 „indurata gingivam perrumpat: in hac perru-  
 „ptione miseri tenelli plurimis affliguntur sym-  
 „ptomatibus: adfunt enim comites gingivarum  
 „pruritus, superflua caro, vesiculæ, fungi, ma-  
 „xillarum inflammationes, terrores, insomnia;  
 „vigiliæ, salivatio, vomitus, epilepsia, pavo-  
 „res, diarrhœæ, febres, convulsiones, gingi-  
 „varum tubercula, dein abscessus, & non ra-  
 „rò mors ipsa.

Modus  
eruptio-  
nis.

Tempus  
eruptio-  
nis.

*Art. 1542.* “ Licèt nihil certi ( inquit *Bone-*  
 „*tus* ) de termino eruptionis dentium statui  
 „queat, quippe in quibusdam citius in aliis tar-  
 „dius prodeunt; tamen communiter observatum  
 „est dentes successivè biennii spatio exire; ita ut  
 „primò septimo mense *incisores*, deinde *ma-*  
 „*xillares*, tum 15. aut 17. mense *canini* vel *ocu-*  
 „*lares*

„ lares prorumpunt . ( vide *Artic.* 1544. ) “

*Harrisii sententia.*

*Art.* 1543. Nullus affectus infantibus tot gra-  
via symptomata prognerare solet , quot denti-  
tio difficilis & laboriosa ; inter dentiendum enim  
ex inflammatione gingivarum non raro oriuntur  
tormina ventris , vigilæ , inquietudines , proflu-  
vium alvi aut ejusdem constipatio , dejectiones  
& vomitus virides , aphthæ , febres , convulsio-  
nes , &c. “ Atque hæc accidentia ( ut rectè ob-  
„ servat *Baglivius* ) vitio solidi tantummodo suc-  
„ cedunt , solidi nempe gingivarum irritati , pun-  
„ sti , crispatique , a quibus ad intestina oscillatio-  
„ ne producta graves oriuntur diarrhœæ , quæ si  
„ non venerint , pejora veniunt mala (antedicta.)

Sympto-  
mata va-  
ria inter  
dentiens  
dum.

*Art.* 1544. Dentitionis tempus est duplex ; *u-*  
*num* , quo dens osse maxillari primùm emergere  
nititur , & quo gingivæ pars externa & superior  
absque aliquo ejusdem tumore , albedo quodam  
circulo circumscribi ut plurimum solet ; *alterum*  
est , quo dens mole jam auctior gingivam tumi-  
dam reddit ; atque eam percurrere omni vi co-  
natur , atque hoc solummodo postremo casu quan-  
doque licet gingivas incidere . “ Quatuor , quin-  
„ que vel sex mensibus a nativitate elapsis dentes  
„ ordinariè incipiunt erumpere , primo *incisores* ,  
„ deinde *canini* , & postremò *molares* ; circa se-  
„ ptimum ætatis annum *nova series* producitur ,  
„ & circa vigesimum primum *dentes sapientiæ* di-  
„ sti , nimirum duo postremi molares egrediun-  
„ tur . ( Vid. *Art.* 1542. ) Nonnulli , licet pau-  
„ cissimi cum dentibus aliquot eruptis nascuntur .  
„ Ego novi foeminam *sine dentibus* , non modo  
„ in infantia , sed per totum vitæ stadium *eden-*  
„ *tulam* mansisse .

Duo den-  
titionis  
sunt tem-  
pora.

*Art.* 1545. Symptomata dentientium universa *Curatio.*  
eidem

eidem ferè methodo, remediis nempe *acidum absorbentibus*, & *contemperantibus*, ac deinde leniter *expurgantibus* plerumque cedunt.

Nota bene.

Art. 1546. " Ordinariò copiosè salivant infantes dentibus erumpentibus, & adest plerumque diarrhoea; hæc si eveniant, benè prælagiunt; quocirca commodè fricandus est dens erumpens, cum *folio tabaci* circa nutricis digitum obvoluto, & *cerevisia* parum madefacto, quod *salivam* & *alvum* leniter movet. *Alvus* lubrica perpetuo servanda est; & si adsint convulsiones pulvis sequens *Voillisi* locum habet; ʒj. *Ocul. cancr. margar. præparat. coral. rub. ana* ʒj. *ol. sulph.* quantum pulvis imbibendo excipiet f. pulvis. *Spiritus C. C.* (inquit *Sydenhamus in sched. man. p. 54.*) ut ut tritum & planè contemptum remedium (dos. gr. iij. vel iv. in aq. ceras. nigr.) præ cæteris, quæ mihi innotescunt, medicamentis votis respondet in dentitione laborantibus. Convulsiones hinc oriundas minuta *spiritus C. C. dosis* foeliciter tollit (inquit *Boerhaave.*) In ventris torminibus apprimè convenit *enema ad tormina* Seq. ʒj. *Cret. pulv. ʒss. herb. rut. flor. cham. ana* Mß. *coq. in q. s. aq. font. ad ʒiv. colatur. add. tinct. castor. diascord. ana* ʒij. *syr. de mecon. ʒiss. ol. anis. gut. x. m.*

## L U M B R I C I.

### Ettmulleri sententia.

Lumbrici. Art. 1547. Lumbrici sponte prodeuntes vel per alvum vel per os raro sunt sine periculo; nam *malignitatem* in morbis denotant, ubi fuga sibi volunt consulere. Authores practici studiosè moment in omnibus affectibus infantum curandis, imprimis obstructionibus semper ad *lumbricos* esse attendendum.

Art. 1548.



Art. 1548. *Primaria signa lumbricorum sunt in ore copiosa saliva jejuno stomacho, sculptura narium, pavor in somno, stridor dentium; ventris tumor, tussis sicca; sitis, alvus lubrica; tormina ventris jejunis, rubor & pallor faciei alternatim.*

Signa  
lumbrico-  
rum.

Art. 1549. *℥. Argenti vivi ℥j. coq. in aq. simplic. (vel quod melius est in decoct. alb.) ℥ss. vel probe agitentur invicem in lagena vitrea, post subsidentiam Mercurii decantetur liquor; & detur infantibus pro potu ordinario. Est experimentum certissimum ad enecandos lumbricos.* “Ejusmodi, quoque est medicamentum istud per universam, Italiam celebratum. *℥. Argent. viv. ℥j. infund. per noctem in aq. galegæ ℥ij. decantetur, liquor & propinetur mane. Boyle.* “Externè utile est linimentum sequens, *℥. Aloe ℥ij. myrrh. ℥ss. (ol. absynth. gr. vj.) fci. taurin. q. s. m. f. linimentum, cui addi possunt ad acuendum ol. colocynthidis guttæ aliquot. De aliis vermifugis alibi (684.)* “*Cinnabaris nativa est remedium valde efficax, ac tutissimum, vermibus necandis. Pulvis stanni, nempe stannum calcinatum, est adhuc efficacius medicamentum, & ferè inter specifica censetur: hinc pulv. vermifugus sequens Quincii.* *℥. Stanni calcinat. musc. corallin. sem. sancton. ana ℥j. sabin. croc. ana ℥j. m. f. pulv. dos. a ℥ss. ad ℥j. alvum non movet.* Author in ejusdem laudibus copiosior est; vid. locum. *Emplast. vermifug. Batean. & Syrupus vermifugus ejusdem interdum usui esse possunt.* In extremis utot aliquando *Hydrargyro (inquit Chesneau)* quod in vermibus necandis non habet simile. Ad pisi magnitudinem ex cochleari cum lacte parvulis sine noxa propinare soleo.

Remedia  
ad lum-  
bricos.

Art. 1550. Crinones seu comedones sunt vermiculi subcutanei infantes ad atrophiam disponentes; occupant plerumque loca musculosa, imprimis dorsi,

Crinones  
seu com-  
edones

dorsi, scapularum humeri, crurum ac surarum; pruritum molestum excitant, indeque inquietos & vigiles reddunt infantes, tandemque in tabem adducunt. Cum *lotione mercuriali* sunt enecandi. „ Hi forte sunt vermes, quos *Ætius* describit, „ & *dracunculos* vocat; *Æthiopes* & *Indos* quan- „ doque infestare solent; rarissimè apud nos inve- „ niuntur.

## R A C H I T I S.

*Boerhaavii sententia.*

*Art. 1551.* Medio ferè labente seculo decimo sexto in *Mediterraneis Britannia* primo, deinde per totam *Germaniam*, denique & per omnia *Europa borealis* loca, ortus est morbus novus, hodie frequentissimus, qui *Rachitis* appellatur; infantibus nunquam connatus est, rarè ante nonum ætatis mensem, vix unquam post biennium vitæ, sed spatio hoc medio frequens accidit.

Methodus  
medendi

*Art. 1552.* Curatio optima fit cibo levi, eupepto, sicciori, minus pingui, aromatibus mitioribus condito, sæpè dato & copia moderata. Potu pauco, meraco ex *cerevisia*, imprimis non veteri quidem, at diu cocta ac spissa; aere sicco, & calidiusculo; vestitu accuratè sicco, ex lana confecto; gestatione, concussione, oscillatione, unctione in rheda; frictione multa, calida, sicca, pannis fumo aromatatum perfusis instituta maximè ad abdomen & spinam; *cantharidum* iterata quandoque applicatione; vomitoriis lenibus aliquoties cum prudentia repetitis; purgantibus deinde roborantibus per aliquot dies successivos adhibitis; denique usu diu continuato medicamentorum roborantium, exsiccantium, antiscorbuticorum, & spiritus excitantium. An immersio in aquam frigidam prodest? „ Immo *psuchrolusia* in hoc affectu est valdè efficax, ut ex

*Psuchrolusia.*

„ ut ex quotidiana experientia docemur , de qua  
 „ videatur *Floyer*, p. 112. 145. 222. &c.

*Gliffonii sententia .*

*Art. 1553.* Signa diagnostica rachitidis sunt laxitas & mollities partium , debilitas & languor , ignavia & torpor ; est in hoc affectu inæqualis partium nutritio : caput iusto majus , facies plenior & floridior , partes carnosæ infra caput in progressu morbi magis magisque indies extenuantur ; adsunt protuberantiæ quædam , & nodi circa nonnullos articulos , maximèque in carpis conspicuæ , pauld minùs in talis observantur ; similes quoque tumores in costarum extremitatibus , quibus cum sterni cartilaginibus committuntur : ossa nonnulla incurvantur , præcipuè tibiæ & fibulæ , hinc ossa ulni & radii , sed pauld minùs & infrequentius , aliquando etiam ossa femoris & humeri ; aliquando decurtatio quædam ossium , & deficiens eorum accretio secundum longitudinem ; demum irregularis quædam capitis protuberantia , maximè ossis frontis antrorsum huc quoque referri potest ; dentes tum tardiùs tum molestius erumpunt , levi occasione vacillant , aliquando nigrescunt , aut etiam frustulatim excidunt ; pectus in ulteriori morbi gressu a lateribus angustius redditur , anteriùs acuminatur ; adest quoque subtumida quædam abdominis repletio & hypochondriorum tensio ; frequenter etiam tussis , respiratio difficilis multaque alia pulmonum vitia inducuntur . Hoc morbo afflicti sæpè lateralem decubitus modò dextrum modò sinistrum averfantur ob coalescentiam pulmonum cum pleura vel tumorem in adverso latere .

Signa  
diagnost.

*Art. 1554.* “ Interius hepar iusto majus est ,  
 „ ventriculus & intestina in majorem molem as-  
 „ surgunt ; mesenterium glandulis iusto majoribus ,

Partes  
internas  
affectas .

M m

bus ,

bus; si non strumis afficiatur; pulmones infar-  
 ti & tumidi cernuntur, nonnunquam purulen-  
 ti strumosi & pleuræ adhærentes. Venæ jugu-  
 lares & arteriæ carotides solito ampliores; de-  
 nique partium ferè omnium enervatio, item  
 torpor quidam & ad motum segnities. Hic af-  
 fectus plerumque ex se non est mortalis: non-  
 nunquam tamen ingravescentibus symptomatis  
*in tabem, hydropem pulmonum, aut ascitem* de-  
 generat; quo citius a partu ægrum invadit, eo  
 periculosior est, quo major morbus eo dete-  
 rior. Qui ante annum quintum non curantur,  
 postea per totum vitæ spatium valetudinarii  
 sunt. Scabies aut pruritus huic morbo superve-  
 nientes ad curationem multi conferunt. Ma-  
 yovv.

Prognos-  
 sis.

Remedia  
 simplicia.

Art. 1555. Materia medica in hoc affectu sunt  
*herbæ omnes capillares, imprimis tricomanes, ra-*  
*dix osmund. regal. gemmæ dum vix erumpent fi-*  
*licis maris, lingua cervina, veronica mas, tussi-*  
*lago, radix rubiæ tinctorum, curcum, sarsaparil-*  
*la, chin. lignum guaiaci & ejusdem gummi, cha-*  
*lybs, sperma ceti, vermes terrestres, millepedes:*  
*Rhabarbarum* præ aliis simplicibus commendamus;  
 est enim medicamentum moderatè calidum & sic-  
 cum, spiritibus insitis omnium partium satis fa-  
 miliare & amicum; torporem spirituum benignè  
 excutit, mollitiem laxitatemque partium firmat,  
 internam lubricitatem nonnihil corrigit; pulsus  
 ad artus evocat, calorem externarum partium au-  
 get, internarum & imprimis earum, quæ nutri-  
 tioni inserviunt, vigorem & activitatem fovet:  
 est medicamentum profectò omni ætati & com-  
 plexioni satis tutum.

Laus rha-  
 barbari.

Curatio.

Art. 1556. Cathartica appropriata præcipuè ex  
*rhabarbaro* debitis intervallis repetita in hoc mor-  
 bo profunt; *fonticuli & vesicatoria* sunt utilia,  
 enema sequens est valdè proficuum, *℞. Fim. e.*  
*qui*

qui non castrati ꝑ. sem. anis. sæniculi malv. contus.  
ana ꝑ. flor. cham. p. j. coq. in q. s. ser. lact. in  
colatur. ꝑ. solv. syr. violar. ꝑ. sacchar rub. ol.  
ros. ana ꝑ. m. f. enema. De *Frictione* hoc obser-  
vandum est, abstinendum esse a frictione, quæ  
parte ossa prominent, & liberalius fricandum esse  
partibus eorum cavis; non continuandam esse hanc  
actionem ultra levem ruborem in partibus excita-  
tatum. " Quantum valet *frictio* in hoc morbo,  
„ ut etiam de viribus *tussilaginis* speciatim in hoc  
; affectu & atrophia curandis: vide *Fulleri me-*  
; *dicinam gymnastic.* p. 96.

De Frictione.

## Mayovvii sententia.

Art. 1557. Quandoquidem Rachitidis causa in  
obstructione spinalis medullæ nervorumque inde  
oriundorum imbecillitate consistit, præcipuæ indi-  
cationes curatorix sunt, ut *nervi roborentur*, &  
*obstructiones tollantur*; in hunc finem venæsectio,  
vel sanguinis detractio per hirudinum suctionem,  
medicamenta cathartica, item digestiva, diureti-  
ca, diaphoretica & specifica in usum vocentur.  
Enemata laxantia injici possunt, nonnunquam  
corroborantia ex decoct. fimi equin. flor. rorisma-  
rin. &c. Enem. terebinthin. cum expressione mil-  
leped. viv. &c. Catharsis institui potest cum rha-  
barbaro item cum calomel. Foniculi insuper o-  
pem egregiam præstant, præcipuè, si inter pri-  
mam & secundam colli vertebra[m] excitentur.  
Præter specifica vegetabilia laudatur *ens veneris*,  
inventum nobilis *Boylei*, ut & *salia volatilia*,  
*elixir proprietatis*, *balsamum sulphuris*, nonnun-  
quam etiam *chalybis* usus convenit; utpote qui  
virtute insigniter aperiente donatur, idemque non  
tantum concoctionem juvat, sed etiam viscerum  
tonum firmat roboratque: verum illius usus non  
sine cautione instituendus est; etenim in tussi,

Methodus  
medendi.



pleuritide, infarctu pulmonum, febre hectica mor-  
bisque id genus aliis a chalybis usu omninò ab-  
stinendum est. Ad abdominis intumescen-  
tiam sequens fomentatio multum confert, nempe ægro  
in vase satis amplo collocato *hordeum fermenta-  
tum*, quod in aqua cocta aliquamdiu infusum est  
(ut in cerevisia cōficienda fieri assolet) eidem  
circumcirea tepidè apponatur, maneatque æger  
eodem penè opertus ad sudoris provocationem.

Alia re-  
media.

*Art. 1558.* "Succus è limacibus cum testis pa-  
rum confusis exstillans, vulgò, sed perperam,  
„ *oleum limacum* vocatus, in hoc affectu pro usu  
„ interno & externo valdè celebratur, præcipuè  
„ in *infantibus heclicis & phthisicis*. Virtutes &  
„ usus remediorum sequentium lector ipse expen-  
„ dat; *Flores salis armoniac. martiati Batean.*  
„ *Cerevisia ad Rachitidem, aq. limacum pectora-*  
„ *lis, emplast. spinale, linimentum spinale, on-*  
„ *nium Fullerii*. Consulatur etiam *Sydenhamus de*  
„ *Rachitide Epist. p. 148.*

## A P H T H Œ.

### *Sylvii sententia.*

Aphthæ.

*Art. 1559.* Aphthæ sunt ulcuscula (satis nota)  
totam oris superficiem occupantia, neque par-  
cunt cœsophago, ipsive ventriculo, quantum conje-  
ctura assequi possumus; ut plurimum albicantes sunt,  
subinde flavescentes, quandoque nigricantes, quæ  
possemus sunt periculosiores. "Aphthæ (inquit  
„ *Dolæus*) quæ vulgò, sed perperam, *ulcuscula*  
„ judicantur, sunt revera *eschara* quædam sed le-  
„ viusculæ, quæ in summitate pustularum qua-  
„ rundam in ore, &c. oriuntur.

Causæ &  
curatio.

*Art. 1560.* Aphthæ nobis videntur ortum habe-  
re ab acidis humoribus halitibusve ad os delatis;  
quocirca curatio consistit in acidorum humorum  
hali-

halituumque *correctione* ac *emendatione*, & in partium affectarum ab aphthis *liberatione*, *mundatione*, ac *consolidatione*; *testacea* & *pulveres absorbentes* primariò indicantur, & postea leniter expurgandi sunt humores *syrupo de cichor. cum rhabarb.* “*Mucilago sem. cydon.* ( inquit Etmul-  
 „ *lerus* ) cum succo *sempervivi majoris* subactus  
 „ linimentum præbet non inconueniens pro illinen-  
 „ dis aphthis ; præ cæteris verd *succus raparum*  
 „ super ignem vase tecto sine aqua assatarum ex-  
 „ pressus sine saccharo est optimus ; egregium est  
 „ *album græcum* & *spiritus sulphuris cum melle*  
 „ *rosaceo*. In puerulis aphthis laborantibus ( inquit  
 „ *Bonetus* ) nihil est quod tam præsentaneam af-  
 „ fert opem, quàm *oleum raparum* cum pauco  
 „ saccharo. Sequens valdè commendatur a D. Bo-  
 „ yle, & profectò votis interdum responder ; ʒ.  
 „ *Succi semperviv. maj. mellis opt. ana p. æ. coq.*  
 „ paulisper ad clarificand. deinde add. *alum. rup.*  
 „ q. s. ad saporem mediocriter austerum M. cum  
 „ pluma illinentur os & guttur singulis horis vel  
 „ sæpiùs. Author hoc remedium tanquam speci-  
 „ ficum venditat. *Decoctum corticis interioris ul-*  
 „ *mi cum paulo mellis rosacei* est reverà optimum  
 „ aphthis curandis gargarisma. Non debemus in  
 „ hoc affectu [ inquit *Dolæus* ] proclives esse ad  
 „ purgandum ; quia facilè diarrhœa sequeretur, quæ  
 „ pessima est. Sed de aphthis plura alibi [ 1136. ]

Remedia  
varia.

## MORBI CUTANEI.

*Art. 1561.* “*Crusta lactea, scabies* [ 1178. ] *Ti-* scabie,  
 „ *nea* [ 995. ] &c. sunt affectus, quibus infantes &c.  
 „ sæpiùs tentantur. Eruptionibus scabiosis fre-  
 „ quenter infestari solent in variis corporis parti-  
 „ bus, præsertim facies eorum sicca ac scædissima  
 „ scabie incrustari solet, *Hildanus* monet hos

„ affectus non temerè curandos esse , sed potius  
 „ naturæ aliquandiu relinquendos , nisi periclitantur  
 „ partes musculosæ & nervosæ subjacentes .  
 „ Usurpare licet *leniter purgantia & alterantia* ,  
 „ *antimonium diaphoreticum* , *athiops minerale* ,  
 „ &c. sunt proficua .

*Ettmulleri sententia .*

*Art. 1562.* Pro his affectibus internè conveniunt medicamenta *ex fumaria , tinctura coral. Rob. sambuci , diaphoretica , viperina , cinnabaris antimonii , mercurius dulcis*. Crusta est *humida & manans* , vel *crassa & sicca* ; in priori casu inspergenda est cum *lapide calaminari preparato , tutia , ceruss. flor. sulph. camphora* , &c. In posteriori uti licet *oleo amygd. dulc. cum guttis aliquot ol. tartar. per deliquium* , vel *bals. sulph. lixiv. vulgar. &c.* est in usurpandis remediis ex *nicotiana* ; *mercurius dulcis* est tutior quàm reliqua mercurialia ; sequens est unguentum non inelegans contra tineam , *℥i. Litharg. ceruss. ana ℥ij. flor. sulph. mercur. viv. ana ℥j. ol. ros. q. s.* Instituat<sup>r</sup> cura tineæ decrescente luna . De his affectibus alibi ( 1178. ) plura .

*Head-mould-shot and Horse-shoe-head .*

*Art. 1563.* “ In catalogo nostro Londinensi septimanatim morientium duo insignia morborum nomina sive titulos invenimus , viz. *Head-mould-shot & Horse-shoe head* , quos medici scriptores neutiquam , quod scio , tractarunt : plures tamen infantes his affectibus obeunt , ut ex prædicto calculo constat .

*Art. 1564.* “ *Head-mould-shot* est affectus infantulis jugiter connatus , in quo ossum cranii , margines ad futuras , maxime coronalem , alii  
 super

„ super alios obvolvuntur, unde meningium fibræ  
 „ tenduntur & distrahuntur, nec non cerebrum  
 „ ipsum comprimitur, & infantes convulsionibus  
 „ non raro corripiuntur.

*Art. 1565.* “ *Horseshoe-head* est affectus in quo  
 „ cranii suturæ sunt nimis patentēs, & spatia de-  
 „ hiscentia inter ossium margines intercedunt,  
 „ quæ hiulea quandoque non nisi annis aliquot  
 „ suppleuntur. Signum est frequenter *imbecillita-*  
 „ *tis ac brevis vitæ.* Nutrices loca affecta *spiri-*  
 „ *tu vini vel spiritu sacchari* perfricare solent,  
 „ cui nonnullæ addunt *albumen ovi & ol. palma.*

## L U E S V E N E R E A .

*Harrisii sententia .*

*Art. 1566.* Infantes a nutricibus lactantibus in-  
 fecti, quanquam maculis pustulis ulceribusque sca-  
 rent, quanquam & nocturnis illis doloribus erunt  
 excruciatī, facillimè omnium restituuntur. *Fari-*  
*na sarsaparillæ* ferè insipida, saltem nullo gustu  
 ingrato, panatellis aut puliculis suis, ut par est  
 commista, addito etiam ventriculi gratia *santalī*  
*citrini* polline, *cathartici*s debitis intercalatis, te-  
 nerrimæ ætati, ut lætè nonnunquam observavi,  
 salutem perfectam reddidit.

Infantes  
 quomodo  
 curantur .

## P H T H I R I A S I S .

*Ettmulleri sententia .*

*Art. 1567.* Phthiriasis est morbus pedicularis,  
 cui plerumque obnoxii sunt pueri: Abluatur caput  
 cum *lixivio*, in quo coctum fuit *sem. staphisagr.*  
 & inungatur cum linimento sequente, *℞. Ol. spic.*  
*℥ij. amygd. dulc. ℥ss. unguent. nicotian. ℥vj. misce;*  
 pediculi omnes interibunt spatio unius noctis.

Morbi pe-  
 dicularis  
 curatio.

M m 4

*Art. 1568.*

Cocculus  
Indicus.

Art. 1568. " Pulvis baccharum *Cocculi Indici*  
,, capiti inspersus certo certius pediculos interi-  
,, mit. *Condrochius* [ qui peculiarem de iis tracta-  
,, tum scripsit ] millies expertum in puerulis tradit  
,, hunc pulverem etiam in exigua quantitate cum  
,, adipe suilla vel pomo cocto, & similibus permi-  
,, stum, & capiti appositum egregie pediculos in-  
,, terficere, & felicius, quam *staphidem agriam*  
,, tutiusque quam *hydrargyrum*.

Pediculi  
inguina-  
les.

Art. 1569. " In adultis, pro *pediculis cancrofis*  
,, inguina incolentibus necandis *sapo nigra* inuncta  
,, est remedium infallibile, neque opus est ut aliud  
,, quodcunque exquiramus. *D. Turner lac. subli-*  
,, *mat.* proponit; sed est medicamentum non adeo  
,, tutum genitalibus usurpandum.

The Buggs

Art. 1570. " Est animalculum quoddam foedissi-  
,, mum ac maxime invisum, cujus nemo *Græcorum*  
,, vel *Romanorum* authorum, quod scio, meminit,  
,, nomine vernaculo a *Bugg*, civibus Londinensi-  
,, bus doloroso & venenoso morfu satis superque  
,, notum, *Ricino*, insecto livido cruoris pleno,  
,, qui canibus, ovibus, & bobus valde infestus est,  
,, non multum dissimile est. Nescio an supradictus  
,, *Pulvis cocculi Indici* [ Art. 1568. ] circa spondas  
,, & stragulas conspersus hoc animaleulum maxi-  
,, me detestandum interimeret, necne. *D. Sharr*  
,, asseruit, quod, si locus demorsus statim cum a-  
,, lumine rupeo saliva soluto fricetur, virus illico  
,, suspendetur, & dolor evanescet.



## C A P U T XVI.

*Sive Fasciculus Morborum decimus sextus.*

## TRACTATUS DE VENENIS,

*Ex pluribus, iisque optimis, scriptoribus, more nostro collatio, non sine propriis aliquot symbolis, quibusdam in locis interjectis, concinnatus.*

*Art. 1571.* **V**itam hominum, quibus venenum aliquod illatum sit, in ancipiti esse & in angustiis versari experientia nimis frequenti satis compertum est, venenatorumque symptomata nullam pati *cunctationem*, sed medelam citam ac promptissimam exposcere. Ideoque ne opusculum hocce manuale in tanta rerum precipitatione, ac difficultate *subsidio tam necessario* planè destituatur, schedulam hanc de venenis, tanquam quid desideratum, adjeci.

*Art. 1572.* Utrum quidpiam in se & absolute venenum sit, multum ambigitur: e contra omnia venena esse nec sine veneno quicquam existere asserere non dubitavit *Paracelsus*; dosis sola (inquit ille) facit, ut venenum sit, vel non; cibus enim vel potus quilibet quantitate majori æqua assumptus, attestante eventu, sæpius venenum sit, vel, quod ad idem redit, mortem violentam affert. Sed quum *de venenis* loquamur, intelligenda sunt illa, quæ in minutissima ut plurimum sui quantitate corporibus nostris insigniter nocent, eo nomine vocari.

*Art. 1573.* Venenum in genere definiri potest, id, quod intus assumptum vel extrinsecus admisum qualitate quadam vel agendi ratione corporibus nostris vehementer *nocere* aptum est: non enim est de veneni essentia, ut hominem semper interi-

Proo-  
mium.Venenum  
quid.Veneni  
definitio.

rimat ; sed satis est , si illum arcana quadam facultate vehementer lædat ; posterioris generis sunt omnia illa , quæ *insaniam* , *stoliditatem* vel *furitatem* inducunt homines non penitus interficientia .

Venena  
quomodo  
perimunt,

*Art. 1574.* Non est hujus instituti inani speculationi tempus impendere de variis venenorum modis agendi , aut litem movere , utrum venena perimant *nimio calore vel frigore* , *vasorum erosione* , *vel humorum putrefactione* , *lancinante nervorum irritatione* , *vel vehementi spirituum animalium in furorem agitatione* , &c. est enim maxima varietas , Interim tamen operæ pretium erit id adnotare , quod scribit *Sylvius* ; quamvis ( inquit ille ) acrimonia omnis sensum caloris producere videatur in partibus sensibilibus ; reperiuntur tamen in nostris corporibus duo acria effervescentiam diversam producentia , tum calidam tum calore destitutam , non tantum sensui manifestam , & ideo ab invicem distinctam , sed diversis remediis cedentem . Si quis venenorum effecta & symptomata , quæ in homine solent excitare attenta mente consideraverit , agnoscat illa omnia ortum suum ac efficaciam debere alterutri vel utrique acri , cujus acrimonia vel patet vel latet : quoties patet veneni acrimonia prompta est ipsius actio humorumque corruptio sentiturque confectum ejus noxa ; quoties latet lenta & tarda est ejusdem actio , humorumque corruptio , nec nisi paulatim observatur ejus noxa .

Veneno  
cum duo  
genera ,

*Art. 1575.* Quandoquidem duobus modis corpora nostra venenis afficiuntur , nimirum *ore sumptis* vel *extra in corpus immixtis* , de utrisque seorsim agendum est , & primò de venenis ore sumptis .

Signa ve-  
neni sum-  
pti .

*Art. 1576.* Signa veneno intus assumpto supervenientia sunt quæ sequuntur , ructus foetidi & mali saporis , mox pulsus & cordis motus insignis mutatio , virium lapsus , cordis angustia , palpitatio ,

tatio, lipothymia, syncope, interdum vertigo, visus obfuscatio, tremores, convulsiones, singultus, stupor, mordicatio & dolores, & quandoque erosiones ventriculi & intestinorum, sitis, urinæ suppressio, vomitus materiæ praviæ, interdum & alvi profluvium, extremarum refrigeratio, sudores frigidi, linguæ intumescencia, labia tumefacta & nigricantia, ventriculi & hypochondriorum intumescencia atque extensio, interdum totum corpus intumescit & inflatur maculis passim in corpore erumpentibus, & prostremo mors ipsa. Verum non omnia hæc symptomata in omnibus accidunt.

*Art. 1577.* Magna est venenorum differentia Prognosis.  
alia aliis sunt magis periculosa, alia citius alia tardius pro ratione quantitatis, qualitatis & reliquis eorum circumstantiis hominem enecant. Prognosis potissimum a copia & vehementia symptomatum petenda est, si idonea medicamenta statim adhibita fuerint, & ex eorum usu melius æger habeat, de vita non est desperandum. In convalescentibus verò sæpius accidit, quod a veneno maligna diathesis corpori imprimatur, quæ pertinaciter hæret, & longo post tempore sese exerit, & diuturnos ac periculosos morbos parit. Opinio ista vulgaris ficta est ac falsa, quæ *Indos ab iisque Italos ita artem veneficam statuit calluisse, ut in statum diem aut tempus prædeterminatum, siue fuerit septimana, siue mensis, siue annus, venenatos omnes certo conficere possint*: natura enim quibuscumque venenis huic aut altero æque totis viribus se opponit, & lethale virus reprimat aut frustratur.

*Art. 1578.* Quoad curationem venenorum in Curatio:  
genere indicationes communes sunt tantum duæ, nempe ut venenum per viam per quam in corpus ingressum est, ( si possibile ) revocetur & expellatur, & deinde ut idoneis alexipharmacis expungatur,

gnetur . Ex natura & ratione alexipharmacorum & bezoardicorum , quæ magna ex parte cardiaca audiunt , proclives sumus conjecturam facere illa non proprie in venenum ipsum agere , sed saltem corpus roborare , ut ad venenum expellendum sufficiat , atque ita saltem per accidens in venenatis prodesse . Ex prædictis luculenter patet , quod danda sit opera , ut venena ore sumpta quamprimum è corpore evacuentur : atque ut id commodissimè fiat per vomitum , vomitoria autem non debent esse fortiora acris aut corrodentia sed leniora , & parata ex iis , quæ lentorem obtinent , & naturam mucilaginosam vel oleosam habent , quæ veneni acrimoniam aliquo modo obtundere possunt . In his casibus festinandum est nullaue interposita mora quæ ad manum sunt exhibenda . In hoc negotio , quod cunctationem non patitur , aqua tepida cum multo oleo permixta reliquis omnibus quocunque viribus ferè æquipollet ; deficiente oleo butyrum ejus vices supplere potest , valent etiam juscula mucilaginosa & pingua , &c. Non autem satis est semel vomitum provocare , sed tamdiu is continuandus est , donec nulla amplius veneni in ventriculo indicia ex sapore , odore , nausea , dolore , & morfu deprehendantur . Si venenum a ventriculo ad intestina descenderit , quod sæpius accidit , iterata clysterum injectione illuenda est alvus , & e veneno emundanda ; purgantia quoque lenia propinanda sunt , ut intestina superiora liberentur , conveniunt *cassia* , *manna* , *rhabarbarum* & similia ; utiles sunt *emulsionες ex amygd. dulc. sem. melon. cydon. gum. arab. &c. cum syr. de althæa* . Tandem si quæ reliquæ veneni in corpore supersint , a corde & visceribus avertendæ sunt & ad ambitum corporis pellendæ , & per sudores evacuandæ , quod alexipharmaca itidem præstant , & omnino utile & necessarium est . ab alexipharmacorum usu non statim desistere , sed  
ca ali-

CAP. XVI. *Venena vegetabilia.* 557

ea aliquamdiu continuare, donec maligna dispositio corpori impressa expugnata sit. *Theriaca Andromachi* contra omnia venena cujuscunque generis præ reliquis quocunque remediis optimum esse *antidotum* jure merito communi suffragio censetur; sed majori solita dosi ad drach. duas vel tres exhibenda est (inquit D. Harris in *Pharmacolog. Antiempir.* p. 285.) ab hæc verò regula interdum declinandum est; nam de opio cauto opus est, quando cum venenis narcoticis rem habeamus. Interim instituendus est conveniens victus; lac in cibo & potu a quamplurimis authoribus valdè commendatur; reliqui cibi sint pingues & unctuosi; utilia sunt juscula gelatinosa & pedibus vitulinis, rasuris eboris, C. C. &c.

Art. 1579. Venenorum in specie divisio maxime naturalis a differentia corporum, quibus in-  
Venenorum divisio.  
 sunt, petenda est; existunt enim venena vegetabilia, mineralia, & animalia: ex his sufficiet eminentiora quædam tractare, unde ex istis exemplaribus ante oculos positis praxis de reliquis facili negotio derivari potest.

## V E N E N A V E G E T A B I L I A.

Art. 1580. E plantarum classe *cicuta* & *aconitum* primas obtinent, utpote apud antiquos scriptores frequentissimè memoratæ. Cicutam plantam esse venenatam foliis, radicibus, & succo expresso, pluribus exemplis passim apud authores probari potest. Folia interdum errore pernicioso loco chærefolii & petroselini colliguntur, & inter acetaria devorantur; radices pro pastinacis incautè comessæ quosdam interemerunt: succum esse exitialem ex *Atheniensium* consuetudine satis constat, qui mortis sententia damnatis propinabant; ex hoc lethali pharmaco occubuisse dicitur *Socrates ille philosophorum sapientissimus*; verum  
 enim

Cicuta & Aconitum.



enim verò quodnam fuisset istud *venenum Atticum*, an merus cicutæ succus; vel ex hoc & aliis pharmacis compositum haud satis constat, quin in dubium vocari possit; sed hic non est disputandi locus.

Cicuta calida & acris.

*Art. 1581.* Rationibus & experimentis deprehenditur cicutam esse calidam & acrem [ quod contra universæ antiquitatis suffragium *doctissimus Vöepherus* indubitatè comprobavit ] suisque aculeis membranam nerveam potissimum ventriculi ferire ac fibras ejus ad violentam constrictionem irritare; unde tum ob vellicationis vehementiam, tum ob constrictionis atrocitatem maxime circa orificia ventriculi, ubi nervi insigniores disseminantur; præsidem symptomatis nervosi in furorē agit, undè convulsiones; &c. & cerebrum & cor in consensum rapiuntur.

Effectus cicutæ intus sumptæ.

*Art. 1582.* Affectus cicutæ intus sumptæ sunt præcordiorum & ventriculi dolor cum sensu punitionis & ardoris ibidem, quasi temulentia aliquis, vertigo, epilepsia cum sensuum abolitione, & mira capitis artuum & totius corporis succussione & torsione, spasmi universales, effluxus sanguinis ex auribus, tumor pugni virilis magnitudine circa scrobiculum cordis, singultus, inanes vomendi conatus, faciei & abdominis intumescencia, fluxus spumæ viridis ex ore post mortem.

Curatio.

*Art. 1583.* Indicationes itaque curativæ erunt cicutam quantocius ex ventriculo educendam esse, ejusque acrimoniam infringendam, spiritus vitales consumptos a vehementia symptomatum instaurandos, aut ob motum sanguinis varium vel interceptum oppressos excitandos, labem ventriculo vel intestinis impressam; sive inflammatio sive denudatio membranæ nerveæ; sive exulceratio sit, emendandam; & vires laudabili victus ratione restituendas & conservandas. Cicuta breviorē, tutiorē & certiorē via exturbabitur e ventriculo

vomitum tempestivè concitato, neque necessum est, ut vomitoriis fortioribus utamur, ut ventriculum vehementer irritent & stimulent; cum jam alias ad constrictionem a *cicuta* plectus sit; sufficiunt *aquæ* & *olei tepidi* largi & iterati haustus. Ad vomitum quoque in hoc casu ciendum valent *juscula pingua*, *decoctum ordei cum oleo simplici*, *aqua tepida cum butyro*, *lac cum oleo* & *butyro*, *sincerum aut aqua dilutum*; *cerevisia cum oleo* & *butyro*; *oleum lini vel nucis per se* nauseabunda sunt; ideoque commodiora ad vomitum facilitandum *aquæ tepide*, *lacti*, *decocto ordei*, *cerevisiæ*, aut *jusculis cujuscunque generis permixta*, quæ una opera *cicutæ* acrimoniam demulcent & obtundunt. Pergendum est in hoc opere, donec *omnis cicuta* e ventriculo pulsa sit. Si verò ventriculus his in expellendo adjutus voto non respondeat, & vomitus tardetur, ad fortiora vomitoria recurrendum est, ad *oxymel scilliticum*, *sal vitrioli*, *decoctum cort. virid. jugland.* *decoctum fol. nicotianæ*, &c. Dum hæc tentantur pingua enemata ejiciantur & ano suppositoria intrudantur *ex mele* & *sale coctis hier. picr. sapone sal. gem. vel alumine*, &c. Clysteres enim & suppositoria motum peristalticum intestinorum sursum vergentem deorsum proliciunt. Vix licitum est catharticum propinare nisi lenissimum. Educta ita e ventriculo & intestinis *cicuta* omni vel maxima parte, tum demum ad *vinum generosum* & *alexipharmaca* deveniendum est. Antidoti magnæ, *Theiriaca*, *Mithridatium*, *electuarium Orvietanum*, &c. prosunt quatenus dissolvunt sanguinem & lympham alicubi stagnantes. Huc pertinent etiam *aquæ cordiales dictæ*, *confectiones de hyacinth. al-kermes*, *lapis bezoardicus*, item *tinctura bezoardica*, *salia volatilia*, *mixtura simplex Paracelsi*. Cum suspicio sit tunicas ventriculi aut intestinorum erosas esse aut ulcerosas, haud consultum est cibos

cibos aromatibus condire, multò minus aceto, neque vino nimium indulgere; magis prodest decoctum hordei cum passulis, sem. anisi, aut decoctum rad. chin. sassaf. &c.

Cicuta œnanthe & cicutaria.

Art. 1584. Probabile est (inquit clarissimus D. Mead) *cicutam* antiquorum, de qua *Vvepherus* tractatum edidit, fuisse nostram *œnanthem cicutæ facie succo viroso*, quæ *cicuta* vulgari multò extiosior est. *Raius* verd noster, rei herbariæ peritissimus, *cicutam majorem vulgarem venenum fuisse Atheniense* asserit, & *cicutam aquaticam*, de qua *Vvepherus* integrum librum conscripsit, fuisse *cicutariam palustrem*. vid. *Hist. Plant.* Vol. I. p. 451. 452. *Oenanthem autem cicutæ facie esse plantam ab ambobus diversam* vid. eandem p. 441. Doctissimus verd laudatus author forsân conjecturam suam sustinere potest, &, per me licet, sustineat; non est mihi litigandi otium, nec animus. Interim agnoscendum est has plantas cognatas esse, nec viribus aut facie valdè dissimiles.

Oenāthes aquaticæ descriptio.

Art. 1585. *Oenanthem aquaticam cicutæ facie* apud *Raium* loco citato ad hunc modum descriptam invenimus; "*Paludapio* foliis non absimilis, est rutæ prateni similior (nostra sententia *apia* aut *petroselino* similior quam *Thalictro*) multo pullulatu virore tetro colore & facie *cicutæ*. Caulis bicubitales spargit e radice in pares *aphodeli* albi bulbos multipartita & quasi brachiata nullius fibræ vinculo aut interventu continuos teneros gustu acres & ingratos, succo lacteo primum deinde flavescente viroso & exulcerante prægnantes. In rivulis non in septentrionalibus duntaxat, sed & meridionalibus *Angliæ* provinciis copiosè provenit." An radices hujus plantæ sint venenatæ & malignæ vel salubres *Raius* dubitat, & rem in medio relinquit ulteriori examini subjiçendam. Sed de earundem malignitate sequens historia omnem tollit dubitandi ansam.

Art. 1586.

Art. 1586. Ad tertium lapidem ab oppido ubi jam pluribus annis commoratus sum medicinam faciens, septem circiter abhinc annos; a quatuor pueris comesæ fuerunt *radices ænanthes*, quod in hunc modum eveniebat; hi pueri hora undecima antemeridiana e *schola alphabetica* egressi, per prata palantes, ad ripam rivuli has radices reperiebant, & cum candelabri fragmento, quod ad manum fuit, effodiebant; opere egregie delectabantur, & plures jam nacti aiebant alii aliis, hæ sunt *radices dauci teneræ, young Carrots*, statim mutuis incitamentis, non famis, sed petulantis luxuriæ causa, illas avidè devorabant. Quid sit? domum abeunt, ægrota-  
re incipiunt, quod factum fuit, celabant. Hi liberi fuerunt tres filii & una filia ex iisdem parentibus orti, patre verò tunc temporis solo superstite; eorum natu minimus quartum annum nondum compleverat, & maximus nonum non attigerat; filius medius quintum, & puella sextum aut septimum agebat annum. Vagiebant, ejulabant; pater natorum aspectu contreritus, quid mali sit, nesciebat. Porro obmutesciebant, vertigine corripiebantur, proni in terram cadebant, superveniebant spasmi horrendi cum tota sensuum abolitione, vomebant omnes, puella supra ac infra violenter purgata est, subinde verò in lucidis intercapedinibus edebant & bibebant. Pater lacrymans miserabili & subitanea natorum omnium *metamorphosi* vehementer perculsus varia in animo volvébat; secundum vulgi opinionem *incantamentis vel malis artibus* admiranda hæc symptomata inducta fuisse credebat. In lucidis intervallis rogabat, nunquid comedissent? rem nondum agnoscunt; deinde in loculis facto scrutinio inventa sunt frustula quedam *cujusdam radice*, hoc detecto, qui loqui potuerunt, veritatem fatentur omnes de *istâ radice* esitasse, unde statim de veneno suscepto orta est suspicio; & extemplo nuncius cum radice ad me deferretur;

Historia  
*ænanthes*  
comesæ.

fortè fortuna *raditem facie agnovi* ; ipse autem tunc temporis aliàs occupatus *pharmacopolam* consilio & subsidiis idoneis instructum mox denissi , qui misellos invenit veneno ferè confectos ; nunc omnes , nunc hunc , nunc alium paroxysmis epilepticis cum gravissimis spasmodis & spuma oris laborantes . Jussu meo multum oleum cum aquæ repidæ crebris haultibus larga manu propinavit . Exantlato ita ventriculo , medicamentum , quod mihi maximè arridebat , fuit *tinctura bezoardica* , qua fretus alia ascisci fore supervacuum credidi , nisi quod iis modico vino in languoribus indulsi . Dosis tincturæ maximo natu fuit coch. iss. & parvulis diminuta quantitate pro ratione ætatum 6ta vel 8va quaque hora cum haustulo cerevisiæ ; interdum brodiis & lacticeis nutriebantur . Post 24. horas duo ex iis pristinæ sanitati restituti sunt multò tamen debilitati ; reliqui duo tardius convalescebant , nec ante quintam vel sextam diem excussa est veneni labes ; iis *clysteres* sæpius injeci curavi , & fortasse alia nonnulla remedia exhibui , quorum jam mihi excidit memoria : evasere omnes , sed non sine maxima difficultate ; & jam , dum hæc seribo vivi sunt .

Porcus ex  
elu cenan-  
thes inter-  
fectus .

*Art. 1587.* Idem paterfamilias , vir fidei integerrimæ , mihi narravit se biennio post habuisse *porcum* , qui e propugnaculis prorepens vagus per agros aberravit , & in idem pratum incidit , ubi more istorum animalium ruspantem credibile est has radices gustasse & devorasse ; nam post paucas horas vehementer ægrotabat ; accersebatur *veterinarius* quidam e vicinio , qui manus auxiliares porrexit , sed frustra ; nam animal moriebatur convulsus spumosa ex ore saliva effluente .

Corona  
imperialis,  
esula,  
euphor-  
bium, el-  
leborus.

*Art. 1588.* Radix bulbosa *coronæ imperialis* iotus sumpta affectus fere eosdem habet ac cicutæ attestante *Joanne Rhodio* apud *Vvepherum* ; ideoque eandem exigit medendi methodum . *Esula*  
*sive*



*sive tithymali quoque ferè omnes sunt acres & maligni, intro assumpti violenter admodum purgant; ventriculum & intestina excoriant, adurendi vim obtinent, & cicutæ viribus perniciosius propemodum æquipollent. De Euphorbio & Helleboro idem dicendum est, si in nimia quantitate exhibeantur, & etiam quibusdam aliis pharmacis emeticis & catharticis usu vulgari nimis frequenter adhibitis.*

*Art. 1589. Quod aconitum sive napellus a tota substantia sua summum sit venenum & perniciosum in necandis hominibus & quadrupedibus ut vix etiam approbatissimis antidotis succurri possit, nisi confestim applicentur præsidia, ex sententia medicorum ferè omnium notum est. Napellus in jugis montium Alpinorum nutritus vires admodum noxias obtinet, adeo ut inter venena vegetabilia jure merito princeps censeatur, delatus vero in hortos in locis humidioribus malignitatem magna ex parte deponit.*

*Art. 1590. Symptomata ab assumpto Napello sunt quæ sequuntur: intumescencia labiorum, linguæ & totius faciei, oculorum prominentia, pectoris gravitas, compressiones cordis, tremor partium, vertigines, syncopes, horror, mania, & lethargus, quæ omnia accidunt, & si intoxicatus evaserit, febre hæctica tamen miser corripitur.*

*Art. 1591. De remediis adversus perniciosum hoc venenum (veneno ipso prius vomitione reddito & reliquis de curando veneno in genere (1578.) rectè observatis) commendatur radix contrayerv. a ℥j. ad 3j. cum Theriaca vel Mithridatio exhibitæ. Sunt qui succum Raphani intus sumptum tanquam certissimum remedium decantant: plurimum prodesse aliqui volunt lapidem bezoardic. oriental. ex Matthioli experimento in duobus reis comprobato, lib. 14. c. 73. in Dioscorid.*

Cocculæ  
officinarum.

Art. 1592. Cocculæ officinarum sive *bacca coc-  
ci Indici* inter venena merito numerantur: in be-  
stiiis etenim ( ex experimentis *Vvepberi* constat )  
symptomata invasionis ordine & sævitia non di-  
sparia iis quæ *cicuta aquatica* in hominibus effi-  
cit; certum est iis inesse vim deleteriam impensè  
irritantem *helleboro albo* similem. Quamobrem  
qualis sit medendi methodus ab hoc veneno as-  
sumpto supra in sectione de *cicuta* ( 1583. ) per-  
cipienda sit.

Taxus.

Art. 1593. *Taxus* arbor foliis, succo, & bac-  
cis, hominibus & jumentis lethalis est. Hoc ve-  
neno infecti frigus in toto corpore percipiunt,  
strangulationis metum incurrunt, & alvi proflu-  
vium dysentericum patiuntur, & plerumque re-  
pentina morte moriuntur. Facta per vomitum  
necessaria evacuatione propinandum est vinum ge-  
nerosum in quo infusa sunt *folia absynthii*, *flo-  
res rorismarini*, *rad. zedoaria*, *serpent. virgin.*  
*sem. cardamom. cum aliis aromatibus*. Ad febrem  
& alvi profluvium conducunt *terra sigillata*, *bo-  
lus Armenus*, *lapis bezoar. coral. rub. rad. tormen-  
till. &c.*

Opium.

Art. 1594. Opium, quod vi sua polychresta,  
nunquam satis laudata, qua & somni nobis dul-  
cedinem conciliat, & doloris suave lenimen præ-  
stat, & quævis in republica nostra microscomi-  
ca turbata pacatiora reddit, in dosi plus justo  
exhibitum venenum evadere nemini non notum  
est, in quantum verissimum est, quod etiam si  
illius facies una sit *Angelica*, altera tamen sit  
*Diabolica*; quamobrem prudentia summa & ma-  
xima cautela in opiatis exhibendis omnino requi-  
runtur; eorum usus promiscuus & profusus *cane-  
pejus* & *angue* vitandus est. *Narcotica* enim,  
quæ stuporem sensui inferunt, non temerè in  
usum ducenda sunt; nec nisi in vehementissimis  
doloribus, ubi vires dolorum acerbitate conci-  
dunt,

CAP. XVI. *Venena vegetabilia.*

364

dunt, ut cessantibus doloribus vires recolligant ; Adulatoris est medici, aut auram popularem captantis ea ob levissimam aliquam causam nimis frequenter & manu supra modum liberali propinare. Sed hoc obiter dictum sit ; de opio veneno dicturus sum.

Art. 1595. Effectus opii in nimia quantitate sumpti sunt, qui sequuntur ardor ventriculi, ponderis sensus ibidem, alacritas aliqualis in initio cum risu *Sardonico*, partium omnium relaxatio ac debilitas, mentis alienatio, memoriæ lapsus, oculorum obfuscatio ex tunicarum relaxatione variis coloribus coram oculis apparentibus, ipsa cæcitas, linguæ balbuties, sopor, pulsus rarus, efflorescens faciei rubor, maxillæ inferioris laxitas, labiorum intumescencia, spirandi difficultas, furor & mania ; salacitas, cutis pruritus vehemens, nausea, vertigo, affectiones eomatosa, apoplectica, vomitus, singultus, pulsus turbatus, spasmi, sudores frigidi, syncopes, & lipothimix, expiratio frigida, mors. Omnia hæc symptomata in omnibus vix occurrunt, sed quædam in his, quædam in aliis pro diversitate constitutionum, pharmaci quantitatis, &c.

Effectus  
opii nimia  
quantitate.

Art. 1596. Curatio in hoc primariò consistit, ut (quod in omnibus venenis faciendum) vomitus provocetur, at, si ad intestina jam penetraverit venenum, clysteres acriores injiciantur, ac demum dosis Cremoris tartari propinetur. Et postea opii antidoti exhibeantur, inter quas *salia lixivialia* aliis supereminent, ut & *sapo albus vel potius tartareus*, si comparari possit. Commendatur haustus *vini veteris vel spiritus vini cum vitello ovi* ad noxiam resinam ; opii partem perniciosissimam, ventriculo adhærentem subigendam. Postremò ad medicamenta acida deveniendum est ; excitandus est æger omni arte, & se labore aliquo exerceat ; acri frigido se nudum exponat ; im-

Curatio.

mo in graviore casu commendatur *immersio in aqua frigida*.

Hyoscyamus.

Art. 1597. *Hyoscyamus niger vulgaris* est planta soporifera & venenosa odore foetido facile se prodens. Ex usu *radicis, foliorum, vel seminum* oriuntur symptomata sequentia, ariditas faucium & linguae, artuum stupefactio, spirituum languor, pruritus universalis, mentis alienatio, vociferatio, delirium, vertigo, visus depravatio aut abolitio, dyspnoea, suffocatio. Quoad curam vid. opium. Art. praecedenti.

Solanum.

Art. 1598. *Solanum lethale, Bella Donna*, est planta maligna & stupefaciens; illius baccæ quandoque a pueris incautè comeduntur, quas vocant *cerasa sylvestria*: symptomata ex his comestis sunt sitis intensa, raucitas, cardialgia, sopor gravis, caecitas, mentis alienatio, delirium, hypochondriorum tensio, convulsiones, affectus apoplectici, mors.

Mandragora & coriandrum.

Art. 1599. Ejusdem commatis *narcotici est Mandragora*, ut etiam *coriandrum*, sicut a quibusdam affirmatur; sed de hoc haud satis convenit inter *Botanicos & Medicos*.

Nuxvomica.

Art. 1600. *Nux vomica narcotica est & virulenta*, ea utuntur ad canes & feles interimendos: hæc animalia *nuce vomica* devorata intra paucas horas convulsi moriuntur. Neque dubitandum est quin eisdem in homine haberet effectus. *Avibus* certè non minus perniciosam esse ex frequenti nostratum experientia constat, qui ejus pulvere carnibus insperfo corvos, & cornices, aliasque aves noxias inescare & perdere solent. Vide opium quoad curam. [1596.]

Plantæ narcotice.

Art. 1601. Hæ plantæ *narcotice ultimè recitatae* naturæ ferè ejusdem cum opio sunt quoad malignitatis speciem & operandi modum; ideoque non opus est hisce diutius immorari, sed brevitatis causa remittendus est lector ad sectionem de opio. (Art. 1595.)

Art. 1602.

Art. 1602. Fungi sunt infimum & ignobilissimum vegetabilium genus, quorum & si aliqui simpliciter venenati sunt, & in cibum non veniunt, alii tamen a nimis delicatulis edules sunt: omnes facile nocere possunt, ut non sine causa Seneca fungos voluptuarium venenum nominaverit, & Plinius cibum *ancipitem* illos dixerit. Athanasius Kircherus in lib. de peste hæc habet: Fungus, qualiscunque sit, semper malignus est, semper exitium qualitatum apparatu instructus: & si non statim sentiat, frequenter tamen comesus nescio quid successu temporis occultæ machinationis interiore viscerum administratione molitur. Apagete ergo perniciofa isthæ gulæ blandimenta. Quæ tanta voluptas ancipitis cibi? An usque aded vitæ tædet, ut eam tam vili offa permutemus, mortemque semper in procinctu stantem ultro sollicitemus: ita vitam nostram, quam non accepimus, facimus brevem, nec inopes ejus sed prodigi fimus.

Effectus  
fungorum.

Art. 1603. Fungi ( præcipuè species venenatæ ) comesti sensum suffocationis & strangulationis in faucibus inducunt, ventriculum inflant, singulum excitant, choleram morbum producunt, interdum epilepsiam, syncopen, sudorem frigidum, somnum profundum, &c. immodicam mortem ipsam, sicut ex plurimis historiis, in authoribus fide dignis videre licet.

Historia.

Ego ipse ex improvise imprudenti esu fungorum aliquando in *diarrhœam mali moris* incidi cum gravissimo *Tenesmo*, & perpetuo meiendi desiderio, quod *Tenesmus vesicæ urinariæ* appellari potest. Diarrhœam naturæ prius relinquendam esse causam ejusdem tunc temporis ignorans judicavi [ nulla enim aderat nausea vel ventriculi gravamen ] quàm die 3. malo persistente & crescente de esu fungorum animo revolventi cogitabam. Quocirca dosin rhabarbari masticaui, ex



qua tamen nullum juvamen accepi. Die 4. ingravescente morbo cum insigni virium jactura, nec non aliquali affectu vertiginoso, & ani exco-  
 riatione dolorifica vesperi emeticum ex infuso *radicis ippecacuan.* propinavi, ex quo ter vel quater  
 evomui, & deinde hora decubitus dosin *Conse-*  
*ctionis Fracastorii* deglutivi, unde feliciter omni-  
 no liberatus sum.

Curatio.

*Art. 1604.* Quoad curationem, fungi ( si fieri  
 possit ) statim vomitu rejiciendi sunt; & reliqua  
 de veneno in genere curanda jam dicta probè  
 observanda. *Saliâ lixivialia* ægros mirabiliter ju-  
 vant, speciatim *lixivium ex cineribus sarmento-*  
*rum vitis.* Contra nocumenta fungorum nil præ-  
 stantius invenitur quam *Theriaca Andromachi*  
*cum oxymelite simpl. vel scillitic.* gallinarum fi-  
 mum duntaxat candidum decoctum mulso *venena*  
*fungorum boleterumque astringit ex Plinio, Lister*  
*de Humoribus p. 392.*

## VENENA MINERALIA.

Venena  
 mineralia.

*Art. 1605.* Postquam de venenis e plantis, se-  
 ctionibus præcedentibus actum est, proximo loco  
 eminentiora quædam venena in classe *mineralium*  
*tum naturalium tum arte factorum* percurrendum  
 est; ac primò de arsenico.

Arseni-  
 cum.

*Art. 1606.* Arsenicum primi subsellii esse vene-  
 num lippis & tonsoribus notum est; duplex est,  
 nativum vel factitium; nativum iterum est du-  
 plex, nempe, *auripigmentum*, seu *arsenicum au-*  
*reum*, *citrinum*, & *sandaracha*, seu *arsenicum ru-*  
*brum*: factitium itidem duplex ex his per subli-  
 mationem conficitur, alterum ex auripigmento, &  
 appellatur *arsenicum album crystallinum*, alterum  
 ex sandaracha, & vocatur simpliciter *arsenicum*.  
 Intra corpus assumpta alterutra arsenici species ea-  
 dem ferè gravissima symptomata infert; sandara-  
 cha,

cha tamen mitior est auripigmento, auripigmentum arsenico albo crystallino, quod omnium est perniciosissimum.

*Art. 1607.* Arsenicum intra corpus admissum virulentiam suam primum exerit pungendo, vellicando, irritando, urendo; unde ventriculi ardor & dolor atrocissimus, intestinorum cruciatus vehementissimus, vomitus, sitis inextinguibilis, linguæ, faucium, & gulæ ariditas & asperitas, singultus; sequuntur anxietates gravissimæ, cordis palpitatio, lipothymia, extremorum frigus; superveniunt interdum vomitus & dejectiones nigrae, foetidæ, cadaverosæ, ventriculi, & intestinorum gangræna aut sphacelus, postremò mors violenta.

*Art. 1608.* Quoad curationem, præmissis universalibus *ἀνὰ τὴν κατὰ* evacuantibus, quemadmodum in curatione venenorum in genere jam dictum est (1578.) hic valde conferunt diluentia, oleosa, mucilaginosa, &c. Insuper ex observatione *Vvepberi* constat *bezoardicum minerale cum butyro permixtum* acrimoniam hujus veneni infringere.

*Art. 1609.* Inunctio ejus externa est etiam valde periculosa & perniciosa: extant etenim historiae in scriptoribus medicis nonnullorum, qui unguento, cui arsenicum commistum est, sese illeverunt, extinctorum, aliorum infanientium, aliorum perpetuò claudicantium, &c.

*Art. 1610.* Argentum vivum in venenorum numero vix referendum est; notum est enim, quodd in quibusdam casibus innoxie hauriatur ad uncias aliquot: peioris vero pernicii multoties existit ejus usus externus, ut videre est in iis, qui in Lue Venerea vel scabie *unguentis mercurialibus* utuntur; quamplurimis exitio inopinato fuit, tremorem, stuporem, paralyin, claudicationem perpetuam, &c. intulit; aliis pravam corporis

**Historia.** poris diathesin vix unquam sanabilem produxit. Novi quendam, qui scabie laborans curandi gratia *cingulam mercurialem* circa lumbos adhibuit; partes omnes infra cingulam stupebant, & paralyticæ evasere; pro illo restituendo variæ methodi incassum tentatæ fuerunt; tandem ad *Thermas Bathonienses* missus est, sed reducem parum in melius mutatum. irritis omoibus aliis, *salivatione mercurio excitata* & decocto e lignis a morbo penitus liberavi.

**Mercurius præcipitatus & sublimatus.**

**Art. 1611.** Tametsi argentum vivum virulentum non sit; nonnulla tamen ex illo præparata sunt maximè venenosa, ut *mercurius præcipitatus varius*; ast omnium gravissima symptomata & damna infert *mercurius sublimatus corrosivus* intus sumptus; suo contactu instar ignis adurentis omnia corrumpit; hinc si sumptus sit, statim lingua & fauces vehementer exasperantur, oriuntur dolores ventriculi tormentosi cum abdominis distentione, vomitus vehementissimi cum maximo nixu, ejicitur materia mucosa, spumea, interdum cruenta, istiusmodi quoque sunt dejectiones alvinæ, quæ frequentes sunt cum doloribus acerbissimis, adest sitis ardentissima, insatiabilis, accidit gravissima inflammatio ac intumescencia linguæ ac faucium, superveniunt deliquia, sudores frigidi, tremores, convulsiones; brevi ventriculo & intestinis gangrænam patientibus æger dicto citius obitu miserabili cadit.

**Curat.**

**Art. 1612.** Proh dolor! tam ingenti malo haud datur *par remedium*. Basis curæ in summa festinatione maximè fundatur; quod factò opus est omni præcastinatione sublata suscipiendum est; quantum præstare possumus, adnitendum est, ut ventriculus a veneno vomitione provocata liberetur. Non est vir fortis, cui animus non crescit in ipsa rerum difficultate. Armamenta, quæ præ manibus præsto sunt usurpanda. Quid vulgarius  
oleo

oleo, butyro, & aqua tepida, quibus raro pauperum casus carent; attamen & hæc præstantissima sunt ad muniendas partes internas contra veneni aculeos; hæc si quæ alia hostis exturbationem citissimam promovent, hæc demulcent, hæc denique magnis *Antidotis* viam sternunt, illarum usum tutiorem efficiunt, ut venenosa labes impressa emendetur. Extra corpus nostrum vidimus in præcipitatione magisteriorum per oleum tartari a corporibus solutis omnem vim corrosivam tolli, unde sperare licet *oleum tartari per deliquium*, vel *sal tartari*, vel *absynthii*, & *similia salia fixa alcalia* & *lixivialia* ad virulentiam hujus veneni domandam aliquid præstare posse, & reverà opem præstant ultra omnia alia *antidota*, quæ hætenus novimus, quod enim scribunt de viribus *chrystalli*, & *similibus*, ego illis vix fidem habeo.

*Art. 1613.* Sublimatum corrosivum vel aliud quodvis venenum intra ventriculum admissum statim emetico aliquo propinato ejiciendum est (inquit D. Sharr) ideoque *æruginem æris ad gr. i. vel ij.* exhiberi suadet; quoniam promptissimè ac sine mora operabitur; hoc verò esset venenum ingerere ad aliud expellendum; quod tamen quibusdam fortasse minus incongruum videatur; clavus enim clavo pellitur, & ignis igne expellitur; sed ego malim *tutioribus remediis* malum aggredi. De *Ærugine æris* proximo articulo.

*Art. 1614.* *Æs viride* intra corpus sumptum perniciosissimum est venenum, & etiam nonnulla ex *antimonio male præparata* sunt æquè virulenta. Hæc sunt ejusdem ferè naturæ cum *arsenico*, licet gradu paulo inferiori, similiaque symptomata excitare solent; eandemque itaque curationis methodum requirunt; ideoque non opus est ut de his singulatim disseram.

*Art. 1615.* Spiritus acidi, ut *aqua fortis*, *spiritus*

*Æs viride & ex antimonio male præparatum.*

*Spiritus acidi aquæ fortis &c.*

*tus nitri, spiritus & oleum vitrioli & similia* vulgo venena audiunt; verum quicquid præstant potius corrosione quam venenositate facere videntur. Per imprudentiam vel errorem quandocunque in ventriculum dimittantur, statim instar ignis faucium & linguæ, ventriculi ac intestinorum tunicas cum diris cruciatibus erodunt, & suffocationem instantaneam minantur, & hominem in extremum vitæ periculum conjiciunt.

Curatio.

*Art. 1616.* Citò ac maturè idonea auxilia adhiberi debent, lenientia & viscida opem ferunt, item pinguis, oleosa, & mucilaginosa plurimum valent, privatim *mucilago seminum cydoniorum, gum. tragacanth.* &c. magnam utilitatem præstant. Sumptis venenis erodentibus (inquit *Montanus*) non est præstantius remedium *lacte bovino*, si bibatur in magna quantitate ad exigentiam sitis, quia semper sequitur sitis ingens tali sumpto veneno; hic quoque *salia fixa* corrosionem minuunt, ut & *pulveres testacei* &c.

Lithargyrum, cerussa &amp; minium.

*Art. 1617.* Sunt etiam *recrementa quædam metallica ex plumbo, & alia ex illo factitia*, quæ inter venena numerantur, viz. *Lithargyrum utrumque, cerussa & minium*: hæc vires *Arsenici* quodammodo æmulantur, sed non adeo exitiosas possident. Qui hæc venena sumpserunt, eodem modo curandi sunt, ac ii qui ipsum *Arsenicum* hauserunt. (1607.)

## VENENA ANIMALIA.

Venena animalia.

*Art. 1618.* Restant jam venena, quæ venenosa animalia homini communicant, tractanda: atque hæc *ex morfu, ictu, vel ipsorum esu* corporibus nostris nocuementi sunt.

Serpentes &amp; angues.

*Art. 1619.* E venenosorum animalium numero *serpentes* imprimis sunt. In omnibus cujuscunque generis serpentum sive anguium, sive viperarum moribus virus morfus tempore in vulnus infunditur,



ditur, unde funesta omnia symptomata insequentia excitantur. Authores venenum *viperæ* inter ea, quæ statim enecant, & ea quæ tardius interimunt medium esse constituunt. Ideoque pro exemplo reliquorum istius generis sit *viperæ*.

*Art. 1620.* *Viperæ* est animal *viviparum*, reliqui serpentes sunt *ovipari*. Demorſi nonnunquam septem horarum ſpatio, interdum non ante tertium diem intereunt. *Viperæ* plurimum iratæ, & tempore æſtivo ſunt magis lethales, item in regionibus calidioribus ſunt magis nocivæ, quam in frigidioribus, quod omnino verum eſt *de omnibus ſerpentum & anguium generibus*. Culter anatomicus detexit liquorem quendam ſubſlavum a viperarum ſanguine ſecerni glandulis duabus conglomeratis, parte anteriore ſincipitis locatis, ex diverſis aliis minoribus conflatis, quæ comuni membrana teguntur quorum ſingulæ vas excretorium exhibent, quæ vaſa ſe uniendo ductum formant ad radices dentium incisorum perforatorum decurrentem; ibique in veſiculam liquidum hoc deponunt, vix guttulam quantitate ſuperans, conſtat *ex microſcopica obſervatione* C. C. D. Mead particulis ſalinis egregiè minutis, quaſi ſpiculorum inſtar hoc liquidum ſcaturire.

*Art. 1621.* Symptomata morſum *viperæ* conſequentia ſunt dolor acutus & punctorius in loco vulnerato; tumorque primò ruber & poſtea liveſcens, ſenſim in partes vicinas latiùs ſerpens; cutis æſtuat erumpentibus veſiculis: progreſſu temporis ſupervenit inſignis languor, pulſus celer, debilis, & quandoque intermittens, cordis palpitatio, ſenſuum ſtupefaſtio, præcordiorum anxietas, ventriculi ægritudo ſumma cum vomitu bilioſo, oculorum hebetudo, interdum dolores circa umbilicum, vel circa hepatis regionem, reſpiratio difficilis, ſingultus, tremores, convulſiones, ſudores gelidi, extremorum frigus, mors ipſa

Symptomata morſum viperæ conſequentia,

ipsa tragœdiam claudens, nisi malo remediis succurratur, vel peculiaris vulnerati vigor, & innatum robur venenum vincant. Si demorsus superstes sit, tumor cum inflammatione aliquamdiu manet; interdum sanies e vulnuscule manat, & pustulæ quædam circa idem herpetis exedentis ad instar erumpunt; cutis universa flavescit, tanquam in ictericis.

Curatio  
generalis  
& particu-  
laris.

Art. 1622. Venenorum extra in corpus admissorum curandi ratio a tribus potissimum indicationibus pendet; primò ut venenum statim extrahatur; secundò ut inhibeatur, ne ad interiora serpat; & tertio ut si quid veneni jam in arterias & venas penetraverit, alexipharmacis expugnetur, eodem planè modo ac in venenis ore sumptis. Id quod habet *Celsus* de serpentum morfu, quicquid fuit in praxi antiquorum; complectitur; imprimis (*inquit ille*) membrum supra vulnus deligandum est; non tamen nimium vehementer; ne torpeat; dein venenum extrahendum est *cucurbitula* applicata facta prius scarificatione profunda, vel alterius hominis in ore ulcus non habentis exsuctione; venena enim serpentum non gustu sed in vulnere nocent (*sed ab hoc experimento sanos cavere suadeo*) neque alienum est circa vulnus scalpello incidere. “Plaga postea *spiritu vini in quo Theriaca vel Mithridatum dissolutum sit*, abluenda est. Vivuni etiam gallinaceum pullum per medium divisum vulneri imponere proficit; huc etiam facit hædi agnive caro calida loco vulnerato applicata. Necessarium est quoque demorsum exsorbere portionem meri vini cum pipere, vel quilibet aliud, quod calori movendo par est, nec humorem intus coire patitur; nam maxima pars venenorum frigore interimit. Omnia etiam urinam moventia, quia materiam extenuant, utilia sunt. Quoad praxin recentiorum animadvertendum est, quod testatur *Boylaus*, scilicet, quod si statim a morfu, paulo

emi-

eminus a parte *ferrum benè ignitum* teneatur, venenum aded enervat, ut demorsum sospitem & incolumem conservet, ne quid mali nisi dolorem in parte citò evanescentem patiatur: longè verò melius & tutius, videtur quod alii docent, locum profunde exurere *cauterio actuali*. Sed præ omnibus quotcunque *axungiam viperinam* vulneri affrictam (modo extemplo fiat) esse præsentaneum remedium sine ulla internorum ope quamplurimis experimentis constat; sed quoniam hæc axungia non semper in promptu sit, & virus celeriter transiens massam sanguineam contaminare possit, topicis aliis appropriatis, quæ præ manibus sunt non neglectis remedia interna quam ocissimè exhibenda sunt, inter quæ instar omnium eminet *sal viperarum*, quod ægro in lecto decumbenti sufficienti quantitate datum, & aliquoties repetitum ad levem sudorem suscitandum sine alio auxilio curam absolvit. Quæ veneno in genere adversantur, hic conferunt ut *Cardiaca*, *bezoartica*, *Theriaca*, *alexiteria*, &c. Generale *Antitoxicon prophylacticum* nullum omnino hætenus cognoscitur, quin & repugnat tale esse.

*Art. 1623.* Aspis omnium serpentum est longe *Aspis* vehementissimus; tam exiguum infligit vulnus, ut omnem ferè oculorum aciem effugiat, vix puncturam acus æquans, per illud tamen tantæ perniciæ venenum infundit, quod intra paucas horas totum corpus pervadit, hominemque citissime e medio tollit, nec tamen dolorem multum infert; sed supervenit capitis gravitas, oculorum caligo, sensum hebetudo, stupor, segnities, somnolentia, faciei pallor, corporis refrigeratio, crebræ oscitationes, spasmi, & tandem, nisi citò succurratur, *trium horarum spatium* ipsa mors. *Ab aspidē* demorsi eodem modo curantur, ac a vipera, vel aliis serpentibus læsi.

*Art. 1624.* Araneorum licet plures species re, *Aranei* perian-

periantur alii aliis venenosiores, omnes tamen uno eodemque modo nocent, viz. *ictu* per vulnusculum venenum in corpus infundunt, vel in *esculenta vel potulenta* illapsi & ingesti hominem lædunt; vel postremò combusti *fumo suo* nocent. Accidit in parte demorsa stupor cum frigoris sensu & horrore, ventris intumescencia, flatus in intestinis, faciei pallor, lacrymæ involuntariæ, partium extremarum tremor, & affectiones spasmodicæ, sudor frigidus, perpetua & vana mingendi cupiditas, membri virilis tensio.

**Curatio:** *Art. 1625.* Ad ictum araneorum eadem observanda est methodus ac in morsibus aliorum animalium venenatorum; privatim autem planè admirandæ sunt vires *foliorum ficus* ad hoc venenum domandum, si icti statim lac ex foliis manans bis aut ter in vulnus instillent, venenum omnino extinguit, & dolores tollit, & reliquorum symptomatum ingruentium occasionem præscindit. Ad *araneos deglutitos* propinandum est vomitorium sicut in aliis venenis intra corpus sumptis, neque omitenda sunt alexipharmaca ordinaria, speciatim verò *resina abietis sicca* multum præstare dicitur; commendatur etiam *allium frequenter comesum*, *vinumque aromatizatum* &c.

**Scorpionis ictus.** *Art. 1626.* Ab ictu scorpionis acerbissimus dolor non solum in parte affecta, sed & in toto corpore sentitur; locus vulneratus inflammatur & tumet, circa plagam emergunt pustulæ; adest tremor, pallor, frigus, singultus, vomitiones &c.

**Curatio.** *Art. 1627.* Ad scorpionis ictum *scorpio ipse* est pulcherrimum medicamentum (inquit *Celsus*); quidam contritum cum vino bibunt, quidam eodem modo contritum super vulnus imponunt; quidam super prunas eo imposito vulnus suffumigant; & carbonem ejus super vulnus deligant; quidam *allium cum ruta mistum oleoque contritum* adbibent. “ Sed præ reliquis externis, quemadmodum

„ modum axungia viperina morsum viperæ sanat,  
 „ ita *oleum scorpionum* eorundem ictui medetur .  
 „ Interna eadem sunt ac in aliis venenatorum ani-  
 „ malium moribus .

*Art. 1628.* Bufo sive rubeta est animal veneno plenum , ut non immerito *terrestriis toxicis & contagiosæ virulentia bursa* appelletur . Maximo in hominem odio est *bufo* , & vicissim in *busonem homo* . Et si bufones dentibus careant , gingivistamen , quas perduras & scabras habent , partem cui adhæserint , sic arctè constringunt , ut venenum suum in partem indeque totum corpus per constrictionis partis poros adigant . Venenositas *busonum* non videtur in alio consistere , quam vel in eorum furore , vel in eorum excrementis , speciatim urina acri caustico volatili sale imprægnata , quam acrimoniam obtinere videtur ex alimentis , nempe minutulis istis *scarabæis* , qui in eorum ventriculo & collo reperiuntur : bufones enim mortui omni veneno carere dicuntur , Venenum suum mictu , saliva & vomitu in herbas eructant , præsertim verò in *fraga* , quæ vehementer appetere dicuntur . Busonum venenum non modo intus ingestum perniciæ est , sed etiam *cuti aspersum* , nisi locus statim urina vel aqua salsa abluatur .

Bufo.

Busonis  
veneni ef-  
fectus &  
curatio .

*Art. 1629.* Admisso busonis veneno ægri flaves-  
 cunt , toto corpore intumescunt , labris linguaque  
 nigricantibus balbutiunt , dyspnœa asthmatica cor-  
 ripiuntur , vomitu , sudore frigido , vertigine ,  
 convulsione , syncope , & tandem morte prehen-  
 duntur . Ideoque procurare *vomitum* quamprimum  
 medicum oportebit , præsertim si venenum ore sum-  
 ptum fuerit , *clysterem* injicere , veneni vim omni-  
 bus *alexiteriis calidis & attenuantibus* infringere ,  
 ut *Theriaca & Mithridatio in vino generoso disso-*  
*lutis* ; tandem verò *balneis æstuariis* , & valido  
 multoque exercitio ipsum digerere .

*Art. 1630.* Cantharides extra corpori applica-  
 O o tæ in-

Canthari-  
dei .



te interdum vesicæ nocent, stranguriam faciunt; immò sanguinis mictionem excitant. Intus sumptæ omnes ferè ab ore ad anum usque humani corporis partes internas arrodunt, inflammant, atque exulcerant, undè febris ardens; in ore resinæ cedri vel pini sapor percipitur; imprimis verò partibus urinæ dicatis sua natura infensæ sunt, unde in illis ardorem inflammatorium, excoriationem, penis continuam erectionem, cruentam & dolorificam stranguriam, vel omnimodam ischuriam excitant, quæ tandem vasorum urinariorum gangræna & ipsa mors consequuntur.

Curatio. *Art. 1631.* Ad curam primo loco opera danda est, ut *Cantharides* e corpore quamprimum ejiciantur, idque per *vomitorium* cum aqua tepida vel jure pingui; *clysteres* quoque ex diluentibus & oleosis injiciendi sunt; ad acrimoniam etiam obtundendam æger copiosè bibat *lacticeina*, *emulsiones*, *oleosa*, & *mucilaginosæ*; commendatur etiam *terra Lemnia*, & præ omnibus aliis (attestante D. Gronvelt) *camphora*.

Venena mechanica. *Art. 1632.* Pulvis *adamahtis*, *crystalli*, *vitri*, *metallorum variorum limaturæ*, & similia dici possunt *venena mechanica*, quæ intra corpus admiffa, quasi tot *cultelli*, viscera lancinant & incidunt; atque ita mortem vel subitanæam vel lentiorẽ inducunt, artemque nostram illudunt.

Venena distillatoria. *Art. 1633.* Superest adhuc alia venenorum familia, nimirum *spiritus vinosi* & *potus inebriantes stillatitii*, horum enim nimis frequens & profusa ingurgitatio (uti pessima consuetudo obtinet) tot hominum *Myriades*, quot sunt in cœlo *stellæ*, trucidavit; immò plures *decies centenis milibus* ex hoc quam ab omnibus reliquis quocunque venenis occubuerẽ, minimè dubitandum est; unde hoc malum perniciosissimum vocare soleo *κατ' ἔχον* *The Harm*, jecone an serio dicam. Quamplurimis non tantum morbos gravissimos parit,

rit, sed aliquando etiam quibusdam ipsam mortem subito affert; quo nomine, si non *veneni* appellationem mereatur; quo alio id possit; ego saltem assequi vel conicere nequeo. (vid. *Art.* 1572. 1573.) Spiritus vini intus sumptus omnibus fere animantibus vitam adimit; immò vegetabilibus quibuscunque more. pabuli exhibitus, *ne parente vite exempla*, mortem infert.

*Art.* 1634. Ingratum onus medicis generosis incumbit. Istiusmodi spirituum ardentium *helluones* noctes atque dies juxta suum cacoethes detestabile ignem liquidum perpetuo pitissantes; quum coctiones omnes delerunt, solida universa enervarunt, & liquida corruerunt; cum fabrica jamjam diu vacillans collapsura est, nostram opem petunt. Quid fit? *Scabinorum* munere fungendum est; & forte fortuna exantratione peracta; & lasanis ac scaphiis in sentinam decapulatis; & labbe quodammodo refarcita rursus actum agere statim satagunt, &, ut canis immundus vel amica luto sus, ad sordem & illuviem se protinus recipiunt; atque ita vitæ suæ non inopes; sed prodigi, quam non acceperunt illam faciunt brevem. Quid faciamus *Medici* vel quid faciant *Theologi*? medicamenta nihil valere possunt, & consiliis auscultare nolunt. Omnia incassum erunt, in impii veneni amplexus ruunt, stupidi & occæcati evadunt, rationibus & consiliis *marpeffe cautibus* surdiores; in æternum sitiunt, & sitientes bibunt quasi *dipsade morfi*, & quo plus potæ plus sitiuntur aquæ, *aquæ istæ stillatitiæ mortiferæ*, quibuscum, qua festinatione possunt, scenam claudunt in ipso mortis articulo *lagenam exposcentes*. Pro Dolor!

*Art.* 1635. O beatam temperantiam! nunquam satis laudandam, nunquam satis admirandam! primævæ ætatis, quam fecisti auream, *decus & tutamen*! tui ipsius suadelam utique & pretium! læ-

Malum  
vix cura-  
bile.

Encomi-  
st temperan-  
tiam.

tis aliquando *Saturni* temporibus visam! puris piis-  
isque animis in omni ævo cultam usque & colendam. Tu es, si quod uspiam in terris, *verum Archæi sedativum*, & conservatrix mentis sanæ in corpore sano. Tu recta deducis tui cultores ad longam & jucundam senectutem vultu placido & juvenili, grato & amabili. Tu denique tui ipsius inimicorum laudibus ornaris, & amabilis etiam ab ipsis dicaris, quibus, te imprudentissimè repudiata, manet *Satyrici maledictio*, ut, *virtutem hanc videant intabescantque relictæ*.


## JUDICIUM de DEFUNCTO VENENATO.

Judicium  
de defun-  
cto Venenato.

*Art. 1636.* Adumbratis sic pro instituti ratione venenorum ( præcipuorum saltem ) natura, agendi modo, & medendi methodo; operæ præ-  
tium erit paucis attingere, *quomodo Medicus suum judicium ferat*, si quando vocatus fuerit ad defuncti cadaver inspiciendum, ubi ex repentina morte & aliis circumstantiis de veneno clanculum dato inciderit suspicio. Hoc autem ex supradictis magna ex parte ediscendum est, si ad singula venenorum genera probè attendatur. Testimonia eminentiora hominis veneno corrosivo metallico vel vegetabili enecati, sunt, quæ sequuntur, *externus superficiei tumor, maculeque nigrae, fuscae, vel lividae, linguae tumor nigricans, ungues nigri, vel lutei, facilè labentes, capillorum spontaneus manipularisque casus*. In aperto cadavere *viscerum livor, colorque citrinus, vel nigredo, ventriculi ac intestinorum gangraenæ & sphacelli*; hæc sunt manifesta veneni indicia, si adfuerint signa antegressa, nimirum *vomitibus perpetuis, tormina, alvi dejectiones cruentæ, urinae ardores, oscitationes, convulsiones, syncope, sudores frigidi, palpitatio cordis, obmutescencia, & alia id genus dira symptomata in superioribus passim enumerata*.

Narco-

Narcotica & opiata ( quantum ego scio ) nullum omnino externum sui signum relinquunt , præter *horridum oculorum obtutum* ; signa antegressa in *Art. 1595.* recensentur . Sed in iudicio ferendo ex signis supradictis summam inter prudentiam & edicendi parsimoniam medicus versari necessum habeat : namque ea omnia indicia , quæ ex erosio-  
ne per venenum visceribus colligi poterint , ex humore acri intra ipsum hominem generato fieri queunt . Consultius proinde erit , reum , nullo certo ipsum convincente argumento , accusati criminis absolvere , quam insontem morti adjudicare , quod jura divina & humana voluisse patet : dantur tamen interdum casus tam extra dubium positi , ut alia ratione judicandum esse necesse sit .



## E P I L O G U S .

**A**Tque jam tandem ventum est ad umbilicum , Equum est igitur , ut lector benevolus seridè admoneatur hæc commentariola negligenter , confusè , ruditer , ac memoriæ tantùm causa , usui privato primariò , conscripta fuisse : & nullus dubito , quin omnes ferè , qui in praxi medica aliquandiu versati fuerunt , præstantioribus adminiculis ex propriis adversariis suppeditentur ; sed quoniam rerum facies obscurâ multò major est quam illuminata ; & de rebus non omnes eodem modo cogitamus ; haud incongruum mihi videtur alios fructum aliquem ex hisce meis laboribus percepturos esse , sicut invicem ego me ex aliorum lucubrationibus uberrimum emolumentum consecutum esse libenter agnosco .

De unico tantùm me hoc loco hortari sufficiat ; scilicet , ne quis brevibus hisce stricturis nimiam fidem adhibeat , sed potius authores ipsos ubicunque consulat : nam in transferendis eorum sententiis verisimile est me frequenter errasse , aut saltem sensum obscurè aut imperfectè tradidisse . *Dulcius ex ipso fonte bibuntur aquæ .*

Deus optimus maximus , quo tanquam fonte æternum inexhausto omnia bona ac fausta continuo descendunt , a cujus gratia felix medicæ artis successus , præ aliis quibuscunque , jugiter pendet , his , quæ sincero animo ex aliorum operibus fideliter collegi , & quæ ex observatione propria & experientia scripsi pro sua bonitate favere dignetur , quo in publici commodum , privato semper anteferendum , cedant .

Δόξα τῷ ἐν ὑψίστοις Θεῷ .

Typogra-



## *Typographus ad Lectorem.*

**B**REVITATIS causa, ne Liber in molem nimis ingentem cresceret, remediorum formulas, in impressione priori editas, *Pharmacopœia Londinensis, Bateana, & Fulleri*, nemini ferè, ut credidit, ignotas, earundem nuda solummodò recitatione facta, authorumque designatione, in tertia hujus Operis editione omittendas duxit Author, Cum autem omissio ista non parum incommodi Lectoribus afferat, qui usum remediorum hic discunt, formulas vero aliunde quærere coguntur, & sæpe deficientibus citatis libris habere non possunt; formulas ipsas describendas curavi, relicta tamen Authorum designatione, ut si forte aliquis typographicus error irrepit, facile corrigatur, utque cum libris a quibus desumuntur, si cui libeat, conferri queant. Aliquas Author ipse Operi suo inseruit, hasque, indicatis articulis ubi leguntur, non repetendas judicavi.

Sciat itaque Lector, quod per literam capitalem B. Pharmacopœia Bateana designetur, & per reliquas literas initiales, ut infrà, indicantur Authorum nomina, viz.

B. Pharmacopœia Bat.	Mu. Musgrave
Bar. Barbette	P. Pitcairnius
Bo. Boerhaave	Pu. Purcell
D. Diemerbroeck	P. L. Pharm. Lond.
E. Ettmüller	R. Radcliff.
F. Fuller	S. Sydenham
G. Greenfield	Syl. Sylvius.
H. Harris	T. Turner
L. Lister	VV. Vvillis
M. Morton	

*Acetum Pestilentielle . B.*

℞. Rad. angel. zedoar. ana ℥j. bacc. junip. ℥ij.  
rut. M. iij. acet. opt. ℔iij. macera, ac cola. *Pro*  
*suffitu, & oris collutione grassante peste.*

*Æthiops mineralis . B.*

℞. Fl. sulphur. p. ij. mercurii. crud. p. j. exa-  
ctils. mixta incende, ut f. Pulvis nigerrimus f. a. *Usus*  
*in LucVenerea, Hydrops, &c. Ptyalismum non movet.*

*Aluminatum . B.*

℞. Succ. limon. ℔j. alumin. ℥β. coque & de-  
spuma. *Valet in rubore faciei, pustulis, &c.*

*Antihæcticum Poterii . B.*

℞. Fit ex regul. antimonii martiati & stan. an-  
gl. ana, colliquatis cum triplo nitr. detonatis, &  
aqua edulcatis f. a.

*Apozema Diureticum . G. Vide Art. 735.**Aqua Balsamica . F.*

℞. Heder. terrest. marthub. alb. hyssop. puleg.  
ana M. iij. Rad. enul. irid. florent. ana ℥ij. tere-  
binth. vener. (cum ol. tart. dissolut.) ℥iv. lact.  
℔vj. sp. vin. ℔β. destillentur in arena. *Apprimè*  
*convenit in tussi pulmonali & phthisi incipiente.*

*Aqua Benedicta . B.*

℞. Calcis viv. elect. ℔j. superaffund. aq. fluvial.  
bullient. ℔viij. post debitam ebullitionem & resi-  
dentiam filtra ad usum.

*Aqua*

*Aqua Cosmetica . P. Art. 1147.*

*Aqua Divina Fernelii . Art. 1147.*

*Aqua Limacum scorbutica . F.*

℞. Limac. cum testis contus. ℥iij. cort. aurant. recent. ℥iij. herb. becabung. nasturt. aquat. aparin. ana M. iij. ser. lact. ℥vj. fiat distillatio , &c.

*Aqua limacum pectoralis . F.*

℞. Limac. contus. ℥iij. mic. panis alb. ℥xij. nuc. mosch. ℥vj. herb. heder. terrest. M. vj. ser. lact. ℥vj. distil.

*Aqua omnium florum . B.*

℞. Fit ex stercore vaccino Maio collect. cum vin. alb. 3ia parte distillato , vel ex stercore vaccin. & limac. cum testis contus. distillatis .

*Aqua Ophthalmica Sapphirina . B.*

℞. Fit ex aqua calcis viv. ℥j. salis armoniac. ℥iij. in pelvi ænea maceratis , donec colorem sapphirinum acquirant . In quamplurimis oculorum affectibus valet .

*Aqua Prophylactica . Art. 192.*

*Aqua Scelotyrbica . F.*

℞. Rad. raphan. sylv. ari , cort. aurant. recent. ana ℥iij. herb. cochlear. hortens. persicar. ana M. iv. nasturt. aquat. becabung. sal. menth. ana M. iij. nuc. Mosch. ℥iij. cerevis. annos. ℥xij. distill.

*Aqua*

*Aq. Theriacalis. D. Art. 192.*

*Arcanum Cosmeticum. B.*

℥. Talchi ven. subtilissimè pulv. p. j. ol. camphor. p. j. digere in B. M. ad summam albedinem,

*Aurum Fulminans. B.*

Fit ex auro in aqua reg. solut. & cum oleo tart. præcipitat. edulcando, siccandoque, f. a.

*Aurum Mosaicum. B.*

Fit ex stanno, mercurio, sale armoniaco, & sulphure mixtis & sublimatis f. a.

*Balneum Psoricum. Bar.*

℥. Rad. lapath. acut. brion. ana ℥vj. fol. fumar. m. vj. flor. cham. M. iij. furfur. ℔j. sulphur. crud. ℥ij. nitri ℥j. alum. ℥ss. sal. commun. ℥ij. aq. font. q. f. ad balneum.

*Balsamum Rhamelii.*

℥. Sapon. venet. ℥ij. camphor. ℥ij. ad ℥ss. sp. vin. q. f. f. a. balsamum.

*Balsamum Saturninum. B.*

Fit ex sacchar. saturn. ℥iv. spir. terebinth. ℥xij. f. a. digestis,

*Balsamum sulphur. Anisatum. B.*

℥. Flor. sulphur. p. j. ol. Anis. p. iv. digere (lenissimè)

PHARMACOPOEIA, 587  
nissimo calore ) donec sulphur solvatur , ut fiat  
balsamum rubicundum .

*Bezoarticum mineral. B.*

Fit ex butyro antimonii ℥j. & sp. salis ℥iij. vel  
q. s. mixtis & ternis cohobis distillatis .

*Bolus ad Casum . F.*

℥. Sperm. cet. ℥j. sal. volat. CC. gr. v. balsam.  
peruv. gr. v. theriac. ven. ℥β. syr. de mecon. q. s. m.

*Cataplasma Anginosum . F.*

℥. Ficum ℥iv. alb. canis ℥β. flor. sulph. piper.  
long. ana ℥j. sp. vin. commun. ℥ij. ol. absynth.  
chym. gt. xvj. diacod. q. s. m.

*Cataplasma de Cymino . F.*

℥. Cepar. sub. ciner. assat. ℥β. croc. gr. xv. ol.  
succin. gt. xij. pulv. sem. cymin. ungt. dialth. ana  
℥iij. m.

*Cataplasma de Halecibus . F.*

℥. Rad. brion. alb. ℥ij. sapon. nigr. ℥iij. carn.  
halee. ( vel encrasicularum ) ex muria ℥iv. sal. com.  
℥β. m.

*Cataplasma Hydropicum . F.*

℥. Sterc. bovin. recent. ℥ij. bacc. laur. pulv. ℥β.  
rad. brion. alb. rec. ℥j. sem. cymin. pulv. flor. sulph.  
ana ℥iv. cum aq. calcis [ vel , lixiv. fort. ] s. cata-  
plasma addendo axung. porcin. ℥iv.



*Cataplasma ex nido Hirundinis . Art. 207.**Cataplasma de Ovis . F.*

℞. Vitel. ov. ad duritiem coct. N. iv. ol. succin. ℥ij. sem. lin. q. s. m.

*Cataplasma Pestilentielle . B.*

℞. Stercor. columb. ℥iv. eroc. ℥ss. mithridat. theriac. Lond. sem. sinap. ana ℥j. tereb. q. s. m. *Pro bubonibus rumpendis .*

*Cataplasma de Pomis . F.*

℞. Pulp. pom. [ non auster. ] assat. ℥j. panis alb. ( in lact. coct. & express. ) ℥ss. alb. ov. j. troch. alb. rhas. pulv. ℥ij. m.

*Cataplasma de Rapis . F.*

℞. Rad. rapar. in furno coct. ℥viii. herb. rut. contus. M. iv. sem. sinap. contus. ℥ij. ol. junip. ℥ij. unguent. nervin. q. s. m. f. cataplasma pulv. euphorb. aspergend.

*Cataplasma foleare . B.*

℞. Fol. rut. virid. ℥ij. rad. brion. rec. ℥iv. ferment. acerrim. sal. sapon. nigr. ana ℥ss. mustard. ℥iiij. contus. ad acet. q. s.

*Cataplasma stomachicum . F.*

℞. Theriac. ven. ℥vj. cinnam. garyoph. pulv. ana ℥j. ol. cinnam. menth. gt. vj. absynth. gt. ij. acet. q. s. m.

Ca-

*Cataplasma Suppedale. Mu. Art. 934.*

*Ceratum de Lapide calaminari. T.*

℞. Butyr. recent. mense Maii collect. insals.  
cer. citrin. ana ℥iijß. ol. oliv. puriss. ℥iv. lapid. ca-  
lamin. select. subtilissimè trit. & cribrat. ℥ij. 3x. li-  
quescant cera & butyrum super ignem lentum una  
cum oleo, & colatis statim insperge pulverem gra-  
datim continuo agitando mixturam è fundo vasis,  
donec frigescere incipiat, & pulvis non amplius sub-  
fidere possit.

*Cerevisia ad Cancrum. F.*

℞. Lign. guaiac. 3iv. sassafr. rad. farsap. oxylap.  
filipend. cynoglos. cort. jugland. ana 3ij. herb. Ro-  
bert. Lamii, ana M. iv. milleped. pint. j. præp. pro  
cong. iv. cerevis.

*Cerevisia de Dauco. F.*

℞. Sem. dauc. sylv. 3vi. passul. maj. 3xij. f. saccul.  
pro cong. iv. cerevis.

*Cerevisia Hydropica. F.*

℞. Ciner. genist. cribrat. ℥ß. rad. raphan. sylv.  
3iv. irid. florent. calam. arom. enul. ana 3ij. lign.  
guaiac. sassafr. bacc. junip. sem. dauc. sylv. ana 3j.  
sem. sinap. 3ij. præp. pro cerevis. cong. iv.

*Cerevisia Hysterica. F.*

℞. Rasur. lign. buxi ℥ß. fol. visc. querc. concis.  
M. iv. coq. in cerevis. nov. cong. vj. ad iv. & in do-  
liolo suspend. saccul. seq.

℞. Rad.

℥. Rad. pæon. mar. recent. ꝑß. brion. alb. ℥iv. herb. artemis. melis. ana M. vj. puleg. rut. ana M. ij. sem. dauc. sylv. angel. ( vel pastin. sylv. ) ana ℥ij. rasur. stanni ( in nod. ligat. ) ꝑß. præp. s. a.

*Cerevisia Ictérica. F.*

℥. Ras. ebor. ℥j. marhub. alb. M. iv. coq. in cerevis. nov. cong. vi. ad iv. colatur. suspend. saccul. seq.

℥. Rad. oxylap. ꝑß. curcum. rub. tinct. ana ℥ij. urtic. ℥iv. herb. chelidon. maj. aparin. fragar. cum toto, cort. berber. ana M. iv. sterc. ovil. ( in nodul. ) ℥iv. milleped. viv. pint. j. limatur. chalyb. ꝑß. j. præp. ut artis est.

*Cerevisia melanagoga. Art. 443.*

*Cerevisia ad Melancholiam. Art. 443.*

*Cerevisia Purgans Hydropica. F.*

℥. Rad. irid. nostrat. ℥iv. raphan. sylv. ℥ij. enul. seil. ana ℥j. sem. sinap. bacc. junip. lign. sassafr. ana ℥ij. cort. venter. ℥ß. cort. interior. sambuc. ebul. ana ℥ij. sen. ℥iv. rad. hellebor. nigr. jalap. agar. ana ℥ß. præp. pro cong. iv.

*Cerevisia ad Rachitidem. F.*

℥. Rad. osmund. reg. ( vel ejus. defectu filic. mar. ) glycyrrhiz. lign. sassafr. ana ℥j. cort. fraxin. heder. arbor. ana ℥ß. summit. tamarisci herb. ling. cervin. ana M. iv. milleped. viv. N. 250. passul. sol. ℥iv. præp. saccul. pro cong. j.

*Cerevisia Scorbutica. F.*

℥. Summit. Pini ( vel Abietis ) M. iv. coq. in Cerevis. nov. generosissimæ cong. v. ad iijß. in doliol. reposit. affunde Succ. Becab. Nasturt. aq. Tarax. Aparines ana ℥j. Fermentescant simul cum sacculo seq. immisso. ℥. Rad. Oxylap. ℥iv. Sarsæ, Chinæ, Bac. junip. ana ℥j. Raf. Sant. citr. & rub. CC. Eboris, Glycyrrh. Sem. Fœnic. dulc. ana ℥j. Herb. Ling. Cerv. Hepat. Agrimon. Hed. terr. ana M. ij. Antimon. crudi ℥j. Præp. s. a.

*Cerevisia ad Scrophulas. F.*

℥. Rasur. guaiac. sassafr. cort. jugland. arbor. rad. oxylap. filipend. cynogloss. ana ℥ij. herb. geran. Robert. Lamij, ana M. iv. passul. sol. ℥j. milleped. viv. pint. j. præp. pro cong. iv.

*Chalybs sine acido. B.*

Paratur humectando limaturam martis decies sale absynth. in aq. cichor. solut. & siccando in aere sicco ac tepido, postea s. pulv. subtilissimus.

*Chalybs Tartarizatus. B.*

℥. Limatur. mart. mund. tarta. alb. pulveris. ana ℥vj. aq. fumar. q. s. f. massa coq. in vase fictili in clibano [ calore lento ] ad siccitatem. f. pulv. deind. add. aq. fumar. ut ante & coq. iterum ut ante, & ad 3iam vicem, & postremo s. pulv. ad usum reservand.

*Cinnabaris Antimonii. B.*

Fit sublimando caput mortuum post distillationem butyri antimonii relictum, & rectificando s. a.  
Col-

*Collyrium Boyleanum.*

℥. Aq. rorismarin. ℥ij. aloë subtilissimè pulv. ℥ss. vitriol. alb. vitr. antimon. croc. metallor. ana ℥vj. digere leni calore per mensem; decantetur liquor purus: *In omnibus serè oculorum affectibus vix datur par remedium.*

*Collyrium certum. R.*

℥. Aq. plantag. euphras. ros. ana ℥j. trochisc. alb. rhas. ℥ij. lapid. tut. ℥ij. vitriol. roman. gr. ij. m. pro collyrio.

*Decoctum amarum febrifugum. M. Art. 36.**Decoctum catechu compositum. F.*

℥. Rasur. guaiac. sassafr. ana ℥iij. santal. citr. & rub. ana ℥ij. terræ Japon. pulv. ℥ss. glycyrrhiz ℥j. salv. sicc. M. j. coq. in aq. hord. ℥iij. ad ℥ij. colatur. add. diacod. ℥ij. ol. anis. gt. j. m.

*Decoctum Coccineum. F.*

℥. Nitri ℥j. sacchar. alb. ℥iv. coccinel. gr. xvj. f. pulv. qui conjiciatur in aq. font. (vel potiùs decoct. alb.) bullientis ℥ij. coq. & despuma, & per residentiam depuretur.

*Decoctum Ictericum. F.*

℥. Rad. curcum. rub. tinct. ana ℥j. herb. chelidon. maj. cum toto M. ij. lumbric. mundat. N. xx. coq. in aq. & vin. rhenan. ana ℥ss. ad ℥ij. colatur. add. tinct. croc. (aq. theriac. parat.) ℥j. syr. e 5. rad. ℥ij. m.

*Deco-*

*Decoctum Incrassans . F*

℥. Gum. arab. crassè pulv. ℥iij. coq. in aq. hord. q. s. ad ℔ij. colatur. add. syr. de alth. ℥iij. m.

*Decoctum ad morsum canis rabidi . B.*

℥. Fol. rut. ℥vj. rad. alii. theriac. Lond. ana ℥iv. limatur. stanni ℥iv. cerevis. illupulat. veter. ℔iv. coq. ad consumption. dimid. & macera, & cola. *De-morsus capiat coch. vj. bis die per dies ix. & applicetur magma loco affecto.*

*Decoctum Nephriticum . F.*

℥. Rad. alth. ℥ss. liquirit. ℥ss. herb. virg. aur. M. ij. alth. parietar. ana M. j. fic. N. iv. bac. junip. sem. petrosel. macedon. bardan. milii sol. ( sub med. co-ction. addit. ) ana ℥j. coq. in liquor. possët. vin. alb. alterat. ℔iij. ad tertiæ partis consumption. colatur. add. syr. de alth. ℥iij. vel iv. m.

*Decoctum Nigrum . Art. 48.**Decoctum Phthisicum . F.*

℥. Flor. bellid. maj. M. j. limac. mundat. N. iij. rad. eryng. condit. ℥ss. hord. perlat. ℥iij. coq. in aq. font. ℔iiss. ad ℔j. cola.

*Decoctum Sistens . F.*

℥. Pulv. bol. armen. ℥j. cret. puriss. ℥iij. coq. in aq. font. ℔iij. ad ℔ij. colaturæ per resident. depurat. add. diaseord. ℥ss. aq. cinnam. fort. syr. cydon. c. ros. sicc. ana ℥ij. ol. nuc. mosch. gt. ij. m.



*Decoctum ad Sitim . B.*

℞. Fol. acetos. M. ij. coq. in aq. font. q. s. ad ℥ij. colatur. add. succ. 12. limon. vin. rhenan. ℥ij. sacchar. alb. q. s. ad gratiam , m.

*Decoctum Stypticum . F.*

℞. Rad. urtic. consolid. maj. ana ℥ss. herb. millefol. plantag. ana M. j. cort. granat. gum. arab. ana ℥ij. sem. papav. alb. hyosciam. ana ℥iij. coq. in aq. font. ℥iij. ad ℥ij. colatur. add. syr. de ros. sicc. ℥iv. sacchar. saturn. ℥j. croc. mart. astring. ℥iv. m. dos. ℥iv. bis in die.

*Decoctum Variolosum . F.*

℞. Rad. scorzoner. ℥ss. glycyrrhiz. ℥ss. fic. N. viij. passul. sol. exacinat. ℥j. ras. C. C. ℥ij. coccinel. ( integ. sub finem add. ) ℥iv. coq. in aq. hord. ℥iij. ad ℥ij. colatur. add. syr. garyoph. limon. ana ℥j. m.

*Decoctum Ulmi . B.*

℞. Cort. interior. ulmi rec. ℥iv. coq. in aq. font. ℥iij. ad dimid. colaturæ rubicundæ ( instar vin. rubelli ) add. syr. de rub. Idæ & de mor. ana ℥ss. m. s. gargarism. elegantiss.

*Electuarium contra Abortum . F.*

℞. Conserv. ros. rub. cydon. nuc. mosch. cond. succ. chermes , syr. cydon. syr. e coral. ana ℥ss. spec. de hyacinth. ℥iij. aromat. ros. croc. mart. astring. ana ℥ij. sacchar. saturn. ℥j. ol. nuc. mosch. gut. iv. m.

*Ele.*

*Electuarium Boyleanum . F.*

℞. Sem. papav. alb. pulverifat. hyosciam. alb. ana  
℥ss. syr. papav. errat. conserv. ros. rub. ana ℥ss. m. f.  
elect. dos. quant. jugland. bis in die.

*Electuarium Cephalicum . F.*

℞. Rad. pæon. mar. pulv. ℥ss. cran. human. cin-  
nab. antimon. ana ℥ij. nuc. molchat. condit. ℥ss. syr.  
pæon. comp. ℥ij. ol. rorismarin. salv. ana gr. iv. m. f.  
electuarium .

*Electuarium Chalybeatum . Pu. Art. 405.*

*Electuarium de Colophonia . F.*

℞. Conserv. flor. Lamij. alb. ℥ss. diascord. zin-  
zib. condit. pulv. colophon. ana ℥ss. ol. cinnam. gut-  
iv. syr. e ros. sicc. q. s. m.

*Electuarium Epilepticum . B.*

℞. Sterc. albissim. pavon. siccat. rad. pæon. mar.  
ana ℥ij. rad. valerian. ℥j. sem. pæon. excort. ℥ij. car-  
vi ℥ss. pulverifatis add. mel. anthosat. q. s. m. f. elec-  
tuarium .

*Electuarium Hydragogum . Syl. Art. 825.*

*Electuarium Hystericum . F.*

℞. Conserv. attriplic. olid. ℥iv. ol. succin. gut-  
48. m.

*Electuarium Martis. F.*

℥. Conserv. absynth. roman. cochlear. hortens.  
ana ℥iij. zinzib. cond. ℥ss. rubig. chalyb. [ in sub-  
tilem pollinem redact. ] ℥vj. ol. caryoph. ol. assafr.  
ana gut. vj. syr. e s. rad. ℥j. m.

*Electuarium Peruvianum astring. F.*

℥. Cort. peruv. pulv. ℥j. bals. de tolu, terr. ja-  
pon. pulv. ana ℥j. syr. Boyleanum q. s. m. f. elect. pro  
dos. x.

*Electuarium Peruv. epilepticum. F.*

℥. Cort. peruv. pulv. ℥vj. rad. serpent. virgin.  
pulv. ℥ij. cum q. s. syr. pæon. comp. f. elect.

*Electuarium Stypticum. F.*

℥. Conserv. ros. rub. ℥iij. croc. mart. astring. ℥iij.  
sacchar. saturn. ℥j. syr. cydon. vel e ros. sicc. ℥ss. m.  
f. elect.

*Electuarium e zinzibere. F.*

℥. Conserv. ros. rub. ℥iij. zinzib. cond. ℥j. ol. cin-  
nam. gut. iv. ol. garyoph. gut. ij. m.

*Emplastrum Cephalicum. F.*

℥. Empl. de beton. ℥ss. gum. caran. tacamah.  
ana ℥iij. bals. totulan. ℥j. bals. peruv. vel capiv. ℥j.  
f. empl.

*Emplastrum Ischiaticum . F.*

℥. Pic. Burgund. ℥ij. galban. ℥j. sulph. viv. ℥ij.  
succin. ℥j. hermodact. rad. ireos florent. sem. cymin.  
flor. cham. ana ℥ss. petrol. q. s. m. f. empl.

*Emplastrum Mamillare . B.*

℥. Sperm. cet. ℥j. cer. alb. ℥ij. galban. acet. o præp.  
℥ss. ol. sambuc. q. s. f. empl.

*Emplastrum Pleuriticum . F.*

℥. Empl. paracel. de sapon. ana ℥j. unguent. po-  
pulo. ℥ss. camphor. ℥iij. m. liquefiant lento igne per  
perud agitando cum spatula ; quando frigesce in-  
cipiant , addatur camphora & f. empl. molle .

*Emplastrum de Pyrethro . F.*

℥. Galban. colat. sagapen. ammoniac. ( vin. alb.  
solut. & colat. ) ana ℥j. pulv. rad. pyreth. sem. sinap.  
ana ℥ss. tereb. ven. q. s. m.

*Emplastrum Roborans . F.*

℥. Empl. stomach. magistral. ℥iij. oxycroc. ( ri-  
tè præp. ) ℥ij. gum. caran. tacamah. ana ℥j. balsam.  
tolutan. ℥ij. bals. peruv. ℥j. ol. cinnam. garyoph. nuc.  
mosch. ana gut. ij. menth. absynth. ana gut. j. f. empl.

*Emplastrum Smeeticum . B.*

℥. Minii ℥ss. ol. oliv. ℥ij. sapon. alb. ℥iv. ceræ  
℥ij. coq. f. a. & f. empl.

*Emplastrum ad Strumas. 1. B.*

℞. Empl. de cicur. cum ammon. ℥iv. gum. elem.  
 ℥β. mercur. sublimat. corrosiv. ℥x. m. f. empl.

*Emplastrum ad Strumas. 2. Bar.*

℞. Empl. de ranis cum mercur. ℥β. galban. ℥ij.  
 sacchar. saturn. sal. volat. ammoniac. ana ℥β. ol. rub.  
 q. s. f. empl.

*Emulsio Asthmatica. F.*

℞. Milleped. viv. N. 120. contus. sensim affund.  
 aq. puleg. ℥vj. in liquore fortiter expresso dissolv.  
 gum. ammoniac. ℥ij. colatur. add. tinct. benzo. ℥ij.  
 m. dos. coch. j. ex haust. decoct. pectoral. saepe in die.

*Emulsio Brunneri. F.*

℞. Gum. ammoniac. ℥β. dissolv. (in mortar.)  
 in aq. hyssop. frigid. ℥iv. & vin. rhenan. ℥ij. colatura  
 fit pro haust. ij. urgente suffocationis periculo in asth-  
 mate capiend.

*Emulsio Pæoniata. B.*

℞. Sem. pæon. decort. ℥j. contus. affund. aq. rut.  
 ceras. nigr. pæon. comp. ana ℥vj. f. emulsio, add.  
 sacch. perlat. q. s.

*Emulsio Styptica. F.*

℞. Rad. consolid. maj. ℥iv. coq. in aq. font. ℔ij.  
 ad ℔ij. cum colatura & sem. papav. alb. hyoscyam.  
 amygd. dulc. excort. ana ℥β. sal. prunel. ℥β. sacchar.  
 saturn. ℔j. & sacchar. alb. ℥j. f. emulsio.

Enc-

*Enema acre. Bo.*

℞. Pulv. colocynth. ℥ss. fol. tabac. ℥ss. coq. in aq. font. q. s. ad ℥x. admisce sal. gem. ℥ij. f. enema.

*Enema amarum. F.*

℞. Rad. serpent. virg. contus. ℥j. pulp. colocynth. (in nodulo ligat.) ℥j. herb. tanacet. summit. sabin. ana Mss. coq. in aq. font. q. s. ad ℥vj. colatur. add. ol. hyperic. ℥ss. ol. absynth. chym. ℥ss. spec. hier. picr. ℥ss. m.

*Enema Apoplecticum. F.*

℞. Rad. pyreth. ℥ss. herb. rut. Mij. pulp. colocynth. (in nodul. ligat.) ℥ss. coq. in aq. font. q. s. ad ℥xij. colatur. add. infus. croc. metallor. ℥ij. tinct. castor. ℥ss. ol. succin. sal. gem. ana ℥ij. f. enema.

*Enema Balsamicum. E.*

℞. Rad. alth. ℥j. herb. malv. parietar. mercurial. ana M. j. sem. lin. ℥ss. coq. in q. s. aq. font. ad ℥xij. colatur. add. tereb. vitel. ov. solut. ℥ss. ol. lin. ℥ij. elect. lenitiv. ℥j. m. f. enema.

*Enema Emolliens. G. Art. 735.**Enema Febrifugum. F.*

℞. Cort. peruv. subtilissime pulv. ℥ij. coq. multiplici coctione in aq. font. donec redeat ad ℥ss. colaturæ turbidæ add. diascord. ℥ss. ol. anis. gt. j. m.



*Enema Hystericum . F.*

℥. Rad. Aristol. rotund. bryon. alb. ana ℥ss. herb. rut. matricar. pulg. flor. cham. ana M. ss. coq. in q. s. aq. font. ad ℥xij. in colatur. dissolv. asæ foetid. ℥j. ol. succin. ℥ij. sacchar. rub. ℥j. m.

*Enema e quatuor Oleis . F.*

℥. Ol. lin. cham. ana ℥vj. ol. scorpion. ℥ij. tereb. ℥ij. m.

*Enema Terebinthinatum . F.*

℥. Urin. sani ℥ss. terebinth. venet. vitel. ov. solut. ℥j. ol. anis. ℥j. theriac. januens. ℥j. m.

*Enema ad tormina , F.*

℥. Cret. pulv. ℥ss. herb. rut. flor. cham. ana M. ss. coq. in q. s. aq. font. ad ℥v. colatur. add. tinct. castor. diascord. ana ℥ij. syr. de mecon. ℥ss. ol. anis. gut. x. m.

*Enema de Verbasco . F.*

℥. Herb. cicut. hyoscyam. ana M. j. verbasco. flor. sambuc. ana M. ss. coq. in aq. ferrat. q. s. ad ℥xij. in colatura dissolv. vitel. ov. N. j. ol. lin. ℥ij. ol. succin. ℥ss. bals. sulph. ℥ij. m.

*Ens Veneris . B.*

℥. Vitriol. mart. opt. reverberat. & lot. p. i. sal. armoniac. p. ii. sublimentur s. a. cum tribus cohobis.

*Epithema de Calce . F.*

℥. Calcis viv. ℥ii. mellis liquid. q. s. f. mistura aliquando sapo vulgaris addatur.

*Epi-*

*Epithema de saccharo Saturni . F.*

℞. Acet. ꝑss. sacchar. saturn. ℥j. m. *Huic immergatur petia lintea dupla, & frigide cordis regioni applicetur, & quoties tepescet renovetur; ad narium hæmorrhagiam expertus laudo.*

*Epithema Saponaceum . F.*

℞. Spirit. lumbricor. magistr. ℥vj. sp. cochlear. ℥ij. sp. sal. armoniac. ℥vj. sapon. venet. ℥ss. camphor. ℥vj. opii ℥j. croc. ℥ss. digere aliquot dies & cola.

*Epithema Stomachicum . F.*

℞. Sp. vin. camphorat. ℥iv. theriac. androm. ℥ij. ol. garyoph. gut. xvj. ol. nuc. mosch. gut. viij. ol. menth. gut. iv. anis. absynth. ana gut. ij.

*Expressio Asthmatica . F.*

℞. Milleped. viv. N. 128. contus. affund. aq. hyssop. ℥iv. puleg. ℥ij. pæon. comp. ℥j. in liquore expresso dissolv. gum. ammon. gr. xxxij. colatur. add. tinct. benzo. ℥ij. syr. balsam. ℥j. ol. anis. gt. j. sp. sal. armoniac. q. s. ad justum acorem conciliandum. Detur cochleatim in paroxysmo.

*Expressio Diuretica . VV.*

℞. Milleped. viv. tinct. sal. tart. ana ℥ij. contunde & fortiter exprime. *Dos. gt. xl. vel l.*

*Expressio Millepedum Simplex . F.*

℞. Milleped. viv. ℥ij. sacchar. alb. ℥ij. simul con-

contus. affund. vin. alb. ℥j. probe misceantur, & coletur liquor.

*Expressio Millepedum Ictericæ . F.*

℥. Milleped. viv. N. 100. croc. ℥ss. nuc. mosch. 3ß. sacchar. alb. 3ß. contus. affund. aq. chelidon. 3iv. lumbricor. magistral. 3ij. f. expressio.

*Expressio millepedum ad Pertussim . F.*

℥. Milleped. viv. mund. 3ij. pulv. sem. anis. 3j. nuc. mosch. 3ß. sacchar. alb. 3j. contus. affund. aq. pulg. 3vj. bryon. comp. pæon. comp. ana 3j. f. expressio.

*Expressio scorbutica calida . F.*

℥. Herb. cochlear. hortens. nasturt. aquat. beccabung. chelid. maj. ana M. iv. contus. add. vin. alb. ℥ss. aq. raphan. comp. lumbricor. magistr. ana 3iv. f. expressio, cui add. sp. cochlear. 3ij. sacchar. alb. 3ij. m.

*Expressio scorbutica temperata . F.*

℥. Herb. beccabung. nasturt. aquat. tarax. aparin. ana M. iv. mal. aurant. (cum corticibus) N. iv. contus. affund. vin. alb. aq. flor. samb. ana ℥j. per subsidentiam clarificetur & cum sacchar. ad libitum edulectur.

*Extractum Pectorale . F.*

℥. Maltæ opt. cong. iß. aq. cong. ij. f. alæ f. a. cong. j. huic claræ & non fermentatæ add. passul. solis exacinat. & concis. ℥ss. glycyrrhiz. 3j. ter. japon. 3j. coq. donec. ℥iv. sint evaporatæ; postmodum exprimendo coletur; denique (additis coccinel. 3iv.) percoq. ad mellaginem. *Est egregium incrassans.*

*Flores salis Armoniaci martiati . B.*

Fit ex limaturis martis & sale armoniaco ana sublimata.

limatis, aeri exponendo caput mortuum, miscendo cum dimid. quant. sal. armon. siccando, & sublimando s. a.

*Fotus Astringens . F.*

℥. Cort. querc. ℥ij. granat. ℥β. flor. balauſt. ros. rub. ana M. j. coq. in aq. ℥iv. ad ℥ij. colatur. add. vin. rub. Lisbon. ℥β. m. addi possint alum. ℥ij.

*Fotus ad Calculum . G. Art. 735.*

*Fotus ad Hemorrhoidum dolorem . F.*

℥. Rad. cepar. ℥ij. sem. lin. ℥j. herb. hyoscyam. verbasco. linar. millefol. ana M. ij. coq. in aq. font. ℥vj. ad ℥iv. in colatura dissolv. opii ℥ij. m.

*Fotus ad Hemorrhoidum fluxum immodicum . F.*

℥. Herb. verbasco. millefol. plantag. fol. sambuc. ana M. iv. cort. granat. ℥j. coq. in aq. & vin. rub. astring. ana ℥ij. ad tertie partis consumption. in colatura dissolv. alumin. ℥β. sacchar. saturn. ℥ij.

*Fotus lateralis . F.*

℥. Rad. alth. capit. papav. alb. (scif. & cum sem. contus.) ana ℥ij. sem. lin. scœnugr. cymin. bacœ. lauri ana ℥j. herb. malv. matricar. ana M. iij. coq. in aq. ℥vij. ad dimid. cola.

*Fotus Podagricus . F.*

℥. Herb. chamæpit. abrot. ana M. iv. coq. in aq. font. ℥vj. ad ℥iv. in colatura dissolv. sal. tartar. sal. armoniac. ana ℥iv. m.

*Fotus Spirituosus . F.*

℥. Aq. regin. Hungar. ℥vj. sp. lavend. comp. cochlear. ana ℥β. sp. sal. armoniac. ℥β. camphor. ℥v. ol. terebinth. gut. 80. m. digerantur.

*Fotus*

*Fotus Stomachicus . F.*

℥. Vin. rub. ℥j. sp. vin. commun. acet. vin. ana  
 ℥ss. absynth. menth. ana Mss. rad. bistort. ʒss. cort.  
 granat. ʒii. garyoph. mac. nuc. mosch. cinnam. ana  
 ʒj. theriac. ven. ʒss. macerentur clausè in baln. mar.  
 duas horas ; colatura sit pro fotu .

*Fotus ad Tympanitidem . F.*

℥. Nitri ʒij. sal. armoniac. ʒj. sp. vin. tenuiotis  
 multo phlegmate imbuti ℥ij. m. & dissolve in vitro .

*Galbanetum Sennerti . B.*

℥. Gum. galban. p. j. sp. terebinth. p. ij. ol. lavend.  
 p. ss. digere & distilla ex retorta s. a.

*Gargarisma Anginosum . F.*

℥. Herb. aquileg. M. ij. cort. inter. ulmi ʒj. fung.  
 sambuc. glycyrrhiz. alb. canis ana ʒss. coq. in q. s. aq.  
 font. ad ℥ij. in colatura dissolv. sal. armoniac. ʒij.  
 syr. de rub. idæ. mel. ros. ana ʒii. m.

*Gargarisma Commune . F.*

℥. Aq. plantag. ʒx. ros. rub. ʒiij. syr. e mor. ʒij.  
 mel. ros. ʒj. ol. vitriol. q. s. ad aptam aciditatem. m.

*Gargarisma contra Fætores . F.*

℥. Myrrh. ʒij. rad. irid. florent. cyperi calam. a-  
 romat. angel. Hispan. ana ʒj. garyoph. ʒss. flor. ro-  
 rismarin. M. j. infund. clausè & calidè duas horas in  
 aq. font. ℥ss. vin. alb. ʒiv. colatur. add. aq. regin.  
 Hungar. ʒvi. tinct. benzo. ʒij. m.

*Gargarisma Myrrhisatum . I. F.*

℥. Vin. rub. astring. ℥j. myrrh. pulv. ʒij. m.  
 Gar-

*Gargarisma Myrrhisatum* 2. F.

℞. Myrrh. pulv. ℥j. dissolv. in mortar. cum vitel.  
ov. ℥ij. add. mel. ros. ℥ij. vin. alb. ℥ss. m.

*Gargarisma ad Pituitam* . F.

℞. Aq. Hyssop. ℥x. sp. vin. rectificat. ℥j. sp. co-  
chlear. ℥ss. sp. castor. ℥ij. sp. sal. armoniae. ℥iv. pulv.  
rad. pyrethr. ℥i. mel. ℥iv. m.

*Gargarisma Prunellorum* . F.

℞. Cort. prunellor. sylvest. ℥ij. coq. in q. f. aq.  
font. ad ℥ij. in colatura dissolve alumin. ℥iv. aect.  
℥ij. mel. ros. ℥iv. m.

*Gargarisma in Variolis* . S. Art. 134.

*Gargarisma Variolosum* . 1. M. Art. 139.

*Gargarisma Variolosum* . 2. F.

℞. Hord. perlat. glycyrrhiz. ana ℥ss. rad. alth. vicar.  
ana ℥j. ficuum N. xii. fung. sambuc. M. j. coq. in q. f. aq.  
font. ad ℥ij. colatur. add. oxymel. scillit. mel. ros. ana  
℥ij. m.

*Gargarisma pro Uvula* . F.

℞. Herb. aquileg. M. iv. flor. ros. rub. balauft. ana M.  
ss. piper. long. ℥iv. myrrh. ℥ij. coq. in aq. font. ℥ij. & vin.  
alb. ℥ss. ad tertiæ partis consumption. colatur. add. sp.  
vin. syr. e mor. de rub. idæ. ana ℥ij. m.

*Hauftus Diaphoreticus* . F.

℞. Aq. card. ben. ℥iiss. epidem. theriacal. syr. de  
mecon. ana ℥ss. antimon. diaph. ℥i. theriac. androm.  
℥ij. sp. sal. armoniac. gut. xij. m.

*Hau-*



*Haustus Diureticus Acidus . F.*

℞. Aq. raphan. comp. ℥i℥. (sp. vin. gallic. succ. li-  
mon. ana ℥℥. syr. violar. ℥j). m. f. haust.

*Haustus contra Fluorem . F.*

℞. Alb. ov. N. j. conquassato add. aq. cinnam.  
fort. ℥i℥. m.

*Haustus Hydragogus . F.*

℞. Gum. gamand. erem. tart. pulv. ana gr. xiv.  
ol. junip. gut. iij. dissolv. diligenter in mortar. in vin.  
alb. ℥iij. addendo sacchar. alb. ℥℥. m.

*Haustus Japonicus . F.*

℞. Aq. spermat. ranar. ℥j. syr. e ros. sicc. ℥ij. ter.  
japon. pulv. ℥j. sacchar. saturn. gr. iv. ol. cinnam.  
chym. gut. j. laudan. liquid. gut. xx. m.

*Haustus Pleuriticus .*

℞. Ol. sem. lini frigide extract. ℥i℥. sperm. cer.  
℥ij. ol. nuc. mosch. gut. ij. aq. cinnam. hord. syr. papav.  
errat. ana ℥vj. m. f. haust. quam calidissime sumend.

*Haustus Saponaceus . F.*

℞. Sapon. vener. ras. a ℥ij. ad ℥iv. coq. in lact. ℥vj.  
ad ℥iv. colaturæ add. sacchar. alb. tantillum .

*Haustus Saturninus . F.*

℞. Aq. spermat. ranar. ℥℥. acet. ℥℥. succ. urticæ  
℥ij. syr. de mecon. ℥vj. sacchar. saturn. gut. vj. alum.  
gr. iij. sang. dracon. ℥℥. m.

*Infusum Cephalicum . F.*

℞. Stere. pavonis alb. ℥iv. milleped. contus. ℥j.  
sq. ceras. nigr. vin. alb. ana ℥℥. infund. 24. horas  
frigide; colaturæ per manicam clarificatæ add. aq.

Langii

Langii ℥iij. sp. lavend. comp. ℥iβ. ol. nuc. mosch.  
gut. iij. syr. pœon. comp. ℥vj. m.

*Infusum Chalybeatum Amarum. Art. 48.*

*Infusum Fracastorii.*

℥. Theriac. androm. ℥ij. diascord. ℥β. coccinel.  
℥β. infund. clausè & calidè per horæ quadrant. in  
aq. lact. alex. ℥vj. colatur. add. aq. cinnam. fort. syr.  
cydon. ana ℥j. m. *dosis coch. iv. quarta vel sexta qua-*  
*que hora pro re nata.*

*Infusum Traumaticum. F.*

℥. Caulium virid. solani lignosi concis. ℥iv. coe-  
cinel. ℥j. vin. alb. ℥ij. infund. calidè & clausè per no-  
ctem. colatur. add. syr. heder. terrest. ℥iv. theriac.  
ven. ℥β. m.

*Injectio ad Gonorrhœam. E.*

℥. Aq. cale. viv. ℥iv. mercur. dule. ℥β. sacchar.  
saturn. ℥j. m. pro injectione, *Usurpetur liquor per*  
*residentiam depuratus.*

*Julapium Moschatum. F.*

℥. Aq. rosar. damascen. ℥vj. naphthæ ℥j. cinnam. hord.  
℥ij. pœon. com. ℥iβ. mosc. ambræ gris. (cum sal. C. C.  
trit.) ana gr. ij. croci (scissi & in nodul. ligat.) ℥j. ol. ga-  
ryoph. gut. j. confect. alkerm. ℥ij. syr. caryoph. ℥iβ. m.

*Julapium Stomachicum. F.*

℥. Vin. Xeroensis, aq. cinnamom. hord. ℥iv. aq.  
menth. gent. comp. syr. cydon. ana ℥ij. ol. garyoph.  
nuc. musch. ana gut. ij. m. addi possint theriac. ven. ℥ij.

*Lac*

*Lac Sublimatum .*

℥. Aq. cal. viv. ℥iv. mercur. sublimat. corrosiv. gr. xii. dissolv. in vitro leni calore . *Potest augeri vel minui quantitas sublimati , prout fortius aut debilius medicamentum efficere volueris .*

*Lac Virginal . P. L.*

℥. Alumin. rupei ℥iv. eoq. in aq. font. ℥ij. ad tertias ; tum ℥. Litharg. auri ℥ss. vin. alb. ℥ss. decoquantur ad ℥bi. colentur , ambæque aquæ commisceantur , & agitentur donec albescant .

*Linimentum Anodynum . R. Art. 236.**Linimentum Paralyticum . F.*

℥. Unguent. martiar. ℥ij. petrol. ol. spicæ , ana ℥iij. pulv. euphorb. ℥i. ol. succin. ℥ss. ol. rorismarin. ℥ss. m.

*Linimentum Psoricum . Bar.*

℥. Sulph. crud. ℥ij. sapon. venet. ℥ss. nitri præp. ℥ss. litharg. aur. ℥ij. mercur. dulc. ℥ss. unguent. alb. camphor. ℥i. ol. lign. rhod. gut. iv. m. f. linimentum.

*Lohoch Myrrhisatum . F.*

℥. Myrrh. pulv. ℥ij. croc. ℥ss. nuc. mosch. ℥ss. mellis ℥ij. M.

*Lohoch ad Raucedinem . F.*

℥. Sperm. ceti ℥ss. sacchar. alb. ℥j. optimè simul contus. in mortario sensim add. syr. balsam. q. s. m.  
*Lohoch*

*Lohoch Rubrum.*

℥. Conserv. fruct. cynosbat. ℥ss. syr. bac. sambuc.  
ol. amygd. dulc. ana ℥j. m.

*Lohoch Viride. F.*

℥. Sapon. venet. res. ℥ij. ol. amygd. dulc. syr. viol.  
lar. ana ℥i. m.

*Lohoch Vitellinum. F.*

℥. Sperm. cet. ℥iij. subigatur in mortario cum vi-  
tel. ov. N. j. & add. ol. amygd. dulc. syr. de alth. ana  
℥j. m.

*Lotio Lanfranci. Art. 984.*

*Mistura Acida.*

℥. Aq. plantag. syr. papav. erratic. ana ℥ss. ol. vi-  
triol. ℥ii. misce.

*Mistura Balsamica Nephritica. F.*

℥. Balsam. capiv. ℥ss. ol. junip. chym. ℥ss. vitel. ov.  
N. ij. syr. de alth. ℥iij. aq. persicar. ℥x. m.

*Mistura Consolans. F.*

℥. Vin. Xeroenl. ℥ss. aq. cinnam. fort. ℥iv. aq.  
ros. sacchar. cand. alb. ana ℥ii. succ. chermes colat.  
℥i. spec. lætif. Galeni ℥ii. fol. auri N. iv. ol. nuc. mo-  
lchat. gut. iv. m.

*Mistura Corallata. F.*

℥. Coral. rub. subtilissimè lævigat. ℥ii. sal. ab-  
Qq synth.

synth. Div. succ. limon ℥iv. aq. cinnam. fort. ℥ij. M. stent in vitro capaci.

*Mistura Ecphrastica . F.*

℥. Summit. pin. concis. M. vi. coq. in aq. font. ℥iv. ad ℥ij. cochlaturæ fortiter expressæ add. succ. depurat. cochlear. hortens. ℥j. beccabung. nasturt. aquat. tarax. ana ℥ss. aq. raphan. comp. ℥ss. huic misturæ dissolve vitriol. Mart. ℥vii. per noctem reponatur, ut subsidat fæx lutea; dein liquori claro effuso adde sal. absynth. Div. sacchar. alb. ℥xij. m.

*Mistura Expectorans . F.*

℥. Tinctur. benzo. ℥ss. tinct. croc. tinct. myrrh. tinct. gum. ammoniac. sp. sal. armoniac. ana ℥j. aq. hyssop. ℥vi. lumbricor. magistral. ℥iij. syr. de prassio ℥ij. m.

*Mistura simplex Paracelsi . Art. 78.*

*Mistura Stomachica . F.*

℥. Aq. cinnam. fort. ℥j. ol. vitriol. ℥j. ol. garyoph. gut. xxiv. m.

*Nitrum Saturnisatum . B.*

℥. Sacchar. saturn. nitri ana p. æ. Solve in aceto distillato & crystallisa s. a.

*Nodulus Hystericus . B.*

℥. Castor. pulv. ℥ss. asæ foetid. ℥j. ol. succin. ℥ss. misce, & in serico involve, ut fiat nodulus, &c.

*Ol. Ranarum . B.*

Coque ranas vivas N. 12. in ol. olivar. ℥iij. per horam

# PHARMACOPOEIA. 811

horam & deinde exprime: *In cancro specificum perhibetur:*

## *Oxymel Asthmaticum. F.*

℞. Rad. zedoar. ℥j. coq. in aq. font. ℔ij. ad ℔i℥. colaturæ add. gum. ammoniac. (in acet. ℥iv. dissolut.) ℥j. colaturæ add. mellis ℥iv. coq. despuma & cola. *Dentur coch. iij. manè & vespèri per menses aliquot.*

## *Phœnigmus. Mu. Art. 934.*

## *Pilulæ Balsamicæ. M.*

℞. Milleped. præp. ℥iij. gum. ammoniac. purissim. ℥i℥. flor. benzoin. ℥ii. vel ℥j. extract. croc. balsam. peruv. ana ℥i. balsam. sulph. terebinth. vel anifat. q. s. f. massa.

## *Pilulæ Cathartica in Scorbuto.*

℞. Gum. ammoniac. ℥j. calomel. ℥ij. extract. heliobor. nigr. ℥ij. balsam. peruv. parum m. f. massa pil. dos. ℥ij.

## *Pilulæ ad Colluviem. F.*

℞. Calomel. ℥ij. sacchar. saturn. ℥j. camphor. amyl. ana ℥℥. balsam. capiv. q. s. m. f. pil. pro dos. xij.

## *Pilulæ de Creta Palmarii. B.*

℞. Aloes opt. ℥i. cret. albis. succin. alb. gentian. myrrh. rad. fraxinel. ana ℥j. mithrid. ℥iv. tereb. lot. ℥ij. syr. de Alch. q. s. f. massa pil. *Sunt qui addunt calomel. ℥℥. vel ℥vj. Dos. ℥ij. vel ℥i. omni nocte ad dies xv.*



*Pilula Diuretica . F.*

℞. Test. ovar. calcinat. ℥ss. camphor. ℥j. cantharid. ℥ss. tereb. ven. q. s. f. pil. pro dos. iij.

*Pilula Hydragoga . F.*

℞. Gambog. pulv. a gr. xij. ad gr. xvj. ol. Junip. gut. ij. mithridat. q. s. f. pil. pro una dosi.

*Pilula Hydropica Bontii . Art. 825.**Pilula Hysterica . F.*

℞. Galban. colat. aſæ foetid. myrr. ana ℥i. caſtor. camphor. ſal. ſuccin. ana ℥ss. ol. ſuccin. gut. iv. baſam. peruv. q. s. f. maſſa, cui (quoties res poſtulaverit) adjici poſſunt ſal. chalyb. ℥ij. exindeque dicantur pil. hyſter. chalyb.

*Pilula Volatiles .*

℞. Sal. volat. C. C. vel ſal. volat. ammoniac. ℥ij. gum. ammoniac. ℥j. extract. croc. pulv. carn. viper. ana ℥j. baſ. peruv. q. s. m. f. maſſa pil.

*Pulvis Diureticus . G. Art. 735.**Pulvis Epilepticus de gutteta dictus . B.*

℞. Rad. fraxinel. viſc. quercin. contrayerv. ſerpent. virgin. pæon. mar. (debito tempore collect.) ſem. pæon. mar. magiſt. C. C. magiſt. ungul. alcis ana ℥ij. rad. valerian. ſylv. ℥j. coral. rub. cran. human. ana ℥iij. lapid. hyacinth. ℥j. bezoar. occident. ℥ss. orient. ℥j. m. f. pulvis ſubtilis: adde moſch. gr. v. ſol. auri N. 30. m.

*Pul-*

*Pulvis Hæmopticus . F.*

℥. Sem. hyoscyam. papav. alb. ana ℥ij. ter. sigill.  
lapid. hæmatit. ana ℥j. sacchar. ros. ℥vj. m. f. pulv.

*Pulvis Pleuriticus . B.*

℥. Flor. sulph. ℥ij. dent. apri, mandib. lucii pifeis  
ana ℥j. flor. papav. rhœad. ℥ss. m. f. pulvis Dos. ℥i.

*Pulvis Uvularis . 1. F.*

℥. Ter. japon. flor. balauft. ana ℥j. alum. piper.  
long. ana ℥ss. m. f. pulvis. *Modus usurpandi est, ut  
lingua speculo oris depressa, pulvis (ope fistulæ) insu-  
fletur uvulæ, & operatio pro re nata repetenda.*

*Pulvis Uvularis . 2. B.*

℥. Flor. balauft. rad. bistor. tormentil. ana ℥ij.  
alum. ℥j. m. f. pulv.

*Semicupium Hildani . Art. 988.*

℥. Rad. & fol. alth. rad. & fol. malv. rad. fœnicul.  
apii, petroselin. eryng. marin. ana ℥ij. (rad. raparum  
℥ij.) herb. parietar. violar. veronic. flor. cham. melilot.  
genist. sambuc. ana M. j. sem. lin. fœnuigr. ana ℥i. petro-  
felin. anis. fœnic. genist. ana ℥ij. coq. in q. s. aq. font. pro  
semicupio.

*Stypticum Regis . B.*

Vitriolo soluto, filtrato, cum aceto distillato  
præcipitato, edulcato, & siccato affunde oleum  
vitrioli, & distilla ex retorta ad siccitatem: caput  
mortuum digere cum spiritu vini, filtra calidè ac ab-

614 PHARMACOPOEIA.  
ſtrahe. Solve ſalem in fundo remanentem cum quadruplo aquæ per digeſtionem, & f. ſtypticum.

*Succi Antiſcorbutici.*

℥. Fol. cochlear. hortenf. beccabung. naſturt. a. quat. ana p. æ. contundantur & exprimatür ſuccus ad ℥ij. deinde add. vin. alb. vel rhenan. ℥i. aq. raphan. comp. ſucc. aurant. acid. ana ℥ß. miſce *doſ.* ℥iij. *bis in die ſine vel cum pauco ſaccharo.*

*Suffitus ad Catharrum. F.*

℥. Oliban. ſuccin. benzo. ſtyrac. calam. gum. guaiac. baſſam. toluatan. ana ℥ij. f. pulvis craſſus *pro ſuſſumigio capitis.*

*Syrupus de Peto. B.*

℥. Succ. peti anglic. ℥iv. oxymel. ſimpl. ℥iv. hydromel. ℥j. miſce & digere quatuor dies, ut optimè defæcetür; tunc deæanta iterumque digere ut ſuprà, donec materia ab omni ſæculentia depurata fuerit; adde poſtea ſacchar. ℥ij. & coq. in ſyrup. f. a.

*Syrupus Vermifugus. B.*

℥. Fol. helleboræ ſtr. rec. ℥ij. Haſioſpermi ℥iſſ. rad. bryon. rec. ℥ß. abſynth. roman. M. ij. coq. in aq. font. q. ſ. ad ℥i. colatur, add. ſacchar. alb. ℥i. & coq. ad ſyrup. f. a.

*Tabellæ Domæſtica. S. Art. 488.*

*Tabellæ Embryonum. B.*

℥. Pulv. rad. biſſort. ebor. coral. rub. coriandr. præp. ana ℥ß. ſuccin. alb. cryſtal. bacc. cherm. ana ℥ii. ſac-

℥ii. sacchar. alb. ℥xvi. aq. cydon. q. s. coq. f. a. addendo ol. cinnam. gut. vj. affund. & f. tab. f. a.

*Tinctura Antiphthificalis. F.*

℥. Sacchar. saturn. vitriol. mart. ana ℥j. sp. vin. rectific. ℥viii. reponere in frigido donec rubescat spiritus.

*Tinctura Bezoartica. B.*

℥. Rad. enul. angel. zedoar. serpent. virg. ana ℥ss. croc. opt. ℥i. myrrh. cinnam. cort. citr. sicc. ana ℥vi. fol. scord. rut. ana M. ss. theriac. androm. ℥iiij. opii thebaic. ℥ij. sp. tar. rectific. ℥xv. sp. vitriol. ℥iiij. sp. bacc. sambuc. & sp. bacc. junip. rectific. ana ℥xviiij. digere f. a. ac filtra, tum add. sal. succin. ℥j. camphor, ℥ii. digere iterum ad usum, Dos. a ℥iiij. ad ℥j.

*Tinctura Cantharidum. G.*

℥. Pulv. cantharid. ℥i. sp. nitri fortissim. ℥ij. digere simul horas 24. Sic cantharides planè dissolventur, & liquor rubicundus erit; huic superaffund. sp. vin. ℥vj. digere simul quò diutius eo melius: postea filtretur tinctura, & ad usum reservetur. Dos. a gut. xij. ad xl. bis die in haustul. vin. alb. vel theban.

*Tinctura Epileptica. F.*

℥. Castor. opt. ℥ss. succin. flav. in tenuissim. pulverem redact. croc. angl. ana ℥ij. flor. recent. lil. conv. ℥j. his affund. sp. vin. camphor. sp. lavend. comp. sp. sal. armoniac. ana ℥iv. digerantur absque calore dies vj. in vitro clauso; postea filtretur tinctura, vel decantetur a scæcibus per colum. Dos. a ℥. ad ℥i. in aq. ceras. nigr.

*Tinctura Gum. Lacca. F.*

℞. Pulv. gum. lacc. ℥ss. alum. ust. ℥j. sp. cochlear. ultimo extillantiss. ℥viij. phiala aëte inclusa digerantur, donec tinctura satis rubicunda appareat, quæ leniter effundatur.

*Vapor ad Anginam. F.*

℞. Piper. pulv. ℥j. lact. ℥ij. coq. ad ℥iij. dein penatur in lagena stricti orificii, & vapor calidissimus ore hianti excipitur.

*Vinum Chalybeatum. P.L.*

℞. Chalyb. prepar. ℥j. Croci pulverati & in nodulo inclusi gr. viij. Vini albi odori ℥ij. infunde frigidè per triduum, aut quatridduum, sæpe interea agitando, inverso vase. Tum F. colatura per manicam Hipp. serveturque usui.

*Vinum Chalybeatum. 2. F.*

℞. Limatur. chalyb. ℥ij. succ. aurant. acid. N. viij (vel potius ℥iv.) stent simul horas 24. Dein add. vin. alb. ℥iv. cinnam. ℥ss. garyoph. ℥ij. mac. ℥iv. stent tepidè dies iv. dos. ℥ij. bis in die.

*Vinum Hydropicum. F.*

℞. Rad. irid. florent. ℥ij. enul. scill. ana ℥ss. cort. sambuc. ebul. ana ℥j. cort. vvinteran. ℥ij. sennæ ℥ij. hellebor. nigr. agur. jalap. ana ℥ij. vin. alb. ℥iv. Infunde frigidè. Dos. ℥iv.

*Vinum*

*Vinum Viperinum . B.*

℞. Viperas foemellas vivas tempore verno collectas N. vj. vin. hispan. opt. ℥vj. macera (vase optimè clauso) sine calore per menses 6. dein cola ad usum. Sunt qui macerant viperas excoctas [ rejectis intestinis, cauda, ac capite ] in vin. hispan. per aliquot dies. *Dos.* ℥ij. *vel* iv. *bis in die ad longum tempus.*

*Vitriolum Martis . B.*

℞. Alcoh. vin. ℥iv. ol. vitriol. ℥ij. serva simul in vase ferreo ad dies xv. vel ad siccitatem. *Dos.* a gr. ij. ad vj.

*Unguentum Digitale . B.*

℞. Butyr. maial. ℥iij. flor. digitalis rec. contus. quot infarciri possunt, insolentur die 30. deinde coq. s. a. & f. expressio.

*Unguentum Hemorrhoidale . F.*

℞. Unguenti populo. ℥j. ol. succin. ℥ij. m. f. unguent.

*Unguentum Pleuriticum . F.*

℞. Unguent. dialth. ℥j. ol. lin. ℥ss. ol. cym. ℥ss. camphor. ℥ss. sp. sal. armoniac. ℥ss. m.

*Unguentum ad Ulcera Venerea . P.*

℞. Mercur. præcipit. rub. ℥ij. mercur. præcipit. alb. ℥j. ol. tart. per deliq. ℥ij. unguent. pomat. ℥ij. m.



# SYLLABUS

Symptomatum Morborum,

S I V E

Ægrotorum passiones variæ enumeratæ , & ad calculum redactæ , in hunc finem , ut Morbos eorumque Causas Medicus facilius , promptius & certius inveniat , & introspiciat & cognoscat , unice constructus.

*Usus hujus Indicis neminem latere potest.*

**M**EDICUS juvenis & in Praxi minus exercitatus , ægrum suum de omnibus aptè interroget , atque ex ipsius , vel cohabitantium ministrantiumve ore Symptomata & Querimonias omnes sedulè expiscetur : hoc facto , singula Symptomata in Indice investiget ; & librum ipsum ( quoties opus sit ) variis in locis consulat ; indeque de natura Morbi , utcunque obscuri , complicative , judicium justum & rarè fallax formare valeat.

Syllabus Symptomatum .

A

Symptoma.	Morbus.	Art.
Abdominis dolores Vid. ventris dolores & termina	} Alvi Retentio .	611
		Abdo-

Symptoma.	Morbus.	Art.
Abdominis intumescencia	{ <i>Hydrops ascites</i> <i>Vesicalis</i>	801
Vid. ventris intumescencia		815
Tumor	{ <i>Empyema.</i>	249
Vid. Ventris tumor		
Absumptio corporis	<i>Phthisis nervosa</i>	513
Ægrotudo gravissima	<i>Arthritis</i>	911
Alvus adstricta	{ <i>Ventriculi morbus</i>	581
	{ <i>Arthritis</i>	925
	{ <i>Colica</i>	643
	{ <i>Iliaca passio</i>	666
Alvi excrementa albican- tia	<i>Cæliaca</i>	629
Grisea vel pallida	{ <i>Icterus</i>	843
Cineritii coloris		
Levia & ventosa	{ <i>Colica</i>	646
Instar stercoris bovini		
Viridia	<i>Tormina ventris</i>	3523
Alvi fluxus	<i>Diarrhœa</i>	617
Chyfolus	{ <i>Cæliaca</i>	629
Vid. Dejectiones, diarrhœa.		
Alvus lubrica vel soluta	{ <i>Lumbrici</i> <i>Ventriculi morbus</i>	1548
Vid. Diarrhœa,		585
Alvi retentio	<i>Ventriculi morbus</i>	581
Alvus segnior	<i>Arthritis</i>	925
Amor	<i>Phthisis nervosa</i>	513
Anhelatio	{ <i>Peripneumon. noth.</i>	214
Vid. Dyspnœa respiratio anhelosa		

Symptoma.	Morbus.	Art.
Animi deliquium	} <i>Affect. hysteric.</i> <i>Syncope</i> <i>Ascarides</i>	402
Ani pruritus		571
Procidencia vid. proci- dentia ani		681
Anthrax vid. carbunculus	<i>Pestis</i>	170
Anxietas vid. præcordio- rum anxietas	} <i>Febris ardens</i> <i>Hydrophobia</i> <i>Pestis</i>	65
Aphonia		445
Vid. raucedo		170
Aphthæ	} <i>Colica</i> <i>Lumbrici</i> <i>Dysenteria</i>	649
Apoplexia leuiuscula		683
Appetitus diminutio		636
Appetitus insuetorum	} <i>Febris continua</i> <i>Affectio hystericæ</i> <i>Febris intermit. spur.</i>	61
Nimius		396
		37
Aquarum ex utero fluxus immaturus	} <i>Phthisis</i> <i>Ventriculi morbus</i> <i>Gravidatio</i>	522
Ardor lumborum		602
Artuum dolores		1421
	} <i>Ventriculi morbus</i> <i>Lumbricus latus</i> <i>Arthritis</i>	603
Lassitudo		678
		908
Atrophia	} <i>Ventriculi morbus</i> <i>Abortus</i> <i>Diabetes</i>	695
Auris internæ suppuratio		879
		228

Symptoma.	Morbus.	Art.
Aurium tinnitus	<i>Lues venerea</i>	961
	<i>Febris ardens</i>	66
	<i>Febris petechialis</i>	83
	<i>Febris puerperarum</i>	1495

## B

Borborygmi & murmura intestinarum Vid. ructus, flatus	<i>Affectio hyster.</i>	400
Bulimus	<i>Affectio hyster.</i>	408
	<i>Ventriculi morbus</i>	604
Bubo in inguine	<i>Lues Venerea</i>	961
Bubones	<i>Febris maligna</i>	77
	<i>Pestis</i>	171. 180

## C

Cachexia	<i>Scorbutus</i>	869
Calor & frigus se mutuo excipientia	<i>Morbilli</i>	123
Calor hecticus	<i>Phthisis</i>	494
	<i>Post variolas</i>	145
Calor urens	<i>Febris ardens</i>	62, 65. 103
Capillorum defluvium	<i>Phthisis</i>	493
	<i>Venenum</i>	1636
Caput iusto majus	<i>Hydrocephalus</i>	832
	<i>Rachitis</i>	1553
	<i>Febr. ferè omnes</i>	34. 58, &c.
	<i>Affectio hysterica</i>	396
Capitis dolor	<i>Alvi retentio</i>	611
	<i>Lumbrici</i>	683
	<i>Sudor anglicus</i>	194
Capitis dolor cum insigni ardore	<i>Cephalalgia</i>	280. 281
	Cum	

Symptoma.	Morbus.	Art.
Cum aliquali frigoris sensu	<i>Cephalalgia</i>	280
Capitis dolor gravativus	<i>Cephalalgia</i>	280
Periodicus	<i>Febris intermittens</i>	37
Capitis dolor punctorius & gravativus	<i>Scorbutus</i>	869
Capitis & dorsii dolor	<i>Variola</i>	131
Capitis gravitas	<i>Catarrhus</i>	469
Capitis tumor aquosus	<i>Hydrocephalus</i>	832
Carbunculus	<i>Pestis</i>	171. 181
Cardialgia	<i>Lumbrici</i>	683
Caries ossium	<i>Post variolas</i>	145
Carunculæ in Urethra	<i>Lues venerea</i>	990
Catarrhus	<i>Febris lenta</i>	69
	<i>Phthisis</i>	491
Cervicis dolor	<i>Febris ardens</i>	66
Cholera morbus	<i>Febris intermittens</i>	37
Chyli per alvum fluxus	<i>Celiacâ</i>	629
Per Urinam	<i>Diabetes</i>	697
Circumrotatio objectorum visibilium	<i>Vertigo</i>	300
Claudicatio fatuorum more	<i>Chorea Sancti Viti</i>	931
	<i>In variolarum apparatu</i>	137
	<i>Febris intermittens</i>	37
Colici dolores	<i>Febris remittens</i>	50
	<i>In parturientibus</i>	1452
	<i>Calculus renum</i>	739
	<i>Affectio hysterica</i>	396
Color purpureus sub concavo oculorum	<i>Chlorosis</i>	1392
	<i>Scorbutus</i>	889
Colliquatio humorum	<i>Febris colliquativa</i>	73
Coma	<i>Febris ardens</i>	65. 114
	<i>Febris eruptiva</i>	118
	<i>Hæmorrhoides</i>	1259
Condylomata circa anum	<i>Lues venerea</i>	961

Con-

Symptoma.	Morbus.	Art.
Congelatio	Catalepsis	350. 351
Contractura partium	Convulsio tonica	365
Convulsio	Febris ardens	65. 116
	Febris eruptiva	118
Convulsiones infantum	Dentitio	1543
	Lumbrici	1548
Convulsiui motus	Epilepsia	375. 379
	Venenum	1576
	Chlorosis	1393
	Affectio hysterica	396
Cordis palpitatio	Scorbutus	869
	Sudor anglicus	194
	Venenum	1576
Corona subcærulea vel sulcubruescens sub oculis	Chlorosis	1392
Coryza	Febris lenta	69
Crisis febrium	Febris continua	58. 59. 91
Cruris stupor	Nephritis	708
Crurum tumor frigidus	Hydrops	809
Crusta alba in sanguine	Pleuritis	228
	Rheumatismus	854
Cutis densitas ac scabri- tates tumida cum rugis & fissuris, &c.	Elephantiasis	1199
Flavido vid. flavedo cutis	Cutis siccitas, vide siccitas cutis.	

## D

Decubitus in unum tan- tum latus	Empyema	240
In latus morbosum	Pleuritis	224
In latus oppositum		

Deglu.



Symptoma.	Morbus.	Art.
Deglutitio difficilis	{ <i>Angina</i>	200
	{ <i>Febris ardens</i>	66
Penitus impedita	{ <i>Variola</i>	144
Dejectiones albæ vel cineritiæ	{ <i>Paralysis gulæ</i>	343
	{ <i>Icterus</i>	840
	{ <i>Calculus in vesica fellea</i>	843
Dejectiones albicantes griseæ vel pallidæ	{ <i>Cæliaca</i>	629
Aquosæ	<i>Dysenteria</i>	633
Membranaceæ	<i>Dysenteria</i>	635
Mucosæ	<i>Dysenteria</i>	631
Purulentæ cum carunculis	{ <i>Dysenteria</i>	636
Sanguinolentæ	{ <i>Dysenteria</i>	631
Vid. fluxus cruentus	{ <i>Dysenteria</i>	631
Ventosæ & leves instar Stercoris bovin	{ <i>Colica</i>	646
Viridis vel insoliti coloris	{ <i>Colica biliosa</i>	643
	{ <i>Tormenta venenis</i>	1523
Delirium	{ <i>Calentura</i>	64
	{ <i>Febris</i>	23. 58. 65. 115
	{ <i>Lumbrici</i>	683
Delirium furiosum sine febre. Melancholicum sine febre. Rabiosum	<i>Mania</i>	427
	<i>Melancholia</i>	427
	<i>Hydrophobia</i>	450
Perpetuum & immanne	{ <i>Phrenitis</i>	245. 247
	{ <i>Paraphrenitis</i>	254
Dentium caries & vacillatio	{ <i>Scorbutus</i>	869
Hæmorrhagia	{ <i>Epilepsia</i>	379
Stridor	{ <i>Lumbrici</i>	1548
	Ad	

Symptoma,	Morbus.	Art.
Ad diaphragma gravitas	<i>Empyema</i>	240
	<i>Affectio hysterica</i>	396
Diarrhoea	<i>Arthritis</i>	918
	<i>Phthisis</i>	497
	<i>Scorbutus</i>	870
	<i>Variola</i>	132
Diarrhoea colliquativa	<i>Febris</i>	109
Diarrhoea infantum	<i>Dentitio</i>	1543
	<i>Lumbrici</i>	1548
Cum dejectionibus subviridibus, vide	<i>Morbilli</i>	123
Dejectiones, varii coloris		
Oleosa	<i>Diarrhoea</i>	619
	<i>Cholera morbus</i>	607
Tormentosa	<i>Dysenteria</i>	631
	<i>Febris intermittens</i>	37
	<i>Febris remittens</i>	50
	<i>Spasmus Cynicus</i>	361
Distortio oris		
Dolor abdominis vid. ab- dominis dolor		
Artuum vid. Artuum dolores		
Capitis vid. capitis dolor		
Dolor circa cordis regio- nem	<i>Pestis</i>	183
Circa serobiculum cordis	<i>Ventriculi morbus.</i>	599
Dorsi & capitis	<i>Variola</i>	131
Ad claviculum & mamas	<i>Peripneumonia vera</i>	216
Insignis sub costis no- this	<i>Inflammatio ventriculi</i>	258

Symptoma.	Morbus.	Art.
Dolor Cervicis vid. cervicis dolor		
In artubus ardens, pungens, lacerans, pulsans,	} <i>Arthritis</i>	918
Obscurus in hypochondrio dextro		
In hypochondrio sinistro	} <i>Hepatitis</i>	268
Intestinelorum vid. intestinelorum dolor		
In oculorum bulbis	} <i>Inflammatio lienis</i>	271
Lenis in alterutro pe- toris loco		
Punctorius versus omoplatas	} <i>Phrenitis</i>	255
In qualibet thoracis parte		
Medium ventrem affligens cinguli instar	} <i>Vomica Pulmonis</i>	443
Circa umbilicum intensissimus		
Subter sternum	} <i>Pleuritis</i>	212. 216
Universalis contundens & lancinans		
Erratici externum corporis habitum occupantes	} <i>Pleuritis</i>	218
Nocturni		
Parturientium æmuli	} <i>Colica biliosa</i>	644
Vagi præcipuè eorum		
Dorsi & capitis dolor	} <i>Iliaca passio</i>	666
	} <i>Scorbutus</i>	880
	} <i>Feb. Petech.</i>	79. 112
	} <i>Rheumatismus</i>	854. 857
	} <i>Lues venerea</i>	961
	} <i>Febris intermittens</i>	37
	} <i>Colica</i>	1452
	} <i>Scorbutus</i>	869
	} <i>Variola</i>	121
		Dorsi

Symptoma.	Morbus.	Art.
Dorsi spinæ inflexibilitas	<i>Calculus renum</i>	728
Dyspnœa	<i>Hydrops</i>	801
Vid. Respirandi difficultas		
	<i>Phrenitis</i>	255
Dysenteria	<i>Febris remittens</i>	50
Dysuria	<i>Ulcus renum vel vesicæ</i>	720

**E**

Efflorescentiæ maculosæ	<i>Erysipelatis quædam species a Rash</i>	1168
	<i>Febris maligna</i>	75
	<i>Morbilli</i>	123
	<i>Variolæ</i>	125
Confluentes	<i>Febris scarlatina</i>	112
Miliaris purpurea in infantibus recens	Red Gum.	1515
natis		
Empyematis signa	<i>Hydrops pectoris</i>	836
Epileptici paroxysmi	<i>Variolæ</i>	131
Erysipelatosus tumor	<i>Variolæ</i>	142
Exanthemata	<i>Pestis</i>	170
	<i>Variolæ</i>	138
Excrementa alvina albicantia, grisea vel pallida, chylosa	<i>Cæliaca</i>	629
Levia & ventosa instar stercoris bovin		
Viridia	<i>Colica</i>	646
Vid. dejectiones coloris varii, &c.		
Extenuatio partium carnosarum	<i>Tormina ventris</i>	1523
	<i>Atrophia infantum</i>	1530
	<i>Phthisis</i>	494
	<i>Phthisis nervosa</i>	513
	R r 2	Fa.

## F

Symptoma.	Morbus.	Art.
Facies plenior & floridior in infantibus	<i>Rachitis</i>	1554
Scabiosa infantum	<i>Crusta lactea</i>	1561
Turgida & subtumida	<i>Febris</i>	96
Faciei pallor	<i>Chlorosis</i>	1392
Rubor	<i>Febris ardens</i>	66
Rubor & pallor alternatim	<i>Lumbrici</i>	1548
Rubor pustulosus	<i>Gutta rosacea</i>	1143
Rubor post pastum	<i>Cruditus ventriculi nido-rosa</i>	584
Faucium dolor & inflammatio	<i>Angina</i>	200
Febris ardens	<i>Inflammatio alicujus visceris</i>	62
	<i>Inflammatio ventriculi</i>	258
	<i>Catarrhus</i>	469
Febris lenta	<i>Diabetes</i>	695
	<i>Empyema</i>	240
	<i>Cachexia</i>	793
Febricula	<i>Chlorosis</i>	1392
	<i>Rheumatismus</i>	854. 857
Flatus in ventriculo & in intestinis	<i>Affectio hysterica</i>	402
	<i>Scorbutus</i>	869
	<i>Ventriculi morbus</i>	588
Flavedo cutis	<i>Cachexia</i>	794
	<i>Icterus</i>	840
Fluctuatio in Abdomine aquæ ne sensus	<i>Ascites</i>	809
	<i>Hydrops pectoris</i>	801
In Utero	<i>Hydrops uteri</i>	1434
	Flu.	

Symptoma.	Morbus.	Art.
Fluxus cruentus	<i>Dysenteria</i>	636
	<i>Hæmorrhoides</i>	1263
	<i>Inflammatio pancreatis</i>	267
Foveæ a digitorum im- pressione	<i>Scorbutus</i>	1263
	<i>Hydrops</i>	801
	<i>Oedema</i>	1272
Frigus & calor superve- niens	<i>Febris intermittens</i>	34
	<i>Et in initiis fere om- nium</i>	102
Frigoris } in capitis verti- sensus } ce } in abdomine } per dorsum	<i>Affect. hysterica</i>	396
	<i>Colica</i>	646
	<i>Affect. hysterica</i>	402
Furunculi	<i>Scorbutus</i>	869
	<i>Variola</i>	145

## G

Gangræna & caries	<i>Post variolas</i>	145
Genarum rubor	<i>Phthisis</i>	494
Genitalium tumores œde- matosi	<i>Lues venerea</i>	985
Gesticulationes variæ	<i>Chorea Sancti Viti</i>	391
Gingivarum cruentatio	<i>Scorbutus</i>	896. 889. 892
Erosiones		
Laxitas	<i>Dentitio in infantib.</i>	1543
Inflammatio		
Globi sensus in abdomine	<i>Parulis</i>	1235
Gonorrhœa virulenta	<i>Colica hysterica</i>	661
Non virulenta	<i>Lues venerea</i>	964
Gravitas corporis	<i>Gonorrhœa Catarrh.</i>	966
Ad diaphragma	<i>Hydrophobia</i>	451
Ad tempora	<i>Empyema</i>	240
	<i>Feb. ardens</i>	66

Rr 3

Gra-



Symptoma.	Morbus.	Art.
Gravitas circa ventriculi regionem	} <i>Feb. petech.</i>	82
Gravitationis sensus in perinaeo		
Gutturis dolor ulcerosus	} <i>Feb. Eruptiva</i>	118
Gutturis ac pectoris stridor	} <i>Variola</i>	132
	} <i>Angina</i>	200

## H

Hæmorrhagia narium	} <i>Feb. ardens</i>	66
		58
		1096
		132
Hæmoptoe	} <i>Feb. sui generis</i>	1096
Hæmorrhoidum fluxus		533. 536
Halitus foetens intolerabilis	} <i>Phthisis</i>	596
Halitus gravis		1483
Hebetudo visus	} <i>Scorbutus</i>	869
		1085
Hemicrania	} <i>Catarrhæta incipiens</i>	66
		282
	} <i>Feb. ardens</i>	37
		1441
Horripilatio	} <i>Cephalalgia</i>	20
		73
Humorum colliquatio	} <i>Feb. intermittens</i>	399
Hypochondriorum distentio		646
	} <i>Affectio Hysterica</i>	118
		522
Oppressio & angustia	} <i>Colica</i>	118
		522

## I

Symptoma,	Morbus.	Art.
Icterus	{ Colica	646. 847
	{ In pragnantibus	846
Ignavia & torpor in pueris	Rachitis	1553
Inappetentia	{ Phthisis nervosa	513
	{ Ventriculi morbus	602
Indigestio	{ Melancholia	426
	{ Ventriculi morbus	579. &c.
Indigestorum per alvum excretio	{ Lienteria	627
Inflatio circa scrobiculum cordis	{ Asthma	547
Inflatio ventriculi	{ Affectio Hysterica	401
	{ Cholera morbus	607
Inquietudo universalis	{ Feb. ardens	65
	{ Feb. maligna	74
Intestinorum dolor atrocissimus	{ Colica	643
Vehemens pulsatorius, &c.	{ Iliaca passio	666
	{ Inflammatio Intestinorum	261
Ad punctum determinatus	{ Colica	643
Circa umbilicum intensissimus	{ Iliaca passio	666
Intestinorum prolapsus	Hernia	1310
Intumescencia abdominis vid. abdominis & ventris intumescencia		
Intumescencia faciei, abdominis, totius corporis	{ Venenum	1576. 1590. &c.
Iracundia	{ Diarrhœa	621
	{ Hydrophobia	445
	R r 4	Ischu-

Symptoma.	Morbus.	Art.
Ischuria	{ <i>Calculus renum vel vesic.</i>	752
Jugularium venarum in-	{ <i>Sanguinis dyscrasia</i>	756
tumescencia	{ <i>Apoplexia</i>	325
L		
Labiorum intumescencia	{ <i>Venenum</i>	1576
& nigrities	{ <i>Gravidatio</i>	1420
Lac in mammis collectum	{ <i>Mola</i>	1487
Lactis species sed non ve-	{ <i>Feb. ardens</i>	66
rum	{ <i>Feb. eruptiva</i>	118
Laerymæ invitæ	{ <i>Affectio Hypochondr.</i>	400
	{ <i>Arthritis in ventricul.</i>	916
Languores gravissimi	{ <i>Sudor Anglicus</i>	194
	{ <i>Syncope</i>	571
Lassitudo artuum	{ <i>Feb. lenta</i>	69
	{ <i>Icterus</i>	840
Lassitudo spontanea	{ <i>Chlorosis</i>	1393
	{ <i>Fluor albus</i>	1412
	{ <i>Scorbutus</i>	869
Totius corporis	{ <i>Feb. ardens</i>	65
	{ <i>Feb. continua</i>	58
Lateris dolor punctorius	{ <i>Pleuritis</i>	212
	{ <i>Feb. intermittens</i>	37
Laxitas & mollities par-	{ <i>Rachitis</i>	1553
tium in pueris	{ <i>In febrium initiis morbilli</i>	123
Lingua alba	{ <i>Feb. ardens</i>	65
	{ <i>Petechialis</i>	83
Sicca, flava, nigra	{ <i>Pestis</i>	170
exusta		Lin.

Symptoma.	Morbus.	Art.
Linguae intumescencia	<i>Venenum</i>	1576
Linguae scabrities	<i>Feb. ardens</i>	65
	<i>Feb. continua</i>	58.106
Lipothymia vid. Syncope		
Lipyrria	<i>Febris</i>	104
Livor vultus	<i>Angina</i>	200
Lochia per aliena loca excreta	<i>Lochia</i>	1487
Fœtorem cadaverosum referentia	<i>Secundina retenta</i>	1483
Lumbago	<i>Febr. continua</i>	58.112
	<i>Feb. intermittens</i>	34
	<i>Rheumatismus</i>	854
Gravativa	<i>Fluor albus</i>	1413
Lumborum ardor	<i>Diabetes</i>	695
Dolor ardens & pungens	<i>Nephritis</i>	708
Dolor fixus gravativus	<i>Calculus renum</i>	728
	<i>Rheumatismus</i>	854
Superiorum dolor obtusus	<i>Pancreatis Morbus</i>	596
Lumbrici	<i>Feb. petechialis</i>	83
	<i>Horrenda Symptomata</i>	686
	<i>Variolæ. Malè ominantur.</i>	

M

Macula albescens in oculo	<i>Albugo</i>	1049
Maculae cutaneae fuscae	<i>Ephelides</i>	1150
Maculae lividae in sanguinis superficie	<i>Lues venerea</i>	692
Maculae rubrae pulicum morfibus similes	<i>Feb. petechialis</i>	80
	<i>Morbili</i>	123
	<i>Variolæ</i>	125
Rubescences latiores	<i>Feb. scarlatina</i>	120

Mac-

Symptoma .	Morbus .	Art.
<b>Mac. Rubræ, majusculæ,</b>	{ <i>Feb. petechialis</i>	86
rotundæ distinctæ		
<b>Flavescentes, nigrescentes</b>	{ <i>Feb. petechialis</i>	83.86
	{ <i>Pestis</i>	172
<b>Lividæ pallescentes</b>	{ <i>Feb. petechialis</i>	80.86
	{ <i>Variolæ</i>	143
<b>Nigræ, fusæ vel lividæ</b>	{ <i>Venenum</i>	1636
	{ <i>Pestis</i>	182
<b>Maculæ purpureæ</b>	{ <i>Scorbutus</i>	869
	{ <i>Variolæ</i>	132
<b>Nigræ violaceæ</b>	{ <i>Pestis</i>	172
	{ <i>Variolæ</i>	144
<b>Macularum rubrarum vel purpurearum eruptiones</b>	{ <i>Phthisis scorbutica</i>	527
	{ <i>Scorbutus</i>	869
<b>Maculæ exiguæ more lentiginis rubræ aut flavæ in fronte, temporibus, &amp;c. erumpentes</b>	{ <i>Lues venerea</i>	961.962
<b>Mammarum intumescencia</b>	{ <i>Gravidatio</i>	1420
	{ <i>Mola</i>	1426
	{ <i>Uterus inflatus</i>	1429
<b>Detumescencia</b>	{ <i>Abortus</i>	1441
	{ <i>Variolæ</i>	137
<b>Meiendi perpetuum desiderium</b>	{ <i>Calculus vesicæ</i>	720.
	{ <i>Stranguria</i>	761
<b>Memoriæ debilitas</b>	{ <i>Apoplexia</i>	314
	{ <i>Paralysis</i>	336
<b>Mensium suppressio</b>	{ <i>Conceptus</i>	1420
	{ <i>Uterus inflatus</i>	1429
<b>Mentis alienatio</b>	<i>Chorea Sancti Viti</i>	394
<b>Mictio dolorosa</b>	<i>Ulcus vesicæ</i>	718.
		Mictio

Symptoma.	Morbus.	Art.
Mictio purulenta	{ Empyema	244
	{ Gonorrhœa	787
	{ Fluor albus	ibid.
	{ Ulcus renum vel vesicæ	720
	{ Calculus	787
Mictus sanguinis	{ Febris ardens	66
	{ Mictus eruentus	767
	{ Pestis	170
	{ Variolæ	132
	{ Scorbutus	787
Micturitio	{ Variolæ	137
	{ Stranguria	761
	{ Diarrhœa	621
Mœror	{ Mœror	843
	{ Phthisis nervosa	518
Motus manuum & pedum depravatio	{ Colica pictonum	655
Motus tremulus & undulatorius objectorum visibilium	{ Vertigo	303
Motus in imo ventre	Affect. Hyst.	287
Motus in utero lenis blandus ordinatusque	{ Conceptus	1420
Tremulus & palpitans	{ Mola	1426
Muscarum pilorum, &c. simulaera ante oculos volitantia	{ Gutta serena 1059.	1090
N		
Narium excrecentia alba rubra vel livida	{ Polypus narium	1108
Pruritus	In feb. ardente	66
Scalptura	Lumbrici	1548



Symptoma.	Morbus	Art.
Nausea & vomitus	{ <i>Alvi retentio</i>	611
	{ <i>Calculus renum</i>	739
	{ <i>Conceptus</i>	1421
	{ <i>Feb. intermittens</i>	34
Nephritici dolores	{ <i>Nephritis</i>	713
	{ <i>Affect. Hyst.</i>	396
	{ <i>Arthritis</i>	920
	{ <i>Feb. intermittens</i>	37
Nodi & tophi	{ <i>Arthritis</i>	910
	{ <i>Lues venerea</i>	961
Nodi in carpis & costarum extremitatibus	{ <i>Rachitis</i>	1553
O		
Objectorum visibilibum circumrotatio, motus tremulus & undulatorius	{ <i>Vertigo</i>	303
	{ <i>Lumbrici</i>	689
Obmutescencia subitanea	{ <i>Fissura cranii</i>	1335
	{ <i>Venenum</i>	1636
Oculi cavi	{ <i>Empyema</i>	240
	{ <i>Phthisis</i>	493
Oculorum horridus obtus	<i>Venenum ex opio</i>	1536
Oculorum distillatio	<i>Morbilli</i>	123
Defluxio serosa	<i>Epiphora</i>	1064
Gravedo	<i>Morbilli</i>	123
Inflammatiō cum tumore ardore & dolore	{ <i>Ophthalmia</i>	1021
Insolita mutatio	<i>Febris maligna</i>	77
Puncturæ	<i>Febris eruptiva</i>	118
Rubedo	<i>Febris eruptiva</i>	117
Splendor	<i>Peripneumonia vera</i>	216
	Odor	

Symptoma.	Morbus :	Art.
Odor cadavericus	{ Febris	28
	{ Gangrena	1385
	{ Mortis signum	28
Oedematosus corporis	{ Anasarca	799
habitus	{ Leucophlegmatia	797
	{ Phthisis nervosa	513
OEdematosi tumores	{ Scorbutus	858
	{ Post variolas	145
Ophthalmia	Febris intermittens	37
Oppressio pectoris	Febris eruptiva	117
Oris distortio	Spasmus Cynicus	362
Fœtor	Scorbutus	889
Pruritus	Scorbutus	869
Ossium crepitus	Scorbutus	885
Incurvatio	Rachitis	1553
Tumor vel protuberantia vid. nodi & topi	{ Rachitis	1553
	{ Spina ventosa	1286
Ozæna	Lues venerea	961

## P

Palati uleus	Lues venerea	961
Palpebræ inversæ	Ectropium	1018
Palpebra oedematosa	Hydatis	1001
Palpebrarum gravitas	Febris eruptiva	118
Intumescencia	{ Chlorosis	1393
	{ Morbilli	123
Pruritus & rubor	Tracoma	1009
Papillarum color in lividum mutatus	{ Conceptus	1420
Palpitatio cordis vid. cordis palpitatio		
Paralysis	{ Colica Piætonum	655
	{ Scorbutus	880

Paro-

Symptoma .	Morbus .	Atr.
Parotides	<i>Post variolas</i>	145
Pectoris gravitas	<i>Empyema</i>	242
Mala conformatio	<i>Asthma</i>	545
	<i>Phthisis</i>	494
Ingens oppressio	<i>Febris eruptiva</i>	117
	<i>Febris miliaris</i>	1497
Stridor	<i>Peripneumonia notha</i>	221
Pedum tumor	<i>Peripneumonia vera</i>	216
In penis summitate dolor exquisitus	<i>Hydrops pectoris</i>	836
Pruritus & frequens ere- ctio	<i>Calculus vesicae</i>	730. 739 743
Periodicus symptomatum recursus	<i>Febris intermittens</i>	34
Peripneumonia	<i>Febris remittens</i>	49
Pervigilium vid: vigiliae nimiae	<i>Arthritis</i>	919
Petechiae	<i>Febris ardens</i>	65
	<i>Febris petechialis</i>	79. 80
Phrenitis	<i>Variola</i>	140. 142
	<i>Febris ardens</i>	65
Pica	<i>Febris continua</i>	58
	<i>Conceptus</i>	1421
Pleuritici dolores	<i>Ventriculi morbus</i>	603
	<i>Febris intermittens</i>	37
	<i>Febris remittens</i>	50
	<i>Lumbrici</i>	683
	<i>Asthma</i>	554
	<i>Chlorosis</i>	1392
Præcordiorum anxietas	<i>Febris eruptiva</i>	117
	<i>Febris maligna</i>	74
	<i>Febris petechialis</i>	82
	<i>Febris puerperarum</i>	1495
Dolor	<i>Febris ardens</i>	66
	<i>Febris maligna</i>	74

Præ-

Symptoma.	Morbus.	Art.
Præcord. Inflatio	<i>Melancholia</i>	426
Perturbatio	<i>Colica hysterica</i>	663
Præputii inflammatio & tumor	<i>Lues venerea</i>	961
Tumor sine coloris mutatione	<i>Tumor flatulentus</i>	1298
Procidentia ani	<i>Calculus vesicae</i>	730
Pruritus ani	<i>Ascarides</i>	681
Totius corporis	<i>Icterus</i>	840
	<i>Psora</i>	1181
Pruritus manuum vel pedum cum ardore, rubore &c.	<i>Pernio</i>	1250
Molestus in infantibus	<i>Grinones</i>	1550
Circa juncturas	<i>Psora</i>	1181
Prunella	<i>Febris</i>	107
Ptyalismus vid. salivatio		
Pubis ardor & dolor &c.	<i>Inflammatio vesicae</i>	717
Pulmonum coarctatio	<i>Asthma</i>	545
	<i>Peripneumonia notha</i>	214
Pulsatio in abdomine	<i>Colica</i>	646
Subtus ventriculum	<i>Affectio hysterica</i>	400
Pulsus velox	<i>Febris in genere</i>	20
Fortis uno tenore pergens	<i>Idem</i>	32
Celer, debilis, vacillans	<i>Idem</i>	32
Celer, inæqualis	<i>Sudor Anglicus</i>	194
Debilis ac languidus	<i>Febris maligna</i>	74
Durus	<i>Pleuritis</i>	227
Fortis	<i>Apoplexia</i>	326
Tardus	<i>Scorbutus</i>	868
Pupilla angusta	<i>Cataracta</i>	1060
Nigrior & amplior	<i>Gutta serena</i>	1088

Pus

Symptoma.	Morbus.	Art.
Pus albo-flavescens ab oculis extillans	} <i>Fistula lacrymalis</i> <i>Phthisis</i>	1083 527
Puris visceri sereatio		
Pustulæ albidæ relinquentes crustulas semina milii referentes	} <i>Herpes miliaris</i>	1162
Pustulæ accumulativæ exurgentes		
Dentæ, dolorosæ, rubræ cum inflammatione latius serpentes	} <i>Serpigo</i> <i>Erysipelas</i>	1160 1168
Pustulæ Flavæ, siccæ cum arida crusta sparsim per corpus, speciatim in fronte & mento, &c.		
Inflammatoriæ pariter exulcerantes	} <i>Lues Venerea</i> <i>Herpes exedens</i>	962 1165
Plures congestæ squamosæ, &c.		
Parvæ rubescences cum cutis duritie & pruritu insigni	} <i>Impetigo</i> <i>Psora</i>	1188 1180
Subrubræ		
Varicæ in pene & alibi	} <i>Variola</i> <i>Lues venerea</i>	131 961
Urticationes referentes		
Pustula (vel potius tuberculum) sublivida, vel subnigra vel alba.	} <i>Erysipelas species</i> <i>Epinyctis</i>	1168 1237

Symptoma.	R	Morbus.	Art.
Rauedo	{	Catarrh. suffocativus	479
		Colica	649
		Febris lenta	69
		Lues venerea	961
Clangosa	{	Lumbrici	683
		Catarrh. suffocativus	482
		Febris eruptiva	118
		Variolæ	155
Recurfus poti liquoris per nares	{	Angina	209
Resolutio partium nervosarum	{	Paralysis	332. 335
Respiratio anhelosa, laboriosa, & sibilosa	{	Asthma	545. 554
Respiratio ejusmodi in infantibus	{	Asthma infantum	1533
Cita & anhelosa	{	Febris eruptiva	118
		Peripneumonia notha	214
		Secundina retenta	1483
		Variolæ	155
Densa	{	Febris ardens	65
		Peripneumonia vera	216
		Angina	206
Difficilis	{	Catarrh. suffocativus	479
			482
		Colica hysterica	663
		Hydrops	801
		Hydrops pectoris	837
		Icterus	840
		Peripneumonia notha	216
			242
		Phrenitis	255
		Rachitis	1553
	{	Scorbutus	869
		Vomica pulmonis	541. 543
		Sf Rheu.	



Symptoma.	Morbus.	Art.
Rheumatici dolores	<i>Febris remittens</i>	50
	<i>Lues venerea</i>	961
	<i>Scorbutus</i>	869
Rigor & horror	<i>Dysenteria</i>	631
	<i>Febris intermittens</i>	34
	<i>Febris omnis</i>	20
	<i>Pestis</i>	183
	<i>Pleuritis</i>	212
Per vices recurrens	<i>Rheumatismus</i>	854
	<i>Abortus</i>	1441
Rifus Sardonicus	<i>Melancholia</i>	434
Rubor genarum	<i>Phthisis</i>	494
Ructus	<i>Affectio hysterica</i>	399
	<i>Scorbutus</i>	869
Acidi	<i>Ventriculi morbus</i>	581
Affidui	<i>Nephritis</i>	708
Insuper	<i>Asthma</i>	547
Nidorosi	<i>Ventriculi morbus</i>	583
Saporis varii	<i>Idem</i>	584
	<i>Melancholia</i>	426
	<i>Venenum</i>	1576
S		
Saliva copiosa	<i>Lumbrici</i>	1548
	<i>Diabetes</i>	703
Spumosa	<i>Febris continua</i>	61
	<i>Phthisis</i>	495
	<i>Scorbutus</i>	869
	<i>Variola</i>	132
Saltationes admirandæ	<i>Chorea Sancti Viti</i>	394
Sanguis sincerus per alvum	<i>Dysenteria</i>	631
	<i>Hæmorrhoides</i>	1260
Sapor oris ingratus, vel amarus	<i>Febris continua</i>	58
	<i>Empyema</i>	243
Tetrus vel putridus		S. 2.

Symptoma.	Morbus.	Art.
Scabies ferina & inveterata cum tuberculis molli- libus vel indolentibus.	<i>Lepra</i>	1191
Scotomia	<i>Apoplexia</i>	314
Screatus crudus & glutinosus filamentis nigris distinctus	<i>Asthma</i>	348
Scrobiculi cordis dolor	<i>Colica hysterica</i>	653
Inflatio	<i>Asthma</i>	547
Segnities	<i>Chlorosis</i>	1393
Segnities & torpor in infantibus	<i>Icterus</i>	840
	<i>Rachitis</i>	1553
Siccitas cutis	<i>Febris ardens</i>	65
	<i>Icterus</i>	840
	<i>Fungorum efus</i>	1603
Singultus	<i>Hepatitis</i>	268
	<i>Lumbrici</i>	683
	<i>Scorbutus</i>	869
	<i>Venenum</i>	1576
	<i>Febris ardens</i>	65.105
	<i>Febris continua</i>	58
Sitis intensa	<i>Diabetes</i>	695
	<i>Hydrops</i>	801
	<i>Venenum</i>	1576
Somnolentia	<i>Morbilli</i>	123
	<i>Variola</i>	131
	<i>Apoplexia</i>	315
	<i>Coma, lethargus, carus</i>	295.296.297
Sopor gravis	<i>Lumbrici</i>	683
	<i>Pestis</i>	179
	<i>Sudor anglicus</i>	197
Spasmi	<i>Affectio hysterica</i>	396
	<i>Epilepsia</i>	375
	<i>Febris</i>	116

Symptoma .	Morbus .	Art.
Spirandi difficultas , vid. respiratio difficilis		
Spirituum depressio	} <i>Febris maligna</i>	74
	} <i>Febris miliaris</i>	1497
	} <i>Angina</i>	200.206
Spuma circa os	} <i>Apoplexia</i>	315
	} <i>Epilepsia</i>	379
Sputum sanguinis vid. hæ- moptoe	} <i>Febris ardens</i>	66
	} <i>Peripneumonia</i>	316
	} <i>Pleuritis</i>	212
Stercoris per os ejectio	<i>Iliaca passio</i>	666
Sternutatio	<i>Morbilli</i>	123
Stertor insignis	<i>Apoplexia</i>	315
Stridor dentium vid. den- tium stridor.		
Stridor pectoris vid. pe- ctoris stridor.		
Stomachi gravedo	<i>Hydrophobia</i>	445
	} <i>Vesicantium applicatio</i>	110
	} <i>Nephritis</i>	713
Stranguria	} <i>Arenæ vel sabulum</i>	746
	} <i>Scorbutus</i>	869
Stupor in genere	<i>Venenum</i>	1576
Stupor brachii aut pedis	<i>Apoplexia</i>	314
Cruris	<i>Nephritis</i>	708
	} <i>Febris continua</i>	58.111
Sudores	} <i>Feb. intermittens</i>	34
	} <i>Scorbutus</i>	869
Colliquativi	<i>Phthisis</i>	499
Copiosi	<i>Colica biliosa</i>	649
Critici	<i>Febris</i>	91
Glutinosi	<i>Febris</i>	97
Morbifici	<i>Morbi soperosi</i>	294
Perpetui & copiosif- simi	} <i>Sudor anglicus</i>	194
		Suffo-

Symptoma :	Morbus :	Art.
	✚ <i>Scorbutus</i>	869
Suffocationis periculum	{ <i>Angina</i>	200
	{ <i>Asthma</i>	554
	{ <i>Catarrh. suffocativus</i>	479
	{ <i>Uvula procidentia</i>	1133
Superciliorum gravitas	<i>Gutta serena</i>	1088
Suppuratio auris interni	<i>Pleuritis</i>	228
Surditas	<i>Febris maligna</i>	77.99
Syneope vid. languores gravissimi	{ <i>Ascarides</i>	681
	{ <i>Lumbrici</i>	683
	{ <i>Venenum</i>	1576
T		
Tendinum subsultus	{ <i>Febris continua</i>	32
	{ <i>Febris eruptiva</i>	118
Tenesmus	✚ <i>Ascarides</i>	681
	{ <i>Calculus vesicae</i>	730.741
	{ <i>Fœtus mortuus</i>	1481
	{ <i>Ulcus vesicae</i>	718
Testium inflammatio	<i>Lues venerea</i>	961
Testiculi retractio	{ <i>Calculus renum</i>	728
	{ <i>Nephritis</i>	708
Thoracis totius dolor	<i>Peripneumonia notha</i>	214
Gravedo	<i>Peripneumonia vera</i>	216
Tibiarum dolores	<i>Scorbutus</i>	880
Tinnitus aurium. vid. au- rium tinnitus		
Tonsillarum tumor	<i>Angina</i>	200.206
Tophi & nodi vid. nodi		
Tormina ventris. vid. ven- tris tormina	{ <i>Lumbrici</i>	683
	{ <i>Scorbutus</i>	869
	{ <i>Febris</i>	32
	{ <i>Iracundia</i>	358
	{ <i>In senio confectis</i>	358
	{ <i>Secundina retenta</i>	359
Tremores	{ <i>Venenum</i>	1576

Symptoma.	Morbus.	Art.
Tristitia	Icterus	843
Tuberculum acutum in-	Carbunculus	171
flammatorium	Furunculus	1233
Durum, lividum vel	Cancer	1289
nigricans		
Tumor abdominis	Ascites	801
	Empyema	240
Acuminatus glandu-	Phyma	1239
larum		
Tumor albicans, frigidus,	Oedema	1272
indolens		
Aquosus capitis	Hydrocephalus	832
Pone aures	Parotis	1143
Carnosus magnus in	Natta	1308
dorso		
Corporis totius	Anasarca	799
In digitorum extre-	Paronychia	1247. 1248
mis manuum vel		
pedum		
Durus, indolens, mo-	Scrophula	1277
bilis, sine coloris		
mutatione		
Durus, livefcens, in-	Scirrhus	1275
dolens		
Durus, lividus vel ni-	Cancer	1289
gricans, puncto-		
rius	Hæmorrhoides	1259
In ano varicosus		
Cum inflammatione	Phlegmone	1226
& dolore pulsatorio		
Inflammatorius, in	Bubo	1241
inguine vel sub a-		
xilla		
Levis digito cedens&	Tumor flatulentus	1298
digito pressus fove-		
am non relinquens		

Tumor

Symptoma.	Morbus.	Art.
Tumor mollis sine coloris mutatione plerum- que pulsans	<i>Aneurisma</i>	1255
Mollis & latus inter cranium & cutim	<i>Talpa</i>	1305
Mollis in juncturis	<i>Lupia</i>	1302
Ossis vel ejusdem protuberantia	<i>Spina ventosa</i>	1286
In præcordiis	<i>Inflammatio Ventric.</i>	258
In tendine doloris ex- pers	<i>Ganglium</i>	1301
Varicosus venarum spermaticarum	<i>Hernia varicosa</i>	1270
Ex laxata venarum tunica	<i>Varix</i>	1257
Tussicula	<i>Febris ardens</i>	65
	<i>Lumbrici</i>	683
	<i>Morbilli</i>	123
	<i>Affectio Hysterica</i>	396
Tussis	<i>Febris lenta</i>	69
	<i>Pleuritis</i>	212
	<i>Scorbutus</i>	869
	<i>Tussis stomachalis</i>	485
Cum dolore capitis	<i>Peripneumonia notha.</i>	214
Humida diuturnior	<i>Asthma</i>	554
	<i>Phthisis</i>	491
Perpetuè molesta	<i>Asthma</i>	554
	<i>Febris eruptiva</i>	118
Immanis	<i>Hydrops</i>	821
Importuna & sicca	<i>Hydrops pectoris</i>	836. 837
Infantum ferina	<i>Tussis convulsiva</i>	1533
	<i>Empyema</i>	240
Sicca & molesta	<i>Lumbrici</i>	1548
	<i>Vomica pulmonis</i>	543
Stomachalis	<i>Tussis</i>	485
	Sl 4	Vel



Symptoma .	V	Morbus .	Atr.
Ventriculi ægritudo sum- ma		<i>Sudor anglicus</i>	197
Ventriculi Æstus		<i>Arthritis</i>	925
Cum dolore molesto & intensissimo	}	<i>Cardialgia</i>	600
Dolor gravativus		<i>Ventriculi morbus</i>	584
Inflatio		<i>Scorbutus</i>	869
Inflammatiō	{	<i>Asthma</i>	547
		<i>Scorbutus</i>	869
Ventriculi mordicatio & dolor vehemens	}	<i>Venenum</i>	1576
Ventris dolor		<i>Scorbutus</i>	880
Ventris intumescencia	}	<i>Graviditas</i>	1420
		<i>Uterus inflatus</i>	1429
Æqualiter in omnem dimensionem	{	<i>Mola</i>	1426
Circa umbilicum mi- nus prominens		<i>Hydrops peritonæi</i>	817
Tormina, vid. tormi- na ventris	}	<i>Colica</i>	643
		<i>Dysenteria</i>	631
		<i>Lumbrici</i>	683
		<i>Scorbutus</i>	877.880
In infantibus	{	<i>Dentitio</i>	1543
		<i>Lumbrici</i>	1548
Circa umbilicum		<i>Iliaca passio</i>	666
Infra umbilicum		<i>Secundina retenta</i>	1483
Ventris tensio		<i>Scorbutus</i>	869
	{	<i>Ascites</i>	809
		<i>Gravidatio</i>	1420
Ventris tumor	}	<i>Hydrops ovarii</i>	1436
		<i>Mola</i>	1426
	{	<i>Tympanites</i>	827
		<i>Uterus inflatus</i>	1429
In infantibus		<i>Rachitis</i>	1553

Ven-

Symptoma .	Morbus .	Art.
Ventris tumor durus cum corporis extenuatione	{ <i>Atrophia infantum</i>	1530
Verrucæ circa anum	{ <i>Hæmorrhoides</i>	1248
	{ <i>Lues venerea</i>	961
Vertigo	{ <i>Apoplexia</i>	314
	{ <i>Peripneumonia notha</i>	214
	{ <i>Venenum</i>	1576
Vesiculæ ambustorum si-		
miles	{ <i>Variola</i> }	135
Aqueæ		140
Miliares		143
Serosæ subflavæ	<i>Febris miliaris</i>	1497
Vibices	<i>Febris petechialis</i>	79
	{ <i>Febris continua</i>	58.113
	{ <i>Febris maligna</i>	74
	{ <i>Febris eruptiva</i>	118
Vigiliæ pertinaces	{ <i>Hydrophobia</i>	445
	{ <i>Mania</i>	438
	{ <i>Morbus solitarius</i>	289
	{ <i>Peripneumonia notha</i>	216
Virium prostratio	{ <i>Pestis</i>	179
	{ <i>Icterus</i>	840
	{ <i>Febris maligna</i>	174
Subitanea	{ <i>Febris petechialis</i>	82
	{ <i>Pestis</i>	
	{ <i>Sudor Anglicus</i>	194
	{ <i>Venenum</i>	1576
Visus abolitio	{ <i>Cataracta</i>	1054
	{ <i>Gutta serena</i>	1088
	{ <i>Venenum</i>	1576
Obfuscatio	{ <i>Opium</i>	1596
Visus hebetudo. vid. hebetudo visus		
Ulcus palati. vid. palati ulcus.		

Ulcus

Symptoma.	Morbus.	Art.
Ulcus sinuosum in oculi cantho	<i>Fistula lacrymalis</i>	1083
Ulcera cancroſa & calloſa	<i>Cancer</i>	1289
	<i>Lues venerea</i>	961
Corroſiva	<i>Herpes exedens</i>	1165
	<i>Variola</i>	156
Ungues recurvi	<i>Empyema</i>	240
	<i>Hydrops pectoris</i>	836
	<i>Phthiſis</i>	493
Ungues nigri vel lutei	<i>Venenum</i>	1636
	<i>Affectio Hyſterica</i>	596
	<i>Colica</i>	643
Vomitus	<i>Conceptus</i>	1421
	<i>Febris intermittens</i>	37
	<i>Lumbrici</i>	683
	<i>Phthiſis</i>	494
	<i>Variola</i>	131. 137
Enormes	<i>Cholera morbus</i>	607
	<i>Peſtis</i>	183
Bilioſi & pituitoſi	<i>Iliaca paſſio</i>	668
	<i>Renum Inflammatio</i>	713
Cruenti	<i>Pancreatis morbus</i>	596
Materiæ nigræ	<i>Ventriculi morbus</i>	596
Humorum diverſico- lorum	<i>Melancholia</i>	426
	<i>Venenum</i>	1576
Stercoris	<i>Iliaca paſſio</i>	666
Vox clangoſa	<i>Catarrh. ſuffocativus</i>	479
	<i>Febris ardens</i>	65
	<i>Variola</i>	155
Vocis privatio	<i>Catarrh. ſuffocativus</i>	482
	<i>Colica</i>	649
	<i>Lumbrici</i>	683
Voracitas nimia	<i>Affectio Hypochondriaca</i>	408
	<i>Ventriculi morbus</i>	604

Uri-

Symptoma.	Morbus.	Art.
Urina sanorum similis	<i>Febris maligna</i>	74
	<i>Infantum febris</i>	776
Urina alba	<i>Lumbrici</i>	776
	<i>Variola</i>	776
	<i>Affectio hysterica</i>	777
	<i>Asthma</i>	549
	<i>Cachexia</i>	777. 793
	<i>Chlorosis</i>	777
Urina aquosa, tenuis & pallida	<i>Colica nephritica vel hysterica</i>	663
	<i>Febris maligna</i>	777
	<i>Nephritis</i>	708
	<i>Variola</i>	137
Chylosa	<i>Diabetes</i>	697
	<i>Diabetes</i>	698
Copiosa	<i>Affectio hysterica</i>	777
	<i>Asthma</i>	549
	<i>Arthritis</i>	909
Crassa & rubra	<i>Colica</i>	644
	<i>Scorbutus</i>	663
	<i>Icterus</i>	840
Crocea & flava	<i>Hypochondr. affectio</i>	779
	<i>Scorbutus</i>	779
Eruenta vid. mictus sanguinis	<i>Calculus</i>	787
	<i>Scorbutus</i>	787
Dulcis	<i>Diabetes</i>	663
	<i>Icterus</i>	843
Nigra & viridis	<i>Febris quartana</i>	781
	<i>Morbus virulentus vel venenatus</i>	781
Nigra & tenuis	<i>Febris ardens</i>	66
	<i>Colica biliosa</i>	646
Pauca	<i>Hydrops</i>	801
	<i>Nephritis</i>	708

Uri-

Symptoma.	Morbus.	Art.
Urina pinguis	{ Diabetes	965
	{ Febris ardens	784
	{ Febris colliquativa	784
	{ Febris hectica	784
	{ Ulcus renum	784
Purulenta	{ Ulcus renum vel vesicæ	718. 720
	{ Empyema	787
	{ Fluor albus	787
	{ Gonorrhœa	787
	{ Pleuritis & Peripneumonia	787
Rubicunda	{ Arthritis	780
	{ Febris continua	58.97
	{ Nephritis	708
	{ Peripneumonia notha	214
	{ Scorbutus	780
Urinæ ardor	{ Variola	137
	{ Colica biliosa	646
	{ Dysuria	763
	{ Lues venerea	961
	{ Renum inflammatio	713
Urinæ subita mutatio a turbida & crassa in tenuem & pallidam	{ Phrenitis	246
Urinæ stillicidium	{ Stranguriâ	761
Suppressio	{ Colica biliosa	646
	{ Ischuria	752. &c.
	{ Nephritis	713
	{ Venenum	1576
In Urina carunculæ & filamenta	{ Ulcus ren. vel vesicæ	718
Cremor innatans	{ Affectio hysterica	784
	{ Phthisis	784

In Uri-

Symptoma.	Morbus.	Art.
In Urina materia crassa vel mucilaginosa	{ <i>Dysuria</i>	763
Bullæ & spuma	{ <i>Mania</i>	784
Sedimentum crassius farinæ simile	{ <i>Morbus diuturnus</i>	786
Sedimentum lateritii coloris	{ <i>Febris intermittens</i>	37
Vultus livor	{ <i>Angina</i>	200
	{ <i>Hydrops</i>	809
	{ <i>Febris ardens</i>	66
Rubor insignis	{ <i>Febris scarlatina</i>	120
	{ <i>Peripneumonia</i>	216
In Utero ponderis sensus instar lapidis	{ <i>Mola</i>	1426





# I N D E X M O R B O R U M.

## A

<b>A</b> <i>Bortus</i>	1441	<i>Aphtha</i> <i>adulorum</i>	1136
<i>Acrochordones</i>	1001	<i>Infantum</i>	1559
<i>Ægilops</i>	1325	<i>Apoplexia</i>	308
<i>Affectus Catarrhales</i>	1083	<i>Appetentia Canina</i>	604
	468.	<i>Aridura Partium</i>	1532
	478	<i>Arthritis</i>	908
<i>Albugo seu Leucoma</i>	1049	<i>Anomala</i>	933
<i>Alvi adstrictio in infanti-</i>	1528	<i>Ascarides</i>	681. 682
<i>bus</i>		<i>Ascites</i>	807
<i>In adultis</i>	611	<i>Alphixia</i>	571
<i>Alvi Fluxus</i>	617	<i>Assodes</i>	63
<i>Alvi Retentio</i>	611	<i>Asthma</i>	545
<i>Amaurosis sive Gutta Se-</i>		<i>Continuum</i>	ibid.
<i>renâ</i>	1088	<i>Periodicum</i>	546
<i>Ambustio</i>	1202	<i>Convulsivum</i>	552
<i>Anasarca</i>	799	<i>Humidum &amp; Siccum</i>	554
<i>Anchyloblepharon</i>	1013	<i>Infantum</i>	1533
<i>Anchylops</i>	1083	<i>Atheroma</i>	1303
<i>Aneurisma</i>	1251	<i>Atoniatonblepharon</i>	1016
<i>Angina</i>	200	<i>Atrophia Infantum</i>	1530
<i>Arthritica</i>	940	<i>Scorbutica</i>	527. 872
<i>Notha</i>	208		879
<i>Sine Tumore</i>	202	<i>Oculi</i>	1070
<i>Ani procidentia</i>	1322	<i>Aurium Morbi</i>	1120
<i>Animi Morbi</i>	421		
<i>Anorexia</i>	602		
<i>Anthracosis</i>	1039		
<i>Anxietas Præcordiorum</i>	599		
	589		
<i>Apepsia</i>			

## B

<i>Bronchocele</i>	1320
<i>Bubo Benignus</i>	1241
<i>Bubo Pestilentialis</i>	171
	180
<i>Bubo</i>	

# Index Morborum :

<i>Bubo Venereus</i>	973. 991	<i>Cæliaca</i>	655 617. 629.
<i>Bugger</i>	1570	<i>Urinalis</i>	697
<i>Bulimia</i>	408. 604	<i>Colica Arthritica</i>	936
		<i>Colica Biliosa</i>	643. 659
		<i>Hysterica</i>	653
		<i>Pictonum</i>	655
		<i>Scorbutica</i>	895
<i>Cachexia</i>	792	<i>Coma</i>	294
<i>Calculus renum &amp; Vesicæ</i>	727	<i>Coma Vigil</i>	299
<i>Calentura</i>	64	<i>Combustio</i>	1202
<i>Callus in Ulceribus</i>	1369	<i>Cum pulvere pyrio</i>	1213
<i>Cancer</i>	1289	<i>A fulmine</i>	1214
<i>Canis Rabiosi Morfus</i>	444	<i>Comedones live Crinones</i>	1550
<i>Capitis Contusio</i>	1335	<i>Concussio Capitis</i>	1336
<i>Dolor</i>	276	<i>Congelatio</i>	350
<i>Vulnera</i>	1361	<i>Contusio</i>	1329
<i>Carbunculus Pestilentia-</i>		<i>Capitis</i>	1335
<i>lis</i>	171. 181	<i>Convulsus seu Chordap-</i>	666
<i>Cardialgia</i>	600	<i>son</i>	666
<i>Caries ossis</i>	1370	<i>Convulsio</i>	361
<i>Caruncula in Urethra</i>	990	<i>Infantum</i>	1536
<i>Carus</i>	297	<i>Scorbutica</i>	872
<i>Catalepsis, Catoche, Con-</i>		<i>Tonica</i>	365
<i>gelatio</i>	350	<i>Cordis Palpitatio</i>	563
<i>Cataphora</i>	294	<i>Polypus</i>	577
<i>Cataracta live Suffus.</i>	1054	<i>Tremor</i>	567
<i>Catarrhus</i>	469	<i>Vermes</i>	562
<i>Suffocativus</i>	479	<i>Corpulentia nimia</i>	789
<i>Cephalalgia</i>	276	<i>Coryza</i>	475
<i>Chalazion</i>	1001	<i>Cranii Fissura</i>	1335
<i>Chemosis</i>	1021	<i>Crapula</i>	605
<i>Chlorosis</i>	1392	<i>Crinones seu Comedones</i>	1550
<i>Cholera Morbus</i>	607	<i>Crithe.</i>	1001
<i>Chorea Sancti Viti</i>	391	<i>Cruditus acida &amp; nidoro-</i>	580. 583
<i>Chylificatio Lasa</i>	579	<i>sa.</i>	580. 583
<i>Cicatrix live Macula in</i>		<i>Cru-</i>	
<i>Oculo</i>	1049		
<i>Clavi</i>	1325		

*Crusta lactea*  
*Cutis nigredo*  
*Cynanche*

1561

1148

206

## D

*Dejectiones unguinosæ in*  
*Scorbuto*

879

*Delirium in Febris*

115

*Melancholicum*

427

*In puerperio*

1500

*Delirium Rabiosum*

444

*Dentitio*

1541

*Dentium Morbi*

1112

*Dolor*

1117

*Nigredo*

1113

*Vermes*

1119

*Diabetes notha & vera*

693. 695. &c.

*Diarrhœa*

618

*Arthritica*

918. 937

*Infantum*

1529

*Scorbutica*

876. 882

*Digestio*

591

*Dolor Capitis*

276

*Dolores nocturni Ven.*

979

*Post Partum*

1490

*Vagi Scorbutici*

872.

884. 894

*Dysenteria*

631

*Incruenta*

633

*Dyspnœa Scorbutica*

872.

875. 890

*Dysuria*

763

## E

*Ecchymosis*

1329

*Ectropium*

1018

*Efflorescentia Purpurea*

1515

*in Infantibus*

1515

*Elcos oculi*

1074

*Elephantiasis Græc. seu*

1197

*Lepra Arabum*

1197

*Elodes*

63

*Emphysema*

999. 1298

*Empyema*

361

*Empyema*

240

*Encanthis*

1081

*Ephelides*

1150

*Ephialetes sive Incubus*

463

*Epilepsia*

375

*Puerorum*

1536

*Epinyctis*

1237

*Epiphora*

1064

*Erysipelas*

1167

*Alia Species*

1168

*Scorbuticum*

872

*Symptomaticum*

1177

*Effere*

1153

*Exanthemata*

172. 181

*Excrecentia praternatu-*

1308

*rales*

1308

*Carnosa in vesica cal-*

731

*culum mentientes*

731

## F

*Fascinatio*

395

*Febres in genere 1. 2. &c.*

62

*Ardens seu Causus*

62

*Febris*

62

# Index Morborum.

657

<b>Febris Catarrhalis</b>	69	<b>Genitalium Tumores æde-</b>	
<b>Colliquativa</b>	73	<b>matosi in Luc Ven.</b>	985
<b>Continua</b>	10	<b>Gingivarum Affectus</b>	1116
<b>Ephemera</b>	7	<b>Laxitas</b>	872
<b>Eruptiva</b>	117	<b>Glaucoma</b>	1062
<b>Infantum</b>	1516	<b>Gonorrhœa vera &amp; notha</b>	
<b>Intermittens</b>	34-35	<b>non virulenta</b>	965
<b>&amp;c.</b>		<b>Virulenta</b>	964
<b>Lactea</b>	1494	<b>Grando</b>	1001
<b>Lenta</b>	68	<b>Gule Paralysis</b>	343
<b>Lipyrta</b>	104	<b>Gustus læsiones</b>	1110
<b>Maligna</b>	74	<b>Gutta Rosacea</b>	1143
<b>Miliaris</b>	1497	<b>Gutta serena</b>	1988
<b>Petechialis</b>	79		
<b>Pituitosa</b>	71		
<b>Cum Prunella</b>	107		
<b>Remittens</b>	49		
<b>Scarlatina</b>	120		
<b>Scorbutica</b>	902		
<b>Februm Symptomata</b>	102		
	103		
<b>Fissura Cranii</b>	1335		
<b>Offis</b>	1342		
<b>Fistula in Ano</b>	1379		
<b>Lacrymalis</b>	1083		
<b>In ulceribus</b>	1369		
<b>Flatus</b>	588		
<b>Fluor Albus</b>	1410		
<b>Fluxus Hepaticus</b>	641		
<b>Fractura Offis</b>	1341		
<b>Complicata</b>	1344		
<b>Fungus</b>	1377		
<b>Furor Uterinus</b>	1418		

## H

<b>Head-muld-shot</b>	1563
<b>Horse-shoe head</b>	1565
<b>Hæmoptysis</b>	533
<b>Hæmorrhagia Narium</b>	1096
<b>Hæmorrhoides</b>	1259
<b>Hæctica Febris</b>	494-500
	504
<b>Hemicrania</b>	282
<b>Hemiplegia</b>	312. 317. 329
<b>Hepatitis</b>	268
<b>Hernia, ejusq; species</b>	1309
<b>Hernia aquosa</b>	1316
<b>Carnosa</b>	1318
<b>Varicosa</b>	1270
<b>Herpes Exedens</b>	1165
<b>Miliaris</b>	1162
<b>Simplex</b>	1159
<b>Hippos</b>	1017
<b>Hordeolum</b>	1001
<b>Hydatis</b>	ibid.
<b>Hydrocele seu Hernia aquo-</b>	
<b>sa</b>	1316

## Tt

Hydroc.

## G

<b>Ganglium</b>	1301
<b>Gangrena</b>	1384

<i>Hydrocephalus</i>	832	<i>Inoculatio variolarum</i>	158
<i>Hydrophobia</i>	444	<i>Insignia Bacchantium</i>	1144
<i>Hydrops</i>	801. 809	<i>Ischias</i>	931. 952
<i>Ovarii</i>	1436	<i>Ischuria Renalis &amp; Vesi-</i>	
<i>Pectoris</i>	836	<i>calis</i>	752
<i>Peritonæi</i>	817		
<i>Siccus</i>	826		
<i>Vesicalis</i>	815		
<i>Uteri</i>	1432		
<i>Hypochondriaca &amp; Hysteri-</i>			
<i>ca affectio</i>	396		
<i>Hypopyon</i>	1036		
<i>Hyposphagma</i>	1052		

## I

<i>Icterus</i>	840	<i>Lactis fugatio</i>	1493
<i>Infantum</i>	1520	<i>Lagophthalmia</i>	1014
<i>Ignis Sacer</i>	1167	<i>Leclimingi</i>	763
<i>Ileos sive Iliaca Passio</i>	666	<i>Lentigines</i>	1149
<i>Impetigo</i>	1188	<i>Lepra</i>	1191
<i>Inappetentia</i>	602	<i>Græcorum</i>	1194
<i>Incontinentia Urinæ</i>	765	<i>Lethargus</i>	296
<i>Incubus</i>	463	<i>Leucoma seu Albugo</i>	1049
<i>Infantum Morbi in genere</i>	1504. &c.	<i>Leucophlegmatia</i>	797
<i>Inflammatiō in genere</i>	199	<i>Lichen</i>	1157
<i>Aurium</i>	1120	<i>Lienis Inflammatio</i>	271
<i>Cordis</i>	560	<i>Lienteria</i>	626. 627
<i>Hepatis</i>	268	<i>Linguae Paralysis</i>	345
<i>Intestinorum</i>	261	<i>Vitia</i>	1110
<i>Lienis</i>	271	<i>Lipothymia</i>	571
<i>Mammarum</i>	1228	<i>Lippitudo sive Ophthalmia</i>	1021
<i>Mesenterii</i>	263	<i>Lipyria</i>	63. 104
<i>Pancreatis</i>	267	<i>Luthiasis</i>	733. 738
<i>Renum</i>	708. 713	<i>Lutheotriptica</i>	734
<i>Testium</i>	1231	<i>Lochia</i>	1485
<i>Ventriculi</i>	258	<i>Loquela amissa</i>	1111
		<i>Lues Venerea</i>	961
		<i>Infantum</i>	983
		<i>Lumbrici</i>	675
		<i>Latus</i>	677. 678
		<i>In Infantibus</i>	1547
		<i>Lupia</i>	1302
		<i>Lupus</i>	1289

Luxa.

<i>Luxatio Ossium</i>	1337	<i>Mydriasis</i>	1071
<i>Lycanthropia</i>	429	<i>Myopia</i>	1093

N

M

<i>Macies Infantum</i>	1530	<i>Narium Morbi</i>	1105
<i>Macula sive Cicatrix in Oculo</i>	1049	<i>Nata Natta seu Napæ</i>	1308
<i>Macula Hepatica</i>	1151	<i>Nausæ &amp; Vomitus</i>	594
<i>Scorbutica</i>	888	<i>Necrosis</i>	1384
<i>Madarosis</i>	1012	<i>Nephritis</i>	708. &c.
<i>Malacia</i>	603	<i>Arthritica</i>	920
<i>Mammarum Tumores</i>	1228. 1493	<i>Notha Scorbutic.</i>	895
<i>Mania &amp; Melanch.</i>	425	<i>Noli me tangere</i>	1289
<i>Meconii purgatio in Infantulis</i>	1513	<i>Nyctalopia</i>	1095
<i>Meiopsis</i>	1072	O	
<i>Melancholia</i>	425		
<i>Meliceris</i>	1303	<i>Obesitas seu Corpulentia nimia</i>	782
<i>Memoria lesa</i>	414	<i>Obdormitio Membr.</i>	356
<i>Menstruatio</i>	1395	<i>Oculorum Morbi</i>	997. &c.
<i>Mensium difficultas</i>	1402	<i>Oculorum Ulcera</i>	1073
<i>Menses cum dolore fluentes</i>	1405	<i>Oedema</i>	1272
<i>Fluxus nimius</i>	1406	<i>Oedema Oculi</i>	1033
<i>per loca aliena fluentes</i>	1404	<i>Oedematosi Tumores Gent.</i>	1021
<i>Suppressio</i>	1398	<i>tal. in Læ Ven.</i>	985
<i>Mesenterii inflamm.</i>	263	<i>Olfactus amissus</i>	1105
<i>Mictus Cruentus</i>	767	<i>Opisthotonos</i>	361
<i>Miserere mei</i>	668	<i>Ophthalmia</i>	1021
<i>Mola</i>	1425	<i>Epidemica</i>	1029
<i>Aquosa Vesicul.</i>	1428	<i>Humida &amp; sicca</i>	1023
<i>Ventosa</i>	1429	<i>Scrophulosa</i>	1031
<i>Morbi Nervini</i>	274	<i>Ossium fractura</i>	1341
<i>Morbilli</i>	123	<i>Luxatio</i>	1337
<i>Morsus Canis Rabidi</i>	444	<i>Otalgia</i>	1122
		<i>Ovarii Hydrops</i>	1436
		<i>Oule</i>	1042
		<i>Ozena</i>	1106

Tt 2

Pla-



## P

		<i>neus</i>	1154
		<i>Phlyctæna</i> , oculi vitium	1037
<i>Palpebrarum Morbi</i>	998	<i>Phrenitis</i>	245
<i>Palpitatio Cordis</i>	563	<i>Phthiriasis</i>	1020. 1567
<i>Pannus</i> , oculi vitium	1041	<i>Phthisis ab Apostematibus</i>	
<i>Paracynanche</i>	206	<i>&amp; ulceribus</i>	521
<i>Paralysis &amp; Paresis</i>	332	<i>Asthmatica</i>	529
<i>Gula</i>	343	<i>Achlorosi vel mensi-</i>	
<i>Lingua</i>	345	<i>bus obstructis</i>	538
<i>Oculi</i>	1078	<i>A Diarrhæa vel</i>	
<i>Scorbutica</i>	878	<i>Dysenteria</i>	523
<i>Paraphimosis</i>	986	<i>A Gonorrhæa vel</i>	
<i>Paraphrenitis</i>	254	<i>fluore albo</i>	520
<i>Paraplegia seu paraplexia</i>	312. 329. 332	<i>Ab Hemorrhag.</i>	519
<i>Paronychia</i>	1246	<i>Ab Hypochond. vel</i>	
<i>Pedis digitorum</i>	1248	<i>Hyster. affect.</i>	531
<i>Parotis</i>	1243	<i>Ab ictero</i>	540
<i>Parasynanche</i>	206	<i>A Lactatu</i>	522
<i>Partus difficilis</i>	1450	<i>Nervosa</i>	513
<i>Parulis</i>	1235	<i>A Pleuritide vel pe-</i>	
<i>Pediculi Inguinales</i>	1569	<i>ripneumonia</i>	539
<i>Penis Amputatio</i>	986	<i>Pulmonaris</i>	491.
<i>Peribrosis Oculi</i>	1076		494
<i>Pericranii lasso</i>	1362	<i>Scorbutica</i>	527
<i>Perinæi ruptura</i>	1492	<i>Scrophularis</i>	524
<i>Peripneumonia notha</i>	214	<i>Varia</i>	ibid.
	221	<i>Pladorosis</i>	1000
<i>Vera</i>	216. 220	<i>Phygesthon</i>	1240
<i>Arthritica</i>	919	<i>Phyma</i>	1239
<i>Pernio</i>	1250	<i>Pica</i>	603
<i>Pervigilium</i>	289	<i>Plege Oculi</i>	1073
<i>Pestis</i>	163	<i>Pleuritis Arthritica</i>	919
<i>Phimosis &amp; Paraphimosis</i>	986	<i>Notha</i>	218. 224
	1226	<i>Occulta</i>	227
<i>Phlegmones</i>	1021	<i>Vera</i>	212. 218
<i>Phlogosis</i>	1021	<i>Plica Polonica</i>	992
<i>Phlyctæna</i> , morbus cuta.		<i>Pneumatocèle seu Hernia</i>	
		<i>vento-</i>	

<i>ventosa</i>	1313	<i>Scabies Humida &amp; Sicca</i>	1178
<i>Podagra</i>	908	<i>Scabies five Pfora</i>	1180
<i>Polypus Cordis</i>	577	<i>Scirrhus</i>	1275
<i>Narium</i>	1108	<i>Scleriasis</i>	1008
<i>Polypi in Pleuritid.</i>	234.	<i>Sclerophthalmia.</i>	1007
235		<i>Scorbutus</i>	869
<i>Presbytia.</i>	1094	<i>Scotomia</i>	303
<i>Procidencia Ani</i>	1322	<i>Scrophula</i>	1277
<i>Proptosis.</i>	1045. 1069	<i>Secundina retenta</i>	1483
<i>Pruritus vid. Pfora</i>		<i>Serpigo</i>	1160
<i>Pfora five Scabies</i>	1180	<i>Singultus</i>	369
<i>Pforophthalmia,</i>	1003	<i>Sirones</i>	1155
<i>Pterygium</i>	1041	<i>Somnus</i>	293
<i>Pudendorum Exsoriatio</i>		<i>Soporosi Morbi</i>	294
	1492	<i>Spasmi</i>	367
<i>Tumores Oedematosi</i>		<i>Spasmus Cynicus</i>	362
	1491	<i>Sphacelus</i>	1384
<i>Punctura Tendinis</i>	1351	<i>Spina ventosa</i>	1286
<i>Purpurea Efflorescentia in</i>		<i>Steatoma</i>	1303
<i>Infantibus.</i>	1515	<i>Sterilitas.</i>	1424
R		<i>Sternutatio</i>	373
<i>Rachitis</i>	1551	<i>Stomachica Remedia</i>	592
<i>Raxula</i>	1244	<i>Strabismus</i>	1079
<i>Raucedo</i>	472	<i>Stranguria</i>	761
<i>Red Gum</i>	1515	<i>Scorbutica</i>	906
<i>Renum Inflammatio</i>	708	<i>Struma</i>	1277
<i>Ulcus.</i>	715	<i>Stupor</i>	355
<i>Rheumatismus</i>	854	<i>Scorbuticus</i>	878
<i>Rheuma Oculi</i>	1068	<i>Sudamina</i>	1152
<i>Rhexis</i>	1047	<i>Sudor Anglicus</i>	193. 196
<i>Rubedo Maculosa</i>	1144	<i>Suffusio five Cataract</i>	1054
<i>Ruptura Perinai</i>	1492	<i>Suggillatio Oculi</i>	1052
S		<i>Suppressio Urinae</i>	752. &c.
<i>Sahafati seu Tinea</i>	995	<i>Surditas</i>	1130
<i>Salivatio.</i>	702	<i>Surfeit</i>	605
<i>Sarcocela seu Hernia car-</i>		<i>Sycosis</i>	1009
<i>nosa.</i>	1318	<i>Synanche</i>	206
<i>Sarcoma Narium</i>	1109		

Synchysis

Syncope

Synovia

1040

571. 574

1365

Vari

Variola

V

1156

130

Distincta

131

Confluentes

132

Maligna

142

Variolarum Inoculatio

158

Varix

1257

Venena in genere

1571

Aconitum

1589

Æs viride

1614

Angues

1619

Antimonialia

1614

Aqua fortis

1615

Aranei

1624

Argentum vivum

1610

Arsenicum

1606

Aspis

1623

Bella donna, Vid. Co-

rona Imperialis

Buso

1628

Cantharides

1630

Cerussa

1617

Cicuta

1580

Cicutaria

1584

Cingula Mercur. 1610

Coccula officinarum

1592

Coriandrum

1599

Corona Imperial. 1588

Esula

ibid.

Euphorbium

ibid.

Fungi

1602

Helleborus

1588

Hyojcyamus

1597

Litharexum

1617

Mandradora

1599

Mercurius præcip. &amp;

su-

T

Talpa seu Testudo 1305

Tarantismus 462

Tendinis Punctura 1351

Tendinum vulnera 1349

Tenesmus 640

Terminthus 1238

Tetanus 361

Tinea seu sabasati 995

Tinnitus aurium 1124

Tonsillarum Inflam. 206

Tophus 1001

Tophi Arthritici 915

Tormina Ventris Infantum

1523

Scorbutica

872

Torpor 355

Tortura Oris 362

Tracoma 1009

Tremor 358

Cordis

567

Scorbuticus

878

Trichiasis 1011

Tumores in genere 1217

Albi

1283

Capsulares.

1300

Flatulenti

1298

Tussis 484

Convulsiva

1533

Epidemica

487

Stomachalis

485

Tylosis 1009

Tympantitis 826

# Index Morborum.

663

<i>sublim.</i>	1611	<i>Ulcera Venerea</i>	984
<i>Napellus</i>	1589	<i>Ulcus Vesicæ</i>	718
<i>Nux vomica</i>	1600	<i>Unguis Oculi</i>	1041
<i>Oenanthe</i>	1584	<i>Vomica Pulmonis</i>	541
<i>Opium</i>	1594	<i>Vomitus</i>	594
<i>Scorpio</i>	1626	<i>Cruentus</i>	596
<i>Serpentes</i>	1619	<i>Infantum</i>	1526
<i>Solanum</i>	1598	<i>Urina Ardor in Lue Vene-</i>	
<i>Spiritus acidus</i>	1615	<i>rea</i>	988
<i>Spiritus vini</i>	1633	<i>Incontinentia</i>	765
<i>Sublimatus Mercurius</i>	1611	<i>Suppressio</i>	752
<i>Taxus</i>	1593	<i>Suppressio ex Sanguinis dyscrasia</i>	756
<i>Tithymalus</i>	1588	<i>Uroscopia sive Urinarum</i>	
<i>Vipera</i>	1620	<i>Prognosis</i>	775
<i>Ventriculi Inflammatio</i>	258	<i>Uteri Hydrops</i>	1432
<i>Vermes</i>	675	<i>Uteri Procidencia</i>	1502
<i>In auribus</i>	1123	<i>Uterus Inflatus</i>	1429
<i>In Corde</i>	562	<i>Vulnera</i>	1345
<i>Verrucæ</i>	1325	<i>Arteriarum</i>	1346
<i>Vertigo</i>	300	<i>Capitis</i>	1361
<i>Vesicæ Ulcus</i>	718	<i>Lethalia</i>	1352
<i>Vigilia</i>	289	<i>Musculi Temporalis</i>	1353
<i>Visus Hebetudo</i>	1085	<i>Nervorum</i>	1348
<i>Ulcera</i>	1366	<i>Sclopetorum</i>	1358
<i>Ulcus Aurium</i>	1120		1359
<i>Ulcuscula glandis &amp; Præputii</i>	968	<i>Tendinum ac Membranarum</i>	1348
<i>Ulcus cordis</i>	559. 560	<i>Uvula Relaxatio sive Procidencia.</i>	1133
<i>Ulcera Oculorum</i>	1074		
<i>Oris &amp; Palati</i>	972		
<i>Ulcus Renum</i>	715		
<i>Ulcuscula Vaginæ</i>	969		

X

*Xerophthalmia* 1005

Erra-

# Errata

# Corrige

Pag.4. lin. 5.	occisionem	occasione
8.	2. exiverit	exciverit
20.	20. tempora	tempora
32.	23. graviter	gravitate
39.	28. infecutorum	infecutorum
48.	34. purpure	purpureæ
56.	17. valeat	valent
63.	23. ligatur	litigatur
64.	8. operanda	operienda
73.	7. frequenti	sequenti
76.	17. frequentem	sequentem
83.	14. tamen	famem
93.	1. summus	somnus
138.	29. humores	humeros
147.	ult. furtis	fortis
162.	19. Quomodo	Quando
169.	25. sentiuntur vagi	sentiuntur dolores vagi
173.	35. magna	magma
174.	2. quamplurimum	quamprimum
176.	7. tantum	tandem
194.	6. Et	Est
197.	9. pute	pure
212.	11. cum	com.
213.	16. soda	psoda
217.	17. coral.	mistr. coral.
239.	ult. scilicet, decet,	scilicet,
240.	21. in ipso	in hoc ipso
242.	10. nam hoc	nam hoc est
263.	12. lenta terrestri	lenta aut terrestri
291.	1. reddita præter	reddita urina præter
297.	18. Humor	Tumor









